



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

Tda  
L88.3  
5

JP









**COURS ÉLÉMENTAIRE**  
**DE**  
**CULTURE DES BOIS**

**CRÉÉ A L'ÉCOLE FORESTIÈRE DE NANCY**

**PAR M. LORENTZ**

**DIRECTEUR-FONDATEUR DE CETTE ÉCOLE, ANCIEN ADMINISTRATEUR DES FORÊTS,  
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,  
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE CENTRALE D'AGRICULTURE, ETC.**

**COMPLÉTÉ ET PUBLIÉ**

**PAR A. PARADE**

**CONSERVATEUR DES FORÊTS, DIRECTEUR DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE FORESTIÈRE.**

**CINQUIÈME ÉDITION**

**PUBLIÉE PAR A. LORENTZ ET H. NANQUETTE**

**AVEC UNE PRÉFACE**

**PAR L. TASSY**

**PARIS**  
**Mme V<sup>e</sup> BOUCHARD-HUZARD**  
**LIBRAIRE**  
**Rue de l'Épéron, 5.**

**NANCY**  
**NICOLAS GROSJEAN**  
**LIBRAIRE**  
**Place Stanislas, 7.**

**1867.**



**COURS ÉLÉMENTAIRE**  
**DE**  
**CULTURE DES BOIS.**

---

Nancy, imprimerie de v° Raybois, rue du faubourg Stanislas, 3.



**COURS ÉLÉMENTAIRE**  
**DE**  
**CULTURE DES BOIS**

**CRÉÉ A L'ÉCOLE FORESTIÈRE DE NANCY**

**PAR M. LORENTZ**

DIRECTEUR-FONDATEUR DE CETTE ÉCOLE, ANCIEN ADMINISTRATEUR DES FORÊTS,  
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,  
MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ IMPÉRIALE CENTRALE D'AGRICULTURE, ETC.

**COMPLÉTÉ ET PUBLIÉ**

**PAR A. PARADE**

CONSERVATEUR DES FORÊTS, DIRECTEUR DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE FORESTIÈRE.

---

**CINQUIÈME ÉDITION**

**PUBLIÉE PAR A. LORENTZ ET H. NANQUETTE**

**AVEC UNE PRÉFACE**

**PAR L. TASSY**

---

**PARIS**

**M<sup>me</sup> V<sup>e</sup> BOUCHARD-HUZARD**

**LIBRAIRE**

**Rue de l'Éperon, 5.**

**NANCY**

**NICOLAS GROSJEAN**

**LIBRAIRE**

**Place Stanislas, 7.**

---

**1867.**



## PRÉFACE.

---

Le COURS DE CULTURE de MM. Lorentz et Parade peut se passer de recommandation, pour continuer à faire son chemin dans le monde. La réputation qu'il s'est acquise le lui permet. Aussi, quand j'ai accepté la tâche d'écrire une préface pour l'édition qu'on en publie aujourd'hui, n'ai-je pas pris l'engagement d'en signaler tous les mérites, engagement qui d'ailleurs m'eût mené trop loin et que je n'aurais pu remplir au gré de mes désirs. J'en ai fait l'expérience dans ma notice sur M. Parade. J'ai voulu seulement ne pas manquer l'occasion de rendre un nouvel hommage à deux hommes dont, comme tous ceux qui ont eu des rapports avec eux, je vénère profondément la mémoire, et pour cela, rappeler en peu de mots les bienfaits que nous leur devons.

La première édition du Cours de culture a paru en 1837. — L'Ecole forestière était fondée depuis

1824. Le code forestier et l'ordonnance réglementaire avaient été promulgués en 1827. La loi et l'administration avaient fait ce qu'il leur appartenait de faire pour la régie des forêts. Il restait à formuler et à publier les règles de culture les plus propres à féconder ce vaste domaine, règles professées par M. Lorentz, mais jusqu'alors au profit exclusif des élèves.

Je l'ai fait observer ailleurs : Les matériaux nécessaires pour ce travail étaient fort incomplets et dépourvus de liens, au moins dans notre pays. Plus nombreux en Allemagne, ils y avaient été réunis en corps de doctrine, en traités spéciaux, très-estimés et très-estimables ; mais ces traités ne convenaient ni au climat ni à la flore de la France, ni aux mœurs de ses habitants, et j'ajouterai, ni à leur esprit, esprit logique s'il en fut et très-exigeant en fait de méthode et de clarté.

MM. Lorentz et Parade connaissaient tout ce qui avait été écrit sur la matière ; ils possédaient en outre un fonds précieux d'observations et d'expérience personnelles, beaucoup d'élévation dans les idées et beaucoup de précision dans l'esprit. Nul mieux qu'eux ne pouvait mener à bien la difficile entreprise de fixer dans un livre les principes de la science forestière. Aussi leur ouvrage

obtint-il dès la première édition un grand et légitime succès.

Cet ouvrage a été amélioré. Il devait l'être. Si l'on compare la dernière édition à la première, on la trouvera beaucoup plus volumineuse. Toutefois, la différence ne porte que sur des objets secondaires. Les auteurs ont perfectionné l'œuvre sans en modifier l'ordonnance, les proportions, l'harmonie, sans en altérer les théories générales, et ainsi a été réalisée leur intention, de donner aux forestiers une constitution immuable dans ses bases essentielles et néanmoins perfectible. On n'a peut-être pas assez remarqué cela, tant ce qui est juste paraît facile à concevoir, tant il est rare qu'on se rende compte de ce qu'il en coûte à un écrivain pour atteindre au vrai, au naturel.

*Production soutenue, régénération naturelle, amélioration progressive*, tel est le but de la culture des bois, disent MM. Lorentz et Parade dans l'introduction de leur cours; cette définition est excellente :

*La production soutenue*, quoique certains cas particuliers autorisent des exceptions, est une des conditions principales d'une exploitation rationnelle. Sans elle, il ne saurait y avoir de bonne économie domestique ou publique, et les générations futures seraient privées de toute garantie.



*La régénération naturelle* est, au point de vue cultural, la fin que doivent poursuivre les forestiers. Le cours de culture a maintenu fermement ce précepte dans ses éditions successives, malgré les tentatives qui voulaient le lui faire abandonner. Pour moi, tout en rendant justice à l'intelligence, à la capacité et aux intentions des agents forestiers qui ont fait ces tentatives, je pense, conformément aux leçons de nos illustres maîtres, que le forestier doit aider, *utiliser* autant que possible les agents naturels, sans jamais chercher à les remplacer, et je regarde les repeuplements artificiels, quand ils ne sont pas imposés par les circonstances, comme un vol fait à la nature, vol — qu'on me pardonne la vivacité du mot — qui peut avoir les plus graves conséquences.

*L'amélioration progressive* est un but commun à toutes les branches de l'industrie; mais elle est particulièrement recommandable en sylviculture, parce que les spéculations n'y sont bornées par aucune limite de temps, parce que les moindres négligences s'y traduisent souvent par des pertes irréparables, tandis que les moindres soins donnés à propos, y sont susceptibles des résultats les plus avantageux. S'il est vrai de dire que les petites causes peuvent engendrer de grands effets,

c'est surtout pour les forêts : personne n'ignore qu'il suffit d'un insecte gros comme la tête d'une épingle pour en compromettre l'existence. Mais par ces mots, *amélioration progressive*, MM. Lorentz et Parade ont voulu tenir les agents forestiers en garde contre les témérités; ils leur conseillent de procéder avec lenteur, circonspection, comme ils l'ont fait eux-mêmes pour améliorer leur cours. Dans ce cours, ils ne préjugent rien; ils n'avancent que des aphorismes incontestables. Ils n'ont demandé à la science que ce qu'elle pouvait leur donner au moment où ils écrivaient; ils ne lui ont ni demandé les secrets de la vie qu'elle ne pénétrera d'ailleurs jamais, ni emprunté des hypothèses incertaines; ils n'exposent que des faits positifs, et sous ce rapport les moindres particularités ont été soumises à la critique la plus rigoureuse.

Maintenant, sans pousser plus loin une analyse dont le lecteur n'a pas besoin, je résumerai mes impressions en disant : qu'intéressant et indispensable pour les fonctionnaires chargés de la régie des forêts de l'Etat et des communes, le livre de MM. Lorentz et Parade l'est également pour les particuliers propriétaires de bois; qu'il ne néglige aucun détail de culture et qu'il laisse néanmoins

en relief les hautes considérations basées sur les rapports des forêts avec l'intérêt général; qu'il fait voir enfin les liens nombreux par lesquels la sylviculture proprement dite se rattache aux autres sciences, et qu'il les fait voir avec une méthode et une netteté, qui ne permettent pas de se méprendre sur leur nature et sur leur importance.

L'opinion, du reste, l'opinion même des personnes étrangères au corps forestier a classé depuis longtemps ce livre au rang des plus utiles.

Que l'on interroge les particuliers; ils reconnaîtront qu'ils y ont trouvé tous les renseignements qui leur sont nécessaires et que, si leur intérêt comme propriétaires n'est pas d'adopter les exploitabilités reculees, leur devoir comme citoyens est de les préconiser.

Que l'on interroge les physiciens, les naturalistes; ils constateront que dans aucun autre ouvrage on n'a fait une application plus intelligente, plus judicieuse, plus prudente et plus exacte des sciences à la culture du sol.

Que l'on interroge les hommes d'état, les économistes, en un mot, tous ceux qui songent aux moyens d'augmenter les richesses sociales; ils répondront que c'est dans ce traité qu'ils ont puisé

leurs notions, leurs lumières sur les services que les forêts rendent aux sociétés.

Mais s'il en est ainsi, on ne doit point s'étonner de la popularité dont les forêts jouissent dans notre pays et de l'émotion qui s'est manifestée toutes les fois que dans ces derniers temps leur conservation a paru menacée. Cette popularité, ce sont MM. Lorentz et Parade qui ont beaucoup contribué à la faire. Cette émotion ce sont eux qui l'ont justifiée.

Voilà quelques-uns des titres qui assurent à ces deux forestiers la reconnaissance de leurs concitoyens. Arrivés dans ce monde l'un à la fin du siècle dernier (25 juin 1775), l'autre au commencement de celui-ci (11 février 1802), à une trentaine d'années de distance, ce fut là un fait providentiel, s'il est permis de qualifier ainsi certains événements plutôt que d'autres. En effet, s'il fallait la hardiesse et la résolution de M. Lorentz pour tailler à l'économie forestière, dans le monument de la régénération sociale, la place à laquelle elle pouvait prétendre, il fallait la prudence, le tact et la patience de M. Parade pour que cette place ne fut point amoindrie par la réaction malheureuse qui fit rentrer prématurément M. Lorentz dans la vie privée; et si celui-ci, par exemple, a

eu la glorieuse initiative d'affirmer hautement la supériorité du régime de la futaie sur le régime de taillis, son successeur n'a pas moins bien mérité de son pays en parvenant à maintenir ce principe, malgré tous les efforts qui ont été faits pour l'ébranler.

Grâce aux auteurs du Cours de culture, il n'y a qu'une voix aujourd'hui sur les inconvénients du taillis, non-seulement dans les bons, mais aussi, mais surtout, dans les mauvais sols. Les idées sur ce point capital ont subi un revirement complet, revirement fort heureux ; car l'éducation des futaies, c'est la régénération des forces naturelles, c'est la richesse de nos descendants.

Les âges de MM. Lorentz et Parade étaient donc échelonnés de manière à favoriser l'accomplissement de la mission à laquelle ces forestiers s'étaient dévoués.

En exposant, ainsi que je viens de le faire, en quoi consistait cette mission et comment elle a été remplie, je suis loin cependant d'avoir montré toutes les qualités, d'avoir énuméré tous les services des deux hommes éminents que l'on a proclamés, avec raison, les fondateurs de la sylviculture française. Le deuil extraordinaire que leur mort a occasionné ne s'expliquerait pas suffi-



samment, si leurs actes n'avaient eu pour résultat que d'améliorer l'état de nos forêts. Il s'explique encore par des causes essentiellement morales qui les honorent autant que leurs talents comme forestiers et administrateurs :

En dehors de ce mouvement d'idées et d'affaires dont s'occupent les journaux périodiques et qui répand tant d'éclat, il y en a un autre aussi fécond, aussi intéressant, quoiqu'il attire moins l'attention, et qui fournit au plus chaud patriotisme l'occasion de s'exercer efficacement. MM. Lorentz et Parade en ont donné par leur vie un touchant témoignage. Ils ont aimé et servi la chose publique autant qu'on peut l'aimer et la servir, et pourtant il s'est fait peu de bruit autour de leurs noms. Ah! c'est qu'ils n'ont pas cherché la célébrité. Ils se sont enfermés dans leurs attributions. C'est la meilleure règle de conduite à suivre pour celui qui veut utiliser son séjour ici-bas. Ils ont consacré à leurs fonctions, sans aucune préoccupation d'intérêt personnel, tout ce qu'ils avaient d'intelligence, de cœur et de forces physiques. Tel est le spectacle qu'ils ont offert avec une modestie parfaite, avec une foi inébranlable, et tel est l'empire, telle est la force d'attraction de la simplicité dans le vrai, dans la vertu,

que leurs élèves ont tous été pénétrés du même amour et du même zèle pour la prospérité de leur pays, et se sont sentis frappés, par la perte de leurs maîtres, dans leurs affections les plus vives. Exemple consolant de l'heureuse influence du devoir accompli. Que chacun profite de cet exemple; que chacun s'applique à faire autour de lui tout le bien qu'il pourra, à remplir sans essayer d'aller au delà, aussi complètement que possible, la tâche qui lui aura été dévolue. C'est là la bonne morale. L'avenir des sociétés est intéressé à ce qu'on ne s'en écarte pas.

Il me reste, avant de terminer cette préface, à indiquer les améliorations apportées par MM. Adolphe Lorentz et Henri Nanquette à l'édition qu'ils publient aujourd'hui. Ces messieurs ont respecté l'œuvre des maîtres. Ils ont pensé que telle elle avait été laissée par ses auteurs, telle elle devait paraître devant la postérité. On leur saura gré de cette délicatesse; mais c'eût été méconnaître les conseils, les désirs de MM. Lorentz et Parade que de ne pas mettre les lecteurs au courant des découvertes, des progrès sylvicoles, survenus depuis la précédente édition du Cours de culture. Aussi MM. Lorentz et Nanquette ont-ils inséré dans la présente édition un appendice.

Cet appendice contient, entre autres objets, deux monographies nouvelles : celles du chêne chevelu et du chêne occidental ; une note sur l'utilité de pratiquer par contenance des coupes préparatoires à l'ensemencement dans les sapinières et en général dans les peuplements dont l'essence dominante est susceptible de supporter longtemps le couvert ; des observations sur la régénération du pin sylvestre ; une méthode d'aménagement pour les forêts où le jardinage doit être conservé, et divers articles sur le traitement des forêts soumises au régime du taillis composé.

Les liens de parenté et de collaboration qui unissaient MM. Adolphe Lorentz et Henri Nankette aux deux forestiers dont ils ont réimprimé le livre, disent assez que, dans leur appendice, ils se sont inspirés des doctrines de nos vénérés maîtres, et que ce sont encore ceux-ci qui vont nous parler par leur intermédiaire.

L. TASSY.

Aix, mars 1867.



# PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

---

Le livre que je publie, ainsi que l'indique son titre, n'est pas de moi. M. Lorentz en avait traité presque toutes les parties, lorsque, en 1830, il fut appelé au poste d'administrateur des forêts à Paris. Chargé, depuis cette époque, de professer à l'Ecole forestière le cours de Culture des bois que M. Lorentz y avait créé, je suis devenu dépositaire de ses cahiers et de ses notes ; aidé de ces dernières, j'ai continué son travail et complété l'ouvrage en lui faisant revêtir une forme entièrement élémentaire. M. Lorentz l'a revu et m'a autorisé à le publier.

La forme élémentaire devenait indispensable pour que notre travail atteignît son but principal, qui est d'enseigner la théorie d'une science de faits à des jeunes gens auxquels souvent l'idée même des forêts, qui en sont l'objet, est entièrement étrangère. Or, il est à remarquer que, sous ce rapport, aucun des auteurs forestiers français ne pouvait



nous servir, quelque profonds qu'ils aient été d'ailleurs ; car, pour les lire avec fruit, il faut déjà connaître les forêts, y avoir pratiqué pendant un certain temps sous un guide éclairé, et, de plus, être familiarisé avec les expressions techniques, toutes choses qui manquent aux élèves lors de leur entrée à l'Ecole.

Les ouvrages allemands sur la matière, même les plus estimés, ne laissent guère moins à désirer quant à la forme, parce qu'il est à peu près de règle en Allemagne que, pour suivre les cours des écoles forestières, on doit avoir acquis d'abord les éléments de la science par la pratique. La traduction d'un de ces traités ne pouvait donc pas davantage satisfaire au besoin particulier de notre enseignement ; et d'ailleurs, un ouvrage allemand eût toujours présenté le double inconvénient de ne pas tenir compte de l'état actuel de nos forêts, en raison du traitement qu'elles ont subi jusqu'ici, et d'être inapplicable, sous plus d'un rapport, au sol et au climat de la France, ainsi qu'aux besoins de ses habitants et de son gouvernement.

Sans doute on ne saurait écrire aujourd'hui sur la culture des forêts, sans puiser dans les ouvrages des auteurs allemands, de même que ceux-ci ont profité des travaux de leurs devanciers, parmi lesquels la France peut citer avec orgueil les Buffon, les Duhamel, les Réaumur, et les Varenne de Fenille. Aussi nous faisons-nous un devoir de reconnaître publiquement ici tout le fruit que nous avons tiré de l'étude des livres allemands, surtout de ceux de *Hartig* et de *Cotta* auxquels la science forestière doit, en grande partie, le degré de perfection qu'elle a atteint de nos jours.

Quoique notre livre soit écrit plus particulièrement pour

les élèves de l'Ecole forestière, nous espérons cependant qu'il n'en sera pas moins d'une utilité réelle aux agents forestiers, ainsi qu'aux propriétaires de bois et aux autres personnes curieuses d'acquérir quelques connaissances positives sur une des parties les plus importantes de l'agronomie. Ils y rencontreront, sous une forme qu'on s'est efforcé de rendre simple et claire, les principes les plus essentiels de l'économie forestière, corroborés et éclairés par une expérience de plus de trente ans entièrement consacrée au service des forêts.

Toutefois on se tromperait, si l'on s'attendait à trouver dans cet ouvrage des règles de conduite pour tous les cas que peuvent offrir les forêts. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de livre qui puisse dispenser le forestier d'être observateur attentif et intelligent de la nature. Ce que l'on peut faire dans un ouvrage élémentaire, c'est de présenter avec exactitude et netteté les principaux faits qui composent la science, de les apprécier et de les grouper avec justesse et clarté, enfin de conclure avec prudence.

Lorsque la théorie est conçue dans un tel esprit, elle devient véritablement la base et l'utile auxiliaire de la pratique, loin d'être, comme on l'a quelquefois prétendu, son antagoniste. Dépourvue de toute théorie, la pratique, en culture forestière comme en toute autre matière d'ailleurs, ne saurait être qu'une routine plus ou moins incertaine, plus ou moins obscure; de même que, sans l'expérience et sans une certaine habitude des opérations matérielles, la théorie la mieux établie peut conduire aux plus graves méprises. C'est donc une *pratique raisonnée* ou l'union intime de la pratique avec la théorie qui constitue le forestier vraiment instruit.

II

PRÉFACE.

Si notre livre peut contribuer à faire comprendre de tous cette utile vérité, il aura atteint le but que nous nous sommes proposé en le publiant.

PARADE.

Nancy, 1<sup>er</sup> mai 1837.

# PRÉFACE

DE LA TROISIÈME ÉDITION.

---

Depuis plusieurs années déjà, la seconde édition du *Cours élémentaire de culture des bois* est entièrement épuisée.

Des circonstances indépendantes de notre volonté ont fait différer jusqu'aujourd'hui la publication d'une édition nouvelle que nous tenions à ne pas livrer au public, sans y avoir apporté les améliorations et les compléments dont dix-huit années d'expérience et d'étude nous avaient successivement démontré l'utilité.

Le lecteur, qui voudra bien comparer notre nouveau livre avec l'ancien, jugera si nous avons rempli la tâche que nous nous étions imposée. Nous affirmons du moins, que nous avons fait, dans ce but, de sérieux et constants efforts, sans, toutefois, que nous osions nous flatter d'y être entièrement parvenu.

Toute science expérimentale, on le sait, doit passer, en progressant, par trois phases principales. Dans la première, les faits les plus marquants s'observent, se constata-

tent et sont recueillis. La seconde est employée à les grouper, à les coordonner et à en déduire des vérités fondamentales, des théories générales qui relient toutes les parties entre elles, les constituent en corps de doctrine et en forment un édifice didactique. Dans la troisième phase enfin, la théorie doit se compléter, se perfectionner sans cesse, soit au fond, soit dans la forme, en s'enrichissant d'observations et de faits nouveaux.

C'est cette troisième phase que la sylviculture française nous paraît avoir atteinte désormais, quoique, à la vérité, elle ne s'y soit avancée que bien timidement jusqu'alors et, presque, d'un pas chancelant. Ce n'est pas cependant que ses nombreux adeptes, répandus aujourd'hui sur tous les points du territoire de l'Empire, ne fussent en mesure de fournir un riche butin, si chacun d'eux, se croyant tenu de quelque obligation envers la science, avait à cœur d'acquitter sa dette, ainsi qu'on le voit dans d'autres corps administratifs, par exemple, dans ceux des mines et des ponts et chaussées. Qu'il nous soit permis de regretter que l'administration des forêts n'ait pas suivi la voie tracée dès longtemps par ces corps d'élite.

On se tromperait pourtant si l'on prenait ce que nous venons de dire pour un reproche adressé au personnel forestier. Cette pensée est loin de nous. Les circonstances, nous le savons, ne lui ont pas permis de faire plus qu'il n'a fait, et nous connaissons d'ailleurs, autant que qui que ce soit, quelle est sa valeur, et ce que l'on peut attendre de lui. Nous n'avons voulu que constater un fait : c'est que, après avoir parcouru, depuis le milieu du siècle dernier jusqu'à nos jours, les deux premières phases de progrès dont nous avons parlé, la sylviculture française est aujour-

d'hui presque stationnaire ; parce que, en raison du point où elle est parvenue, c'est surtout aux praticiens de tout ordre et de tout degré qu'il appartient de produire les matériaux qui puissent la faire avancer dans sa marche ; mais, faute de certaines conditions favorables à leur émission, ces matériaux restent trop généralement enfouis dans la mémoire ou dans les cartons de ceux qui ont consacré une partie notable de leur laborieuse carrière à les rassembler.

En vain dirait-on que c'est principalement aux hommes voués à l'enseignement d'une science qu'il appartient de la faire progresser. Ce serait là une idée tout à fait erronée, lorsqu'il s'agit d'une science d'application qui ne peut être assise solidement que sur le terrain de l'expérience. Les hommes d'enseignement sont évidemment moins bien placés que les praticiens proprement dits pour observer et recueillir les faits de toute nature que la culture et l'exploitation de nos forêts présentent en si grand nombre. Et d'ailleurs, ils ont une autre mission, non moins importante : celle de garder et de nourrir la théorie, ce fonds commun de tous, en faisant passer au creuset de leurs méditations les travaux de la pratique, afin de ne les admettre dans l'enseignement élémentaire qu'après les avoir soumis à l'épreuve d'un raisonnement rigoureux, et, s'il y a lieu, d'une expérimentation savante.

Nous le disons donc en toute sincérité : cette troisième édition de notre livre serait et plus complète et meilleure si, pendant la longue période qui s'est écoulée depuis la publication des deux premières, les forestiers (et par là nous entendons tous les hommes qui s'occupent de sylviculture, qu'ils appartiennent ou non à l'administration publique)

avaient eu, autant qu'il l'eût fallu, la volonté ou la faculté de rendre compte de leurs travaux.

Espérons mieux de l'avenir. Sous un gouvernement qui veut sérieusement le développement de toutes les forces du pays et qui se glorifie, à juste titre, de féconder toutes les sources de la prospérité nationale, sous un tel régime, on ne saurait manquer d'apprécier à leur valeur les précieuses richesses que recèlent encore les forêts de la France, et de rendre justice aux hommes qui sauront les faire fructifier en même temps qu'ils s'appliqueront à perfectionner et à étendre l'art du sylviculteur.

En terminant, nous sommes heureux de pouvoir informer nos lecteurs que cette édition du *Cours de culture des bois* a été, comme les précédentes, soumise au jugement éclairé du forestier illustre qui eut, il y a trente ans, l'insigne honneur de créer l'enseignement de la sylviculture à l'École forestière et chez lequel les années n'ont refroidi ni le zèle ni le dévouement pour les forêts et leur prospérité.

PARADE.

Nancy, le 20 février 1855.

*Trentième anniversaire de l'inauguration de l'École impériale forestière.*

# PRÉFACE

DE LA QUATRIÈME ÉDITION.

---

*Multum egerunt qui ante nos fuerunt,  
sed non peregerunt.*

Ceux qui nous ont précédé ont beaucoup  
fait, mais ils n'ont pu rien parfaire.  
SÉNÈQUE.

Lorsque, il y a 30 ans, l'illustre fondateur de l'École forestière, M. LORENTZ, après avoir créé dans cet établissement l'enseignement sylvicole, fut appelé au poste d'Administrateur des Forêts, à Paris, il me fit l'insigne honneur de me désigner au choix de l'Administration supérieure pour lui succéder dans la chaire qu'il avait occupée avec tant d'éclat. En même temps, il me confia les cahiers qu'il avait rédigés, me chargea de les compléter et de mettre le tout en état d'être publié.

Aidé et soutenu par les conseils du maître, je consacrai sept années à ce travail qu'il voulut bien revoir et approuver.

Telle est l'origine du *Cours élémentaire de culture des bois*, dont je donne aujourd'hui la quatrième édition.

J'ai apporté tous mes soins à améliorer cette édition; je l'ai augmentée de nombreux détails sur les essences encore imparfaitement observées, de considérations nouvelles sur les particularités inhérentes aux divers modes d'exploitation. Ces additions ne seront pas, je l'espère, sans intérêt



pour le lecteur ; je les dois, en partie, au concours de plusieurs forestiers qui ont bien voulu répondre à l'appel que je faisais à mes confrères dans la préface de la troisième édition. Je leur adresse ici, au nom de la sylviculture, mes publics remerciements.

C'est que, en effet, ainsi que nous l'avons fait remarquer antérieurement, les sciences d'application et la culture des bois en particulier, ne sauraient progresser sérieusement, désormais, sans ce concours soutenu de la pratique et de la théorie : la première recueillant soigneusement tous les faits dignes d'attention ; la deuxième les rattachant, après mûr examen, au trésor commun ; celle-ci se rappelant constamment le mot si profond et si vrai rapporté par DE CANDOLLE, *que le point d'interrogation est la clef de toutes les sciences* ; l'autre, reconnaissant avec VARENNE DE FENILLE, « que l'étude des bois est immense, et que, malgré » tous les travaux dont elle a été l'objet, l'histoire naturelle » des arbres est encore presque à faire. »

Ce sont donc des monographies forestières de plus en plus détaillées, de plus en plus complètes qu'il nous importe aujourd'hui d'obtenir des praticiens ; elles seules feront faire à la théorie des pas rapides et assurés.

L'époque, éloignée déjà, à laquelle remonte l'apparition de notre livre, nous dispense sans doute de justifier ici, de nouveau, la forme élémentaire que nous avons cru devoir lui faire revêtir, tant dans l'intérêt de l'enseignement auquel il est spécialement destiné, que dans celui de la science elle-même, qu'il s'agissait alors, en quelque sorte, de constituer.

Mais, si nous croyons superflu d'insister sur un point qui, d'ailleurs, ne semble avoir donné lieu à aucune objection

grave, nous éprouvons, d'un autre côté, le besoin de répondre à quelques critiques qui, pour ne pas s'être produites par la presse, n'en sont pas moins dignes d'attention et méritent d'être examinées.

On a dit :

« Le Cours de culture des bois devait sans doute admettre dans son cadre tous les modes d'exploitation, mais on peut reprocher à ce livre d'avoir accordé aux méthodes du taillis et à celle de la futaie le même soin, les mêmes développements et pour ainsi dire le même intérêt. Par l'excellence de son but et par la perfection des procédés qu'il emploie, ce dernier régime méritait seul d'être mis en lumière par une sylviculture avancée. L'enseignement de l'Ecole forestière ne s'adressant d'ailleurs qu'à des fonctionnaires destinés à gérer les forêts de l'Etat et des communes devait, avec d'autant plus de raison, reléguer à l'arrière plan des méthodes qui rappellent trop l'ignorance des temps passés et l'enfance de l'art. »

Et d'abord, en ce qui concerne le dernier point, nous ferons remarquer que, dans toutes les spécialités (industrie, constructions, agriculture, etc.) où l'agent de l'Etat est placé parallèlement au particulier, l'opinion publique, en France du moins, exige du premier une instruction plus étendue et plus approfondie, parce qu'elle le considère comme étant en quelque sorte le modèle et le conseiller naturel du second.

Or, pour juger du mérite relatif des différents systèmes qui se sont produits dans une science et pour en faire une saine application, la condition indispensable est évidemment de les avoir étudiés tous à fond et sans opinion préconçue. Cette vérité nous paraît inattaquable.

En outre, bien que l'Ecole forestière ait été instituée surtout pour former des agents de l'Etat, rien n'empêche

cependant qu'elle ne puisse servir aussi à donner, aux particuliers propriétaires de bois, l'instruction qui leur fait défaut et dont l'utilité est mieux comprise à mesure que les produits ligneux acquièrent plus de valeur. Il y a lieu de penser, au contraire, que, cédant aux réclamations qui s'élèvent de toutes parts depuis quelque temps, le Gouvernement jugera bientôt le moment venu de faire dans cet établissement ce qu'il a fait dans d'autres écoles de service public, et d'admettre les particuliers à venir y puiser, en qualité d'élèves libres, les connaissances spéciales reconnues nécessaires pour gérer avec intelligence les importantes propriétés placées entre leurs mains (1).

Dès lors, et à tous les points de vue, notre enseignement ne se trouvera-t-il pas justifié ?

Un livre *élémentaire*, qu'on nous permette de le rappeler en terminant, n'est point un ouvrage destiné à faire triompher telle ou telle doctrine à l'exclusion des autres. Le devoir de l'auteur est de les examiner toutes avec impartialité, de faire ressortir le côté faible aussi bien que les avantages de chacune, enfin, de montrer, dans un avis motivé, à laquelle appartiennent ses préférences.

Nous nous sommes efforcé de suivre cette marche dans la rédaction du Cours de culture des bois, et nous croyons n'avoir failli, en l'adoptant, ni à notre mission, ni à nos convictions.

PARADE.

Nancy, avril 1860.

---

(1) Le sol forestier de la France a une étendue de 8,587,174 hect. qui se décompose ainsi qu'il suit :

A l'État.....	1,144,231	hect.
Aux communes et aux établissements publics.....	1,874,000	—
Aux particuliers.....	5,568,943	—

COURS ÉLÉMENTAIRE  
DE  
CULTURE DES BOIS.

---

INTRODUCTION.

*L'Économie forestière* comprend l'ensemble des connaissances nécessaires à l'administration la mieux entendue des forêts, eu égard aux intérêts du propriétaire en particulier et à ceux du pays en général.

Cette science est complexe. Elle emprunte aux mathématiques, à la physique et à la chimie, à l'histoire naturelle, au droit et à l'éco-



## LIVRE PREMIER.



---

---

## LIVRE PREMIER.

---

DES CLIMATS, DES SOLS, DES ESSENCES.

---



### DÉFINITIONS (1)

1. On entend par *climat* l'état de l'atmosphère d'un lieu donné du globe, eu égard à sa température, à son degré d'humidité et aux courants qui s'y agitent.

2. La distance d'un lieu à l'équateur, ou sa latitude, détermine son *climat géographique*, tandis que son *climat physique* ou *local* dépend plus particulièrement de sa *situation* et de son *exposition*.

3. Pour nous, la *situation* d'un lieu se détermine

---

(1) Les définitions placées en tête de chaque livre sont celles des termes techniques contenus dans son texte.



eu égard à l'élévation au-dessus du niveau de la mer et à la configuration terrestre.

4. L'*exposition* est l'inclinaison d'un terrain vers un point donné de l'horizon.

5. On appelle *terre végétale* la couche supérieure du globe, pénétrable aux racines des plantes, *terreau* la partie de cette couche formée par le détritius des matières végétales, plus ou moins décomposées, et *humus* les substances solubles contenues dans ce terreau.

6. Les diverses modifications que subit, dans sa composition, la terre végétale, constituent les différents *sols* ou *terrains*.

7. On appelle *arbre* la plante dont la tige est ligneuse, nue et simple par le bas, et qui est susceptible d'atteindre au moins la hauteur de 8 à 10 mètres (1); *arbrisseau*, la plante à tige ligneuse qui n'atteint pas la hauteur de 5 mètres et se ramifie près de sa base; *arbuste*, la plante ligneuse dont les bourgeons ne paraissent qu'au printemps, et qui ne s'élève guère au delà d'un mètre.

8. *Essence* est synonyme d'espèce, et s'applique aux bois. Sous le terme d'*essences forestières*, on comprend toutes les espèces de bois qui se rencontrent dans les forêts.

9. On qualifie d'*espèce* une collection de végétaux

---

(1) Pour ces définitions, voyez la *Théorie élémentaire de la Botanique*, par de Candolle.

semblables entre eux, semblables à leurs parents et dont les produits leur ressemblent.

La *variété* est une légère altération de l'espèce dont les caractères ne se perpétuent pas généralement par la graine. Cependant, il est quelques variétés constantes appelées *racés* dont l'origine est due à des influences de sol et de climat, et dont les caractères différentiels se maintiennent aussi longtemps que les causes qui les ont produits.

La *variation* ou sous-variété est une modification de l'espèce, moins importante et moins constante que la variété.

10. La reproduction naturelle des arbres s'opère par les fruits. Les fruits sont produits par les fleurs.

Les fleurs sont essentiellement composées de deux sortes d'organes; les premiers, appelés *étamines*, représentent le sexe mâle et ont pour mission de féconder les seconds que l'on nomme *pistils* ou *carpelles* et qui constituent le sexe femelle.

La floraison des arbres se présente de plusieurs manières. Elle est *hermaphrodite*, quand les deux sexes sont réunis sur la même fleur; *monoïque*, quand les fleurs unisexuées, sont réunies sur le même individu; *dioïque*, quand les fleurs, également unisexuées, sont séparées, suivant le sexe, sur des individus différents; et enfin, *polygame*, lorsque les fleurs mâles, femelles ou hermaphrodites, se trouvent sur le même individu ou sur des individus différents.

11. Sous le rapport de leur enracinement, on divise les essences forestières en *pivotantes* et *traçantes*, selon que leurs racines ont une tendance marquée à s'enfoncer dans la terre ou à s'étaler superficiellement.

Il est à remarquer que le *pivot* proprement dit, c'est-à-dire, la racine centrale formant dans le sol le prolongement direct de la tige, est un organe dont le développement n'est très-prononcé que dans la première jeunesse de l'arbre. Plus tard, il s'arrête dans sa croissance, alors même qu'il ne rencontre pas d'obstacle à son allongement, pour se ramifier ou pour faire place à des racines nouvelles qui sont tantôt *plongeantes* (*pivotantes*) tantôt *traçantes*, selon la nature des essences et la profondeur des sols.

Les ramifications extrêmes, fines et nombreuses des racines, terminées par les *spongioles*, se nomment *chevelu*; ce sont les seuls organes d'absorption.

12. On nomme *brin de semence* ou seulement *brin*, l'arbre qui provient directement d'une semence; *rejet*, celui qui prend naissance sur une souche dont la tige a été coupée; *drageon*, celui qui s'élève sur une racine, et qui, séparé naturellement ou artificiellement de la souche mère, est susceptible de former un nouvel individu.

13. Un assemblage considérable de brins, de rejets ou de drageons, se nomme *recru* ou *repeuplement*. Toutefois, ce dernier terme désigne plus particulièrement un assemblage de brins, tandis que l'autre s'applique de préférence aux rejets et aux drageons.

14. Les produits des forêts se rangent en diverses catégories et reçoivent différentes dénominations, selon les emplois auxquels les bois sont propres.

A. BOIS DE FEU OU DE CHAUFFAGE. On le façonne de quatre manières différentes, savoir :

1° En *bois de quartier*, ou bûches refendues;

2° En *bois de rondin*, ou bûches non fendues, moins grosses que les précédentes;

3° En *fagots*, ou faisceaux composés de ramilles, de branches et de quelques rondins ou quartiers;

Et 4° enfin, en *bourrées*, ou faisceaux renfermant exclusivement du menu bois.

Dans le commerce, on appelle plus spécialement *bois de corde* les bois de quartier et de rondin.

B. BOIS D'OEUVRE. Sous cette dénomination, on comprend les bois de tous les emplois autres que le chauffage. Ils se divisent en :

1° *Bois de service*, qui comprennent les bois de constructions civiles et navales;

2° *Bois de travail* ou *d'ouvrage*, comprenant les bois employés par différents métiers, tels que la menuiserie, l'ébénisterie, le charonnage, la tonnellerie, la fabrication des sabots, etc.

Parmi les bois de travail, on distingue les *bois de fente*; on nomme ainsi ceux dont l'emploi exige le procédé de la fente. Tels sont les douves de tonneaux, de cuves, etc.; les échelas, les lattes, les cerches ou planchettes très-minces (5 millimètres et moins d'épaisseur) dont on fait les bordures des

tamis, les boisseaux et autres mesures, etc. C'est encore avec des bois de fente que l'on fait des panneaux de soufflet, des pelles à four et autres, des attelles de collier, des bâts, des arçons de selle, des rames et des gournables ou chevilles employées pour fixer les bordages à la membrure des vaisseaux.

Pour qu'un bois puisse servir à la fente, il faut qu'il ait une texture égale, que ses fibres longitudinales soient parfaitement droites, apposées régulièrement les unes contre les autres, et qu'il soit exempt de nœuds et de tout autre accident de croissance.

On appelle *bois merrain* le bois de fente destiné plus particulièrement à la fabrication des douves.

Les *bois de sciage* sont ceux qu'on débite à la scie en planches de différentes dimensions.

15. On nomme *panage* le parcours des porcs dans les forêts pour s'y nourrir de glands ou de fâines.

Certaines forêts sont grevées du droit de panage à titre onéreux ou gratuit.

---

## CHAPITRE PREMIER.

---

### BUT ET DIVISION DE CE LIVRE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Des études qu'il embrasse et de leur ordre naturel.

16. Une culture raisonnée a toujours pour base l'étude des influences sous l'action desquelles elle doit s'exercer. Ces influences tiennent aux propriétés des objets mêmes auxquels s'applique cette culture et aux propriétés des objets extérieurs. L'étude qui doit servir de base à la culture des Bois, ne se borne donc pas aux Bois mêmes, c'est-à-dire, aux essences qui composent les Forêts; elle doit embrasser encore les climats sous lesquels celles-ci végètent, et les sols qui les supportent. Toutefois, les essences forment l'objet principal de cette étude, et ce sont elles, par conséquent, qui devraient nous occuper d'abord. Mais il est à remarquer que les climats et les sols sont entièrement indépendants des essences, tandis que la réciproque n'a évidemment pas lieu. Ce sera donc nous conformer

à l'ordre naturel que d'étudier d'abord les climats et les sols, et de passer seulement ensuite aux essences.

## ARTICLE II.

## De l'étude des Sols et des Climats.

17. L'étude des climats et des sols, ainsi que nous venons de le faire remarquer, n'est qu'accessoire pour nous, car elle ne nous importe qu'en raison de l'action immédiate qu'ils exercent sur la végétation; nous nous bornerons donc à ce qui est indispensable pour faire connaître cette action.

18. Nous étudierons d'abord les climats en cherchant quelles sont les influences générales dont ils dépendent, et quelle action ils exercent à leur tour sur la végétation; puis, les divisant en climats de plaines et en climats de montagnes, nous apprendrons à connaître les phénomènes atmosphériques particuliers aux plaines, aux vallées, aux versants et aux plateaux, et l'influence de ces phénomènes sur la végétation. Nous serons conduits de là à prendre en considération l'exposition et les caractères propres aux quatre principaux aspects du soleil.

19. Pour les sols, nous étudierons d'abord les qualités qu'ils doivent présenter pour être favorables à la végétation, et la part qu'ils ont dans le phénomène de la nutrition. Nous examinerons ensuite

leur composition, et les propriétés particulières à leurs principaux composants. Du sol lui-même, nous descendrons au gisement qui en est la base minéralogique ; puis nous nous occuperons de l'inclinaison. Enfin, nous terminerons par l'énumération des principales catégories de terrains, fondées sur la composition, ou sur le degré d'humidité, et nous ferons connaître leurs propriétés relatives à la végétation des bois.

#### ARTICLE III.

##### De l'étude des Essences.

20. L'étude des essences étant notre objet principal, nous examinerons, pour chacune en particulier, toutes les propriétés qui doivent avoir quelque influence sur la culture.

Ainsi, nous décrirons chaque essence en commençant par faire connaître ses exigences sous le rapport des climats et du sol ; puis, pour embrasser le végétal dans toutes les phases de son développement, nous nous occuperons d'abord de la floraison et de la fructification, puis du jeune plant, enfin de l'arbre dont nous considérerons successivement le feuillage, la tige et les racines, la croissance et la durée ; enfin, nous compléterons chacune de ces études par l'appréciation des qualités du bois sous le rapport de son emploi et des ressources qu'il présente à l'industrie.



21. On ne doit pas s'attendre à trouver dans nos descriptions d'arbres, l'énumération des caractères botaniques qui distinguent chaque espèce et la font reconnaître avec certitude (1). Nous n'indiquerons ici que celles des propriétés des arbres qui ont une influence réelle sur la culture.

22. Nous passerons sous silence les bois qui sont sans importance sous le rapport de leurs produits matériels, tels que les arbrisseaux et les arbustes, et nous ne parlerons pas davantage de ceux qui ne se rencontrent que très-rarement dans les forêts. Parmi les essences exotiques acclimatées, quelques-unes seulement nous ont paru mériter d'être mentionnées ici, tant à cause de leur belle végétation que par rapport aux qualités de leurs bois.

23. Quant au classement des essences, nous n'entrerons encore à cet égard dans aucun détail de classification botanique. Nous nous contenterons de

---

(1) Ces connaissances, qui d'ailleurs ne sont pas indispensables pour l'intelligence des règles de la Culture des bois, sont enseignées aux élèves de l'Ecole forestière dans un cours de botanique appliquée, et les forestiers praticiens les possèdent en général à un degré suffisant, soit qu'ils les aient acquises par une longue habitude, soit qu'ils les doivent à une étude approfondie. Ceux de nos lecteurs, au surplus, qui seraient entièrement étrangers à cet objet, pourront se l'approprier dans des traités spéciaux, tels que : *Le nouveau Duhamel*, publié par Mirbel ; *L'Histoire des arbres et arbrisseaux*, par Desfontaines, et surtout la *Flore forestière*, publiée par M. A. Mathieu, professeur d'histoire naturelle à l'Ecole impériale forestière.

ranger les essences forestières en deux groupes : *Bois feuillus* et *Bois résineux*. Cette division nous convient principalement en ce qu'elle se fonde sur des caractères pris dans la nature même du bois et de sa végétation.

Les arbres qui composent le premier groupe portent des feuilles à limbe plus ou moins développé, qui meurent et tombent à chaque automne et sont renouvelées au printemps suivant, à l'exception cependant de quelques espèces, le *chêne liège* et le *chêne yeuse* entre autres, qui conservent leurs feuilles vertes pendant plus d'une année. Des bourgeons, dits axillaires, se trouvent à l'aisselle de chacune de ces feuilles, d'où résulte une ramification abondante plus ou moins diffuse. Les sucres qui circulent dans leurs tissus ne sont jamais résineux, et ces arbres ont tous, plus ou moins, la propriété de produire des rejets de souches et de racines, lorsque la tige est coupée par le pied. Leur bois se compose essentiellement de fibres, de vaisseaux et de rayons (1).

Les bois résineux, aussi appelés arbres verts, ont

---

(1) Les *fibres* sont des organes élémentaires qui, dans leur réunion, forment la masse principale et la plus compacte du bois, et qui paraît pleine à l'œil nu. — Les *vaisseaux* sont des tubes qui se trouvent disséminés, soit solitaires, soit par faisceaux, au milieu du tissu fibreux. Leur diamètre, plus grand que celui des fibres, les fait reconnaître aisément sur une section transversale où ils apparaissent sous forme de petits trous. — Les *rayons* sont des lames de tissu cellulaire qui varient, selon les essences, en épaisseur, en longueur et en hauteur, et dont la direction est toujours perpendiculaire aux couches qu'elles traversent. (V. Mathieu, *Flora forestière*.)

des feuilles linéaires, acuminées, raides, qui persistent pendant plusieurs années ; le *mélèze* seul fait exception quant à la nature de ses feuilles : quoique linéaires et acuminées, elles sont tendres et tombent à chaque automne comme celles des bois feuillus. Les arbres de ce groupe n'ont pas de bourgeons à l'aisselle de chaque feuille ; ils n'ont généralement que des bourgeons terminaux entourés d'un seul verticille de bourgeons axillaires, de sorte que leur ramification n'est pas diffuse comme celle des essences du groupe précédent ; elle est, au contraire, plus ou moins régulière, et la tige a une disposition prononcée à croître en hauteur.

Les bois résineux ne possèdent point la faculté de se reproduire par rejets (1) de souches ou de racines ; leurs sucres sont résineux, et leurs semences se trouvent renfermées dans un fruit ligneux composé d'écaillés superposées les unes aux autres autour d'un axe commun. Ce fruit a reçu le nom de *strobile* ou *cône*.

Le bois des conifères ne contient que des fibres et des rayons, jamais de vaisseaux.

---

(1) Nous n'ignorons pas que plusieurs pins d'Amérique, notamment le *pinus taeda* et le *pinus rigida*, se reproduisent par rejets et que cette propriété a même été remarquée, en France comme en Allemagne, sur de très-jeunes sujets de pin sylvestre qui venaient d'être détruits par un incendie. Mais d'une part, la faculté dont il s'agit ne paraît que faiblement caractérisée dans les deux espèces exotiques que nous venons de nommer ; de l'autre, le fait signalé pour le pin sylvestre est dû à une cause trop anormale pour qu'il puisse en être tenu compte autrement qu'au point de vue physiologique. La non-reproduction par rejets des bois résineux n'en demeure donc pas moins vraie pour nous, sous le rapport cultural.

---

## CHAPITRE SECOND.

---

### DES CLIMATS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Du Climat en général.

24. Nous avons établi la distinction du climat géographique et du climat physique ou local. C'est le climat local qu'il importe surtout au forestier d'étudier, comme agissant principalement sur la végétation des bois.

En général, on peut admettre que, dans les pays chauds, la végétation est non-seulement plus précoce mais encore plus active que dans les pays froids, lorsque, comme sur le littoral, l'humidité atmosphérique est abondante ou lorsque, en raison de l'élévation, les chaleurs sont moins intenses. Dans ces régions, les bois sont plus durs, plus pesants et plus durables que dans les pays froids. Un climat doux hâte la croissance et la maturité des bois, un climat rigoureux les retarde.

25. La situation, d'où dépend principalement le

climat local, influe par l'élévation au-dessus du niveau de la mer et surtout par la configuration terrestre.

26. L'élévation au-dessus du niveau de la mer se manifeste, de même que l'éloignement de l'équateur, par un abaissement dans la température dû à un rayonnement plus actif et à la moindre capacité de l'air raréfié pour la chaleur (1); mais, tout en étant plus raréfié et plus sec, l'air des couches supérieures de l'atmosphère est néanmoins chargé souvent, bien que seulement par des causes accidentelles, de grandes quantités d'humidité. En outre, les courants sont plus fréquents et ont plus de violence dans les situations élevées, sans doute, parce qu'ils y rencontrent moins d'obstacles que dans les régions basses.

Mais c'est la configuration terrestre qui a la plus grande part dans les influences qui font varier le climat local, et elle donne lieu à la distinction des *climats de plaine* et des *climats de montagne*.

---

(1) Dans la plus grande partie de la France, 200 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer équivalent à peu près à un degré de latitude. (Voir *Cours complet de Météorologie*, par M. Kæmtz, traduit par M. Ch. Martins.)

## ARTICLE II.

## Des Climats de plaine.

27. Les climats des plaines sont généralement plus doux et moins variables que les climats des montagnes; déterminés principalement par la latitude, ils sont aussi modifiés par la nature du terrain, l'état de sa superficie, et par la proximité plus ou moins grande des mers et des montagnes.

28. Les eaux à la superficie terrestre, les lacs, les étangs, les rivières, en répandant de l'humidité dans l'atmosphère, diminuent l'intensité des chaleurs. Les masses de forêts produisent des effets analogues, par les exhalaisons aqueuses des arbres et par leur couvert qui empêche le sol de se dessécher; mais, d'un autre côté, elles rendent la température plus constante, en mettant obstacle au rayonnement de la terre, en favorisant l'infiltration des eaux dans le sol que leurs racines pénètrent et divisent en tous sens, enfin, en arrêtant l'action des vents. Au contraire, l'absence totale d'eaux augmente la sécheresse et la chaleur de l'atmosphère en été; le manque de forêts ou autres plantations se fait sentir de même, et en hiver, il ajoute encore à l'intensité du froid.

Il doit donc être de la plus haute importance pour l'état climatique d'un pays, que les forêts y soient réparties d'une manière convenable.

29. Un terrain léger et profond favorise l'infiltration des eaux; un sol compacte et humide ajoute à la rudesse du climat.

30. Vers les côtes, les froids de l'hiver sont moins vifs, par suite du voisinage de la mer dont la température varie peu; et les eaux, pendant l'été, rafraîchissent l'air et empêchent les trop fortes chaleurs. Une atmosphère très-humide, la violence et la fréquence des vents caractérisent le climat de ces localités.

#### ARTICLE III.

##### Des Climats de montagne.

31. Les climats de montagne se modifient par les mêmes causes que les climats de plaine, mais c'est surtout l'influence de la configuration terrestre qui s'y fait le plus vivement sentir. On y remarque, comme caractère général, des variations brusques et fréquentes dans la température et dans la quantité d'humidité répandue dans l'atmosphère.

32. Trois situations sont à distinguer dans les pays de montagnes :

Les vallées,

Les versants,

Les plateaux.

1° Dans les vallées profondes, les chaleurs sont fortes, l'humidité atmosphérique est abondante. L'influence des grands vents qui règnent sur les hauteurs

y est atténuée, et l'air y est en général plus calme, quoique agité presque constamment par de légers courants.

Ces diverses circonstances sont toutes très-favorables à la végétation qui, d'un autre côté cependant, s'y trouve exposée à l'influence nuisible de plusieurs météores (1). Ce sont d'abord des krouillards épais et fréquents qui, en obscurcissant l'atmosphère, empêchent l'action bienfaisante de la lumière, et ensuite des différences trop tranchées entre la température des jours et celle des nuits, d'où proviennent les gelées tardives du printemps, funestes à la végétation.

2° Dans les régions plus élevées, les variations de température sont les mêmes que dans les vallées, mais la chaleur et l'humidité de l'atmosphère y sont moins fortes, quoique susceptibles, par moments, de s'élever à un très-haut degré. Des vents impétueux y règnent souvent dans une constante direction, déterminée par celle des montagnes voisines. L'action de la lumière y est vive et l'atmosphère chargée d'électricité.

Ces climats présentent une végétation moins précoce et moins active que celle des vallées.

3° Sur les plateaux des grandes hauteurs, le cli-

---

(1) On sait que ce mot désigne généralement les phénomènes atmosphériques.



mat se trouve déterminé surtout par l'élévation au-dessus du niveau de la mer, et participe d'ailleurs, en grande partie de celui des régions immédiatement inférieures. On y remarque d'abondantes rosées, des pluies et des brouillards fréquents qui, pendant une grande partie de l'année, sont transformés en neige et en givre.

Dans ces localités, la croissance des bois est lente et peu vigoureuse.

33. Parmi les circonstances qui modifient notablement les climats de montagne, il faut citer les *abris*. Ainsi, à hauteur égale au-dessus du niveau de la mer, des versants, des plateaux peuvent présenter des phénomènes climatiques très-différents, selon qu'ils sont ou non abrités, dans certaines directions, par des montagnes voisines plus élevées, et selon que celles-ci sont boisées ou dénudées. Pour comprendre l'influence que cette dernière condition peut exercer, il suffit de se reporter à ce que nous avons dit plus haut [28] des effets produits par les forêts sur les climats de plaine, et de remarquer, en outre, que ces effets seront d'autant plus salutaires sur les grandes élévations, qu'en hiver les froids y sont plus vifs et plus prolongés, les neiges plus abondantes et plus persistantes ; en été, l'air plus sec et plus chaud, les orages plus fréquents et plus violents ; en toute saison enfin, les vents plus continuels et plus impétueux.

34. Nous ne parlerons pas de l'état climatique

des pays de coteaux. On conçoit qu'il doit tenir le milieu entre celui des montagnes et celui des plaines, et se rapprocher plus ou moins de l'un ou de l'autre, selon la configuration terrestre et l'élévation au-dessus du niveau de la mer.

## ARTICLE IV.

## De l'Exposition.

35. Ainsi que nous l'avons dit, l'exposition est un élément essentiel du climat local ; elle influe sur la croissance et la qualité des bois en raison de l'action non-seulement du soleil, mais encore des divers météores tels que les vents, la pluie, la gelée, etc., action qu'elle favorise plus ou moins.

Chacun des quatre principaux aspects présente des effets météoriques qui lui sont particuliers.

36. Celui de l'*Est* a généralement une température fraîche et assez sèche, parce qu'il reçoit les rayons du soleil le matin, lorsqu'ils ne donnent encore que peu de chaleur, et parce que les vents d'*Est* amènent ordinairement la sécheresse. Comme les bourgeons ne s'y développent qu'à une époque assez avancée du printemps, les gelées tardives de cette saison y sont peu à craindre ; celles d'automne, au contraire, s'y font sentir de bonne heure, et peuvent quelquefois devenir nuisibles lorsque les jeunes plantes et les pousses de l'année ne sont point encore suffisamment lignifiées.

L'exposition de l'Est est très-favorable à la végétation des bois ; ils y acquièrent de belles dimensions et une texture ferme.

37. Aux expositions *septentrionales*, le climat est à peu près le même qu'à celles de l'Est, toutes circonstances égales d'ailleurs. Cependant la température y est plus froide, parce que le soleil y donne peu, et l'humidité plus abondante, parce qu'effectivement les vents du Nord sont moins secs que ceux du Levant.

Les arbres, dans les pentes au Nord, ont une croissance très-rapide et parviennent aux plus belles dimensions ; mais leur bois est moins dense et d'une fibre plus molle qu'aux autres aspects.

38. Les expositions du *Couchant* sont éclairées par le soleil aux heures où il donne la chaleur la plus vive ; aussi le sol et l'atmosphère sont-ils sujets à se dessécher rapidement et à un très-haut degré, à moins que des vents fréquents d'Ouest ou de Sud-Ouest, ordinairement chargés de beaucoup d'eau, ne viennent remédier à cet inconvénient. Mais si ces vents peuvent produire quelque avantage sous ce rapport, ils sont, d'un autre côté, très-nuisibles aux parties de forêt exposées immédiatement à leur action, parce qu'en raison de leur extrême violence, et des grandes pluies qui les accompagnent, ils déracinent les arbres mal assis dans une terre détrempée ou les rompent très-souvent.

Les bois, dans ces expositions, acquièrent de la

souplesse et une texture forte ; mais les tourmentes trop habituelles des vents les rendent sujets à des déformations et les arrêtent souvent dans leur croissance.

39. L'exposition du *Sud* est la plus défavorable à la végétation. Comme le soleil y donne à peu près tout le jour, les premières chaleurs de l'année provoquent le prompt développement des bourgeons, et les jeunes pousses deviennent fréquemment victimes des gelées printanières. Dans ces expositions, le sol et l'atmosphère sont extrêmement chauds et secs, et des vents violents, souvent accompagnés d'orages, s'y font aussi sentir plus immédiatement.

Les bois qui croissent dans les versants au Midi, deviennent très-durs et coriaces ; mais leur accroissement est lent, et leurs dimensions, tant en hauteur qu'en diamètre sont peu considérables.

40. Il est à remarquer que l'influence de l'exposition sur la végétation s'affaiblit en raison de l'élévation au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, par exemple, sur les grandes sommités, la différence de température entre l'exposition du Nord et celle du Midi est bien moins marquée qu'à des élévations moyennes ou dans les vallées.

---

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### DES SOLS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Du sol en général et de son action nutritive.

41. La terre végétale se compose principalement de terre proprement dite, fournie en général par la dégradation des roches sur lesquelles elle repose, et en outre du terreau qui en est la partie la plus nutritive. Dans les forêts, le terreau se produit abondamment par les feuilles qui tombent annuellement des arbres, et par les diverses autres parties de plantes qui y pourrissent.

42. L'action du sol, sur la végétation des bois, peut être envisagée sous deux points de vue différents : 1° sous le point de vue physique ; 2° sous le point de vue chimique.

43. *Physiquement*, le sol agit par sa profondeur, par sa compacité et sa cohésion, par son hygroscopicité et les autres propriétés qui s'y rattachent, aptitude à se dessécher, à se retirer, etc., enfin, par

sa coloration. En vertu de sa profondeur, de sa compacité, de sa ténacité ou de sa mobilité, le sol doit assurer aux arbres une assiette solide, favoriser l'extension des racines et permettre l'accès de l'air jusqu'à ces organes; les deux dernières propriétés déterminent aussi la facilité ou la difficulté de la culture. Par l'hygroscopicité, qui est proportionnelle à la compacité, le sol joue un rôle très-important à l'égard de la végétation, il retient plus ou moins d'eau, la cède plus ou moins facilement. Exagérée ou peu prononcée, cette propriété le rend trop humide ou trop sec. Dans le premier cas, il est sujet au retrait par les chaleurs, et les racines sont alors exposées à être déchirées ou desséchées; dans le second, il s'émiette, devient poudreux et s'échauffe d'autant plus que sa coloration est plus foncée.

44. *Chimiquement*, le sol concourt directement à la nutrition des végétaux, en leur cédant des substances minérales, sels et oxydes, qui proviennent de sa décomposition lente, mais incessante, sous les différentes influences de l'atmosphère et qui, d'insolubles qu'elles étaient, se transforment en éléments solubles et, par conséquent, assimilables. Il concourt indirectement au même but, en transmettant aux plantes certaines substances utiles qu'il reçoit de l'air, des eaux de pluie et des engrais ou de l'humus. La nutrition végétale, ainsi alimentée en grande partie dans le sol par l'action absorbante des racines, est complétée dans l'air par l'action analogue de toutes les parties vertes.

Il n'est pas possible, au surplus, d'indiquer dans quelles mesures un sol doit présenter toutes les propriétés physiques et chimiques que nous venons d'énumérer pour qu'il offre le plus haut degré de fertilité. Ces mesures n'ont en effet rien d'absolu ; elles se modifient avec les essences que l'on veut cultiver et dont les exigences varient, et, pour une même essence, avec le climat et l'exposition.

#### ARTICLE II.

##### Des principaux composants du sol.

45. Bien que les terrains présentent une variété infinie, ils ne sont cependant composés en général que de trois terres : l'*argile*, le *calcaire* et le *sable*, auxquelles viennent s'ajouter accidentellement le *terreau* et plusieurs sels et alcalis dont les plus répandus sont le gypse (pierre à plâtre), l'alun, la potasse, la soude, etc. Quand aux métaux que l'on y trouve, le fer seul mérite d'être mentionné. C'est à l'oxyde de fer, en effet, que sont dues la couleur rouge et la couleur jaune d'un grand nombre de terrains, et l'on sait que la couleur influe sur l'absorption du calorique.

46. L'*argile* est une combinaison de silice et d'alumine ; elle est très-compacte, montre une très-grande avidité pour l'eau qu'elle absorbe cependant lentement, mais qu'elle cède de même, et dont elle

ne se laisse plus pénétrer une fois qu'elle en est saturée. Exposée à une chaleur forte et prolongée, ou à un air vif et sec, elle prend beaucoup de retrait, acquiert une grande dureté et se crevasse profondément.

47. Le *calcaire* ou carbonate de chaux (pierre à chaux, craie, marbre, etc.), réduit en terre, constitue un sol meuble qui absorbe promptement et retient une grande quantité d'eau avec laquelle il se délaie et forme de la boue, et qui, par les temps secs, perd rapidement toute cette eau et tombe en poussière.

48. Le *sable* proprement dit est de la silice sous forme de grains plus ou moins fins. Il constitue un sol meuble, sans aucune consistance, dépourvu de la propriété de retenir l'eau qu'il laisse infiltrer jusqu'aux couches les plus profondes.

49. Comme on le voit, aucune de ces terres n'est propre à former à elle seule un terrain fertile. L'argile, à cause de sa compacité et de son imperméabilité à l'air comme à l'eau, ne permet pas aux racines de pénétrer et de s'étendre; mais divisée par la silice ou la chaux, en proportion convenable, elle devient un des meilleurs sols.

La terre calcaire, par l'égale facilité qu'elle possède d'absorber et de perdre beaucoup d'eau, offre un sol alternativement et brusquement trop humide et froid, puis trop sec et chaud; les plantes y végètent péniblement, quand l'argile ou une quantité



considérable de terreau ne lui donne pas la consistance nécessaire.

Les sables purement siliceux enfin sont stériles, parce qu'en raison du manque total de cohésion entre les grains dont ils se composent, l'humidité s'infiltré ou s'évapore presque aussitôt qu'elle y pénètre, et les prive ainsi d'un des éléments essentiels de la végétation. Toutefois, lorsque le sable est à l'état pulvérulent, il se modifie favorablement en ce que, bien qu'entièrement desséché à la surface, il retient, à peu de profondeur, assez de fraîcheur pour permettre à certains végétaux ligneux d'y prospérer. Les dunes que l'on parvient à fixer à l'aide de semis de bois résineux sont un exemple de ce fait. Mais il n'est pas moins vrai, en général, que les sols siliceux ont besoin, pour devenir fertiles, d'une grande quantité de terreau.

50. Le *terreau* forme une terre dont la ténacité est supérieure à celle des terres calcaires ou siliceuses, quoique bien inférieure à celles des terres argileuses; il a, en outre, la propriété d'absorber plus d'humidité qu'aucune autre terre et de la céder avec facilité à la végétation. Le terreau corrige donc les propriétés physiques exagérées des sols siliceux et calcaires, en leur donnant plus de consistance, et en les rendant propres à retenir l'humidité, et celles des argiles, en diminuant leur trop grande compacité et leur avidité pour garder l'eau absorbée. Enfin, c'est le terreau qui fournit à tous les sols des sucs nourriciers (humus) propres à la végétation.

Le rôle de cette terre explique comment, dans beaucoup de nos anciennes forêts où elle s'est accumulée, nous voyons une végétation riche et des arbres de la plus grande beauté sur des sols qui, découverts et réduits à leurs éléments minéralogiques, seraient presque stériles.

## ARTICLE III.

De la base minéralogique et de l'inclinaison.

51. Après avoir considéré le sol par rapport à ses principaux composants, il nous reste à examiner les modifications que peuvent lui faire subir sa *base minéralogique* et son *inclinaison*.

52. C'est aux gisements de roche ou d'argile pure formant la limite inférieure des terrains, que l'on a donné le nom de base minéralogique. Leur action sur la végétation se manifeste de plusieurs manières. Compacte et dure, la base minérale empêche évidemment les racines des arbres de s'enfoncer au delà de la couche de terre végétale; tendre et divisée par de nombreuses fissures, elle leur donne un plus facile accès. Stratifiée, c'est-à-dire, composée de couches ou de feuillets parallèles, elle facilite ou arrête la pénétration des racines suivant que les joints sont obliques ou perpendiculaires à la surface du sol, ou qu'ils lui sont parallèles.

La base minéralogique influe encore sur le degré

d'humidité des terrains, selon qu'elle est imperméable à l'eau, ou qu'elle la laisse s'infiltrer. Cette propriété dépend, soit de la nature ou des proportions des éléments constitutants, et nous avons vu plus haut comment l'argile, le calcaire et le sable se comportent sous ce rapport ; soit de la nature schisteuse ou compacte du gisement, de la direction horizontale, oblique ou verticale des couches.

53. L'inclinaison, lorsqu'elle est faible, est sans influence sur le terrain ; toutefois, les sols entièrement plats sont plus exposés aux inondations que ceux qui sont légèrement accidentés. Mais, dans les pentes fortement prononcées, on observe généralement plus de sécheresse dans la partie supérieure et plus de fraîcheur dans l'inférieure, qu'à mi-côte ; et les molécules meubles (mobiles) ou solubles étant entraînées vers le bas par l'action des eaux, la fertilité du sol au pied des montagnes s'augmente constamment aux dépens des parties plus élevées. Ces inconvénients, cependant, sont moins à redouter lorsque les pentes sont boisées, attendu que les arbres retiennent les terres par leurs racines, et conservent la fraîcheur par leur couvert. Il est à remarquer d'ailleurs, que l'inclinaison est favorable à la végétation des bois, parce que, ne cessant pas de croître verticalement, leurs cimes, étagées les unes au-dessus des autres, participent plus largement à l'influence bienfaisante de la lumière, se couvrent d'un feuillage plus abondant, et l'on sait que la production ligneuse

est proportionnelle au développement des parties foliacées; parce que, enfin, les racines ont plus d'espace pour s'étendre (1).

## ARTICLE IV.

## Des diverses catégories de terrain.

54. Les dénominations les plus usitées des terrains se fondent, d'une part, sur les composants des terres, de l'autre, sur la quantité d'humidité qu'elles renferment.

55. On nomme *terre forte, glaise, froide*, celle où l'argile domine visiblement sur les autres éléments. Les terres *glaises* se distinguent des terres *fortes* en ce qu'elles sont plus purement argileuses et par conséquent plus rebelles à la végétation; leur couleur est ordinairement bleue ou verdâtre, et leur structure schisteuse, tandis que les secondes sont mieux pétries et colorées en blanc, en gris et en jaune. Les unes et les autres se nomment *froides*,

---

(1) Ce dernier avantage, qui est réel dans les pentes douces ou moyennes, cesse d'exister dans les pentes rapides, surtout lorsque (comme c'est le cas le plus fréquent) le sol y manque de profondeur, les racines ayant une répugnance marquée à suivre une direction ascendante. On reconnaît facilement la vérité de ce fait par la forme qu'affectent, dans ces localités, les cimes des arbres qui se développent surtout du côté de la pente et sont presque dépourvues de branches du côté opposé.

lorsqu'en raison de l'humidité qu'elles renferment, de leur couleur ou de toute autre circonstance, elles sont lentes à s'échauffer, et que, pour ce motif, le développement de la végétation a lieu tardivement.

56. Dans la catégorie des *terres légères*, on comprend les terres *sablonneuses* ou *graveleuses* composées de sable ou de gravier, soit siliceux, soit calcaire. On y compte aussi les autres genres de terres calcaires à l'état pulvérulent.

57. Les terres *marneuses* sont rangées tantôt parmi les terres fortes, tantôt parmi les terres légères. La *marne*, en effet, est un mélange intime de calcaire et d'argile qui se délite à l'air, et où l'un ou l'autre élément domine alternativement. Quand c'est le calcaire qui domine (*marne calcaire*), le sol peut être léger; au contraire, quand l'argile l'emporte (*marne argileuse*), la terre devient forte.

58. Le *sable gras* est un mélange d'environ deux tiers de sable avec un tiers d'argile, dans lequel tous les bois à peu près prospèrent.

59. Ce que l'on appelle *terre franche* n'est souvent qu'un sable gras avec une portion assez considérable de terreau; mais la plupart du temps, cette terre se compose, par parties à peu près égales, de silice, de calcaire et d'argile enrichis de beaucoup de terreau. De tous les sols c'est le meilleur, pour les bois comme pour presque toutes les plantes.

66. On donne aux sols qui renferment beaucoup de terreau (quels que soient leurs éléments mi-

néralogiques) le nom de terrains *gras* ou *substantiels*, par opposition à ceux qui n'en contiennent que très-peu ou point, et qu'on nomme *maigres*, *pauvres*, *arides*.

61. Sous le rapport du degré d'humidité qui dépend, non-seulement des éléments terreux, mais encore de la situation, de l'exposition, etc., on divise les sols en plusieurs catégories.

62. Les sols *marécageux* sont ceux qu'abreuvent abondamment des eaux croupissantes et sans écoulement; ils sont ordinairement situés dans les bas-fonds. On les distingue des terrains *aquatiques* ou *mouilleux* qui sont aussi entièrement détrempés, mais où les eaux se renouvellent constamment par l'écoulement. Les premiers ne présentent en général que des bois d'une végétation languissante, tandis que les seconds peuvent convenir à plusieurs essences.

63. Dans les sols *humides*, l'eau n'apparaît pas à la surface sous une légère pression, comme cela a lieu dans les précédents; toutefois, ces sols ne se sèchent jamais entièrement, ce qui les rend particulièrement propices à certains bois.

64. Les terrains *frais* se dessèchent bien pendant les grandes chaleurs, mais d'ordinaire à la surface seulement, et jamais au delà de 16 centimètres environ de profondeur. Ce degré d'humidité, favorable à presque toutes les essences, n'est d'ailleurs propre qu'aux meilleurs sols.

65. Les terrains secs, que l'on nomme aussi *chauds*, sont ceux qui se dessèchent promptement à une profondeur assez considérable, pour priver les racines des arbres de l'humidité nécessaire ; il n'y a qu'un petit nombre d'essences qui puissent y prospérer.

66. Toutes les différentes nuances de terrain que nous venons de citer exercent une influence plus ou moins marquée sur la qualité des bois qui y croissent. En général, les fonds humides ou très-substantiels produisent, avec une végétation riche, des bois d'un tissu lâche qui ne restent pas aussi longtemps sains que sur des terrains d'une fertilité moyenne, et qui, mis en œuvre, sont de peu de durée. Au contraire, les sols maigres et chauds, où l'accroissement est lent et faible, fournissent un bois dur et coriace. Il est à remarquer, toutefois, que les propriétés d'un sol trop sec par lui-même peuvent se modifier sous une température humide, tout comme les effets produits sur la végétation par un fonds humide peuvent être atténués par un climat chaud.

---

---

## CHAPITRE QUATRIÈME.

---

### DES BOIS FEUILLUS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Les chênes.

67. Le genre des chênes comprend les essences qui, sous le rapport de la longévité, de la force et des différents emplois auxquels leur bois est propre, occupent le premier rang parmi les végétaux forestiers. Les espèces principales indigènes sont les suivantes :

#### A. — CHÊNES A FEUILLES CADUQUES.

1° *Chêne rouvre* (*quercus robur*, DUHAMEL ; *q. sessiliflora*, SMITH) ; *chêne mâle* ; *chêne noir* (dans quelques contrées) ; *durelin* ; *rouvre* ; *chêne blanc* (Blésois et Provence).

2° *Chêne pédonculé* (*quercus pedunculata*, DUHAMEL ; *q. racemosa*, LAMARCK) ; *chêne à grappes* ; *chêne blanc* (Gironde, Landes, Picardie) ; *chêne femelle* ;



*gravelin* ; *chêne noir* (Blésois) ; *châgne* (France centrale.)

3° *Chêne tauzin* (*quercus tozza*, Bosc) ; *chêne doux* ; *chêne brosse* (Anjou) ; *chêne noir* (Gironde et Landes) ; *chêne Angoumois* (1).

B. — CHÊNES A FEUILLES PERSISTANTES.

4° *Chêne yeuse* (*quercus ilex*, LINNÉ) ; *chêne vert*.

5° *Chêne liège* (*quercus suber*, LINNÉ) ; *suro* ; *sioure* ; *surier* ; *alcornoque* (2).

6° *Chêne kermès* (*quercus coccifera*, LINNÉ) ; *chêne à cochenille*.

1° *Chêne rouvre*.

68. Ce chêne est un des plus répandus en France et compose des forêts considérables à lui seul, ou croissant en mélange, soit avec son congénère le pédonculé, soit avec d'autres essences.

69. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Il appartient aux climats tempérés et ce n'est que rarement qu'on le rencontre dans les pays septentrionaux. Cependant, dans nos montagnes, il s'élève parfois à d'assez grandes hauteurs, et dans les Vosges, par exemple, on le trouve même, par pieds isolés à la vérité, mélangé au sa-

(1) *Chêne chevelu* (*quercus cerris*, LINNÉ) ; *chêne de Bourgogne* ; *chêne Lombard* (Doubs et Jura). Voir l'appendice. Note des éditeurs.

(2) *Chêne occidental* (*quercus occidentalis*, GAY) ; *corsier* (Landes). Voir l'appendice. Note des éditeurs.

pin. Ce sont les pays de collines et les parties inférieures des montagnes qu'il habite de préférence, tout en se répandant aussi dans les plaines, associé au pédonculé.

Dans certains vallons froids et humides où d'épais brouillards sont fréquents, il souffre des gelées printanières jusqu'à ce que la cime de l'arbre ait dépassé la région dans laquelle ces brouillards se maintiennent habituellement.

Les pentes méridionales ne sont pas celles où il prospère davantage; quand le sol y est sec et chaud, il n'y a qu'une chétive végétation, mais son bois y devient très-dur [39]. Les autres expositions favorisent mieux sa croissance qui y est plus rapide et plus prolongée, lorsque le sol est d'ailleurs de bonne qualité.

**70. TERRAIN.**—Le chêne rouvre se plaît dans les sols moyennement argileux et s'accommode fort bien des terrains graveleux, calcaires ou siliceux, pourvu qu'ils aient une certaine fraîcheur. On le rencontre même dans des lieux secs et assez arides, mais alors sa végétation, ses feuilles, ses fruits, ses dimensions, tout son port enfin se modifient et s'amoin drissent sensiblement. Les sables secs, les fonds marécageux et les lieux mouillés en toute saison lui sont contraires.

**71. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque, et amentacée (1) pour les mâles; les

---

(1) En chatons.

fleurs paraissent à la fin d'avril ou au commencement de mai avec les feuilles. Les gelées printanières qui se font sentir à cette saison, les détruisent souvent, et sont une des causes de la rareté des fruits dans certaines contrées où l'on observe des intervalles de 3, 6, 8 et même 10 ans entre deux glandées consécutives. C'est surtout dans le Nord et l'Est de la France que cette rareté des années de semence se présente; dans les autres parties, les glandées sont généralement bis ou trisannuelles, et, chaque année même, il se produit quelques fruits qui contribuent à la régénération des bois.

Le gland mûrit et tombe au mois d'octobre de l'année même de la floraison; il est lourd et s'écarte peu, dans sa chute, de l'arbre qui le produit.

Ce fruit, dont la grosseur et la forme sont extrêmement variables, selon les sols, se distingue cependant de celui du pédonculé, en ce que les glands de celui-ci sont suspendus, ordinairement au nombre de 1 à 5, à un pédoncule ou axe commun assez long, tandis que les glands du rouvre sont généralement sessiles, c'est-à-dire, attachés immédiatement sur le rameau ou du moins sur un axe très-court, autour duquel ils sont groupés par bouquets de 3, 4, 5 et 6 (1).

---

(1) *Flore forestière* par M. Mathieu, professeur d'histoire naturelle à l'École impériale forestière. 1 vol. in-8°. Nancy, Grimblot, V<sup>e</sup> Raybois et Comp. 1858.

Le chêne de brin ne devient fertile en semence que vers l'âge de 50 à 80 ans, selon les climats, et selon qu'il est plus ou moins isolé, tandis que le rejet porte fruit souvent dès l'âge de 25 ou 30 ans. Un sol sec hâte la fructification.

72. JEUNES PLANTS. — Les chênes sont robustes dès leur naissance et demandent, le plus tôt possible, un état découvert. On peut même, excepté dans les pentes au Midi, les élever sans abri ; mais il est utile, quand on en a la facilité, de les garantir contre les vents froids et desséchants du Nord et de l'Est.

73. FEUILLAGE. — Le chêne rouvre, selon le sol sur lequel il se trouve, a les feuilles tantôt larges, luisantes, à lobes arrondis, tantôt petites et profondément découpées, mais généralement fermes, presque coriaces et assez régulièrement distribuées sur les rameaux.

Le couvert (1) de l'arbre, quoique sensiblement plus épais que celui du chêne pédonculé, est cependant toujours léger (2). Cette circonstance, en permettant aux rayons du soleil de pénétrer facilement jusqu'à la surface du sol, n'est pas avantageuse. Dans les ter-

---

(1) Voir la définition du couvert au 4<sup>e</sup> livre.

(2) V. l'excellente étude sur les chênes, rouvre et pédonculé, publiée par M. L. Dubois, inspecteur des forêts de Loir-et-Cher, sous le titre : *Considérations culturales sur les futaies de chênes du Blésois*. Blois 1856. V. aussi Th. Hartig, *Histoire des végétaux forestiers cultivables* (texte allemand). Berlin chez Jeanrenaud, 1852.

rains légers elle permet le desséchement, et dans les sols frais et de bonne qualité, surtout quand les forêts sont avancées en âge, elle favorise la végétation des herbes et des arbustes au point de compromettre souvent la reproduction de l'essence par la graine et, par suite, sa conservation. — Les soins intelligents et continus du forestier peuvent seuls combattre une aussi fâcheuse tendance.

74. **RACINES.** — Le chêne est généralement pivotant; ses racines s'enfoncent profondément quand l'état du sol n'y met pas obstacle; on en voit qui pénètrent jusqu'à 2 mètres, quoique l'arbre se contente pour prospérer, de 30 à 60 centimètres de fond.

Dans la jeunesse de l'arbre, le pivot forme la racine principale, les racines latérales sont rares et peu prononcées. A un âge plus avancé, celles-ci se développent au contraire avec vigueur, tendant toujours plutôt à descendre qu'à s'étaler, et le pivot reste à peu près stationnaire. C'est à cette tendance des racines à s'enfoncer que le chêne doit de résister, mieux que toute autre essence, aux ouragans et aux tempêtes.

Les racines du chêne n'ont aucune disposition à drageonner; leur chevelu est peu abondant.

75. **CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du chêne est assez lente, mais assez égale jusqu'à l'âge de 180 et même 200 ans. L'arbre vit quatre, cinq et six siècles; il s'élève à 33 mètres et au delà, et parvient à une grosseur considérable. On en cite

plusieurs qui ont atteint jusqu'à 3, 4, 5 et même 6 mètres de diamètre au pied.

**76. QUALITÉS ET USAGES.** — Le chêne est l'arbre le plus estimé pour les différentes constructions civiles, hydrauliques et militaires. Son bois est de la plus grande durée et résiste, mieux que tout autre, aux intempéries de l'air, lorsqu'il est parvenu à l'état parfait; l'aubier, au contraire, c'est-à-dire, les couches les plus récemment formées, se détruit rapidement, par la vermoulure en lieu sec, par la pourriture, s'il est exposé à la fraîcheur. — Garantie de l'humidité, cette essence se conserve des siècles et acquiert même, avec le temps, une dureté presque égale à celle du fer. Elle est surtout employée dans les chantiers de la marine, et, à l'exception des mâts, elle sert à peu près à toutes les parties dont un vaisseau est composé. Les traverses de chemin de fer sont presque toutes en chêne, et ce n'est qu'à défaut de pouvoir s'en procurer qu'on a recours à d'autres essences.

**76 bis.** Sous le rapport cultural, il est très-important de connaître les circonstances de végétation dans lesquelles le bois de chêne acquiert ou perd les qualités qui le distinguent.

Deux points sont surtout à considérer : 1° la texture ou le grain du bois; 2° les vices et défauts que l'arbre est exposé à contracter en raison des conditions de sol, de climat et de traitement dans lesquelles sa croissance s'accomplit.

« La texture du bois de chêne est en général d'au-

» tant meilleure sous le rapport de la force, de la  
» ténacité, de l'élasticité et de la durée que les cou-  
» ches annuelles sont plus développées (de 5 à 15  
» millimètres et au-dessus). La partie extérieure de  
» chacune de ces couches, qui comprend ce qu'on  
» appelle le *bois d'automne*, est formée d'un tissu  
» serré, plein, compact, d'apparence cornée, tandis  
» que la partie intérieure ou *bois de printemps* n'est  
» que peu développée et ne présente qu'une zone  
» étroite de vaisseaux qui apparaissent très-nettement  
» sur la tranche sous la forme de petits trous très-  
» rapprochés (1). »

En effet, on sait que cette zone, dite bois de printemps, composée presque exclusivement de vaisseaux, présente un tissu lâche, peu résistant et plus accessible à la décomposition, tandis que le bois d'automne, essentiellement fibreux, constitue réellement la masse solide du bois; on sait, de plus, que la zone de bois de printemps conserve à peu près la même épaisseur, quelle que soit celle de la couche annuelle entière.

Donc, plus la croissance de l'arbre sera rapide, c'est-à-dire, plus le sol et le climat seront propices, le traitement bien entendu et bien suivi, plus le grain du bois aura de qualité pour les emplois de la ma-

---

(1) *Exploitation, débit et estimation des bois*, par M. Nanquette, professeur d'économie forestière à l'Ecole forestière, page 222.

fine et les grandes constructions en général, et *vice-versa*.

Les bois qui présentent cette forte proportion de bois d'automne sont dits *nerveux*; on a donné le nom de bois *gras*, au contraire, à ceux dont les couches annuelles sont minces et composées presque entièrement de vaisseaux très-ouverts.

Entre ces deux extrêmes, on comprend qu'il existe un très-grand nombre de nuances.

Les vices et les défauts que le chêne est exposé à contracter lorsqu'il doit atteindre de fortes dimensions, et conséquemment un âge avancé, sont nombreux. Les bien connaître et savoir en apprécier l'intensité dans les arbres qu'il s'agit de livrer à la consommation, est pour le forestier un sujet d'étude fort important. — Nous ne pourrions, toutefois, le traiter ici, avec l'étendue et le détail qu'il comporte, sans répéter, en quelque sorte, ce qui se trouve parfaitement exposé dans l'ouvrage déjà cité de M. Nantouette (page 229 à 257), et sans sortir des limites assignées à ce Cours. Nous nous bornerons donc à indiquer les défauts du chêne, quant aux causes qui les produisent; ils sont de trois sortes :

Les uns sont dus à des accidents météoriques, tels que grands vents, grands froids, givre, verglas, variations brusques de température, coup de soleil (gélivure, rou lure, lunure).

Les autres proviennent tantôt de l'état trop sec ou trop humide du sol ou d'un état de vétusté tou-



chant à la décrépitude (cadranure, pourriture rousse ou blanche, grisettes).

Enfin, quelques-uns sont le résultat d'accidents provenant, directement ou indirectement, du fait de l'homme (frottures, nœuds gâtés, grisettes).

Le sylviculteur n'a que peu ou point d'action sur les défauts de la première sorte, mais il peut, par un traitement intelligent et soigné de la forêt, par des mesures de police et de surveillance bien appliquées, prévenir très-souvent ceux qui sont dus aux autres causes. Nous reviendrons sur ces objets dans le cours de cet ouvrage.

76. *ter.* Le chêne est aussi un excellent bois de fente. Il fournit le merrain le plus généralement en usage, de très-bons échaldas de vigne, du treillage, des cercles de futailles, et des bois propres à la boissellerie.

Différents métiers en tirent un grand parti ; mais plus particulièrement le charonnage, la tonnellerie, la menuiserie et l'ébénisterie.

« Pour ces divers usages et surtout pour les deux » derniers, les chênes *gras* ou *tendres*, quand ce défaut n'est pas exagéré, sont les plus recherchés, » parce que le bois est d'une plus belle teinte, mieux » veiné, plus facile à travailler et que, mis en œuvre, » il n'est sujet ni à se fendre, ni à se voiler, ni à » prendre du retrait, comme le bois *nerveux*. — A ce » point de vue, le chêne rouvre paraît avoir l'avantage sur le pédonculé, si l'on en juge par ce qui se

» passe dans les pays accidentés où les menuisiers et  
» les fabricants de merrain accordent une préférence  
» marquée aux chênes de montagne ou de coteau qui  
» sont ordinairement de cette espèce (1). » Ainsi donc,  
toutes les différentes qualités du premier de nos arbres forestiers deviennent également précieuses, selon l'usage auquel on le destine.

Comme bois de chauffage, le chêne vieux n'est pas d'un bon usage, du moins sur les foyers. Il y brûle sans flamme, pétille et éclate souvent, et dégage son calorique avec trop de lenteur, quoiqu'il en fournisse beaucoup; dans les appareils à fort tirage (calorifères), à l'aide desquels on veut obtenir une température égale et soutenue, il est employé plus avantageusement. Le jeune chêne (rondin) est meilleur; lorsqu'il a crû sur un terrain sec et que sa dessiccation est avancée, il brûle bien, donne beaucoup de chaleur et un beau brasier. Le charbon de chêne est très-employé, surtout dans les usines métallurgiques; et, pour cet usage, on préfère généralement le charbon de bois jeunes ou d'âge moyen à celui qui provient d'arbres mûrs.

L'écorce du chêne fournit le tan nécessaire à la préparation des peaux. Le meilleur est celui qu'on retire des jeunes chênes dont l'écorce est lisse et brillante.

---

(1) Ouvrage déjà cité de M. Nanquette.

Le fruit du chêne est particulièrement utile à l'engraissement des porcs.

*2° Chêne pédonculé.*

77. Le chêne pédonculé se rencontre presque aussi fréquemment en France que le rouvre, mais il forme, plus rarement que celui-ci, l'essence dominante de nos forêts.

78. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Quoique plus répandu dans les pays du Nord et moins dans ceux du Midi que son congénère, cet arbre, ainsi que nous l'avons dit, ne s'élève pas autant que celui-ci dans les montagnes et se plaît moins dans les terrains accidentés. On le trouve cependant dans les régions de coteaux, mais seulement mélangé au rouvre, tandis que, dans les plaines, il prospère et domine souvent presque à l'exclusion de ce dernier.

79. TERRAIN. — Les sols fertiles, mais surtout profonds, frais et même humides sont ceux que le chêne pédonculé recherche particulièrement. Quoique assez indifférent à la nature minérale des terres, il est cependant de toutes nos essences forestières, celle qui s'accommode le mieux des argiles fortes. Quand il est mélangé au rouvre, on le trouve surtout en belle croissance sur le bord des eaux; dans les plis de terrain et dans toutes les places où une dépression un peu marquée du sol, en permettant à l'humidité de s'y amasser, assure à ses racines la

fraîcheur nécessaire à leur végétation. Dans les sols secs ou superficiels, ou dans les pentes prononcées, on le voit languir et bientôt disparaître.

80. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est la même que celle du chêne rouvre, si ce n'est que les fleurs apparaissent 10 à 15 jours avant celles de ce dernier, ce qui les expose d'autant plus à être victimes des gelées du printemps et rend, par conséquent, les glandées plus rares.

Nous avons dit [71] les différences qui caractérisent les fruits de ces deux chênes. Il nous reste seulement à faire remarquer que, tandis que les glands du rouvre passent, pour ainsi dire, par toutes les grosseurs (de 15 à 30 et même 40 millim. de long), suivant la station de l'arbre, ceux du pédonculé conservent partout à peu près les mêmes dimensions (25 millim.), sans doute parce que l'essence ne croissant que dans les sols qui lui conviennent, les fruits ne sauraient éprouver les modifications que présentent ceux de son congénère, beaucoup plus accommodant sous le rapport du terrain.

81. JEUNES PLANTS. — Même tempérament et mêmes exigences que ceux du rouvre, si ce n'est toutefois que le pédonculé succombe promptement sous le couvert, tandis que le rouvre, tout en pouvant s'en passer, le supporte cependant assez longtemps.

82. FEUILLAGE. — La ramification du chêne pédonculé se constitue principalement par les bourgeons terminaux, rarement par les bourgeons laté-

raux qui ne produisent que des rameaux grêles. Il en résulte une cime qui n'est formée que d'un petit nombre de branches principales, plus ou moins grosses selon le volume de l'arbre, qui restent nues sur une partie de leur longueur, et ne portent que vers leur extrémité un feuillage ramassé en touffes serrées, laissant dans la cime de larges ouvertures. Cette disposition rend naturellement le couvert de l'arbre très-incomplet et fort inférieur à celui du chêne rouvre (1).

Les feuilles du chêne pédonculé sont plus tendres et paraissent plus tôt que celles de son congénère, ce qui, en raison des lieux que l'arbre habite, les rend souvent victimes des gelées printanières. D'un autre côté elles restent vertes plus longtemps en automne.

83. RACINES. — L'enracinement du chêne pédonculé ne diffère en rien de celui du rouvre; toutefois, la disposition pivotante est chez le premier peut-être plus prononcée encore que chez le second.

84. CROISSANCE ET DURÉE. — Il n'existe pas de différence sensible, sous ce double rapport, entre les deux chênes que nous considérons. Il paraît certain, néanmoins, que la croissance du pédonculé est en général plus rapide que celle du rouvre, ce qui peut s'expliquer d'abord, par la qualité des terrains qu'il

---

(1) Voir les ouvrages déjà cités de MM. Th. Hartig, L. Dubois et A. Mathieu.

exige pour prospérer, et ensuite, par la présence plus prolongée de la feuille à l'état vert sur l'arbre.

85. QUALITÉS ET USAGES. — Tout en reconnaissant que les deux chênes qui nous occupent participent aux mêmes qualités, quoique à des degrés différents, les forestiers et les constructeurs, ainsi que les divers métiers qui travaillent ces bois, ont discuté depuis longtemps et discutent encore sur la question de savoir auquel des deux il y a lieu d'accorder la prééminence.

Longtemps on a pensé, — et nous avons pensé et écrit nous-même, — que le rouvre, ayant une plus grande force, devait être préféré pour les grandes constructions, le pédonculé, au contraire, pour les ouvrages de fente. Mais, après avoir étudié pendant plusieurs années consécutives cette question si importante pour le sylviculteur, soulevée de nouveau, en 1856, par la publication du remarquable mémoire de M. L. Dubois, nous devons déclarer aujourd'hui que notre opinion s'est entièrement modifiée sur ce point.

Nous nous croyons tenu de rendre compte de ce changement.

Il a été établi plus haut [76 bis] que le bois de chêne, sans distinction d'espèce, était d'autant plus ferme, plus résistant, plus élastique, plus *nerveux* enfin, que le tissu fibreux était plus abondant dans ses couches annuelles, ou, ce qui est la même chose, que le bois d'automne était plus développé, dans une

même couche, comparativement au bois de printemps.

On a vu aussi [70 et 79] que le rouvre se plait ou résiste dans toutes sortes de terrains, depuis les meilleurs jusqu'aux médiocres, et que le pédonculé n'habite que les fonds fertiles et frais; d'où la conséquence, que les accroissements annuels de celui-ci seront en général larges, c'est-à-dire, pourvus de beaucoup de bois d'automne, tandis que les accroissements de l'autre ne pourront présenter cet avantage que dans les sols de bonne qualité.

De ces faits il est permis de conclure :

1° Que le chêne pédonculé, quand il aura d'ailleurs les dimensions convenables et qu'il ne sera pas vicié, fournira toujours des bois essentiellement propres aux grandes constructions.

2° Que le chêne rouvre offrira les mêmes avantages, s'il a crû en bon fonds; toutefois, dans beaucoup de terrains, où sa robuste constitution et le couvert qu'il assure au sol lui permettent encore de prospérer, le grain de son bois, composé de couches annuelles minces, manquera des qualités requises pour en faire un bon bois de service, mais deviendra, par contre, d'autant plus propre aux ouvrages de fente et de menuiserie.

### 3° *Chêne tauzin.*

86. **Cet arbre est très-répan­du dans les terrains sablonneux de l'Ouest de la France, depuis les Pyrénées jusqu'à Nantes, et même jusqu'au Mans.**

87. **CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION.** — D'après ce que nous venons de dire, cet arbre se plaît plus particulièrement dans les climats doux et même chauds, pourvu qu'ils soient humides ; toutefois il résiste encore aux hivers des régions tempérées ; il paraît rechercher les plaines plutôt que les montagnes, et ne montre pas une préférence prononcée pour une exposition plutôt que pour une autre.

88. **TERRAIN.** — Les sols légers et frais sont ceux que le tauzin préfère ; on le voit réussir dans les dunes et dans d'autres terrains d'une nature assez aride.

89. **FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles. Les fleurs paraissent au printemps, et les glands sont mûrs et tombent dans le courant de septembre de l'année de la floraison.

90. **JEUNES PLANTS.** — Les jeunes plants paraissent avoir le même tempérament et les mêmes exigences que ceux du chêne rouvre.

91. **FEUILLAGE.** — Les feuilles du chêne tauzin sont profondément découpées et disposées sur les ra-



meaux, de manière à donner un couvert plus léger encore que celui du pédonculé.

92. RACINES. — Ses racines tracent au loin et dragonnent abondamment dès la jeunesse. Cette disposition le rend précieux pour la fixation des dunes.

93. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance de cet arbre est assez rapide, mais il ne s'élève guère au delà de 20 à 24 mètres, et n'atteint qu'une grosseur ordinaire. Il vit plusieurs siècles.

94. QUALITÉS ET USAGES. — Le chêne-tauzin est peu estimé comme bois de construction ; on lui reproche d'avoir trop d'aubier, d'être noueux et tordu, de résister mal aux alternatives d'humidité et de sécheresse, et enfin de se tourmenter plus que les autres chênes.

Ces défauts le rendent peu propre aussi à la fente et aux autres ouvrages ; mais, jeune, il fournit des cercles de futailles très-recherchés, car il a la fibre coriace et beaucoup de liant.

Comme bois de feu il est bien préférable au rouvre et au pédonculé ; son charbon est très-estimé. L'écorce sert au tannage, et les glands sont particulièrement appréciés pour l'engraissement des porcs.

#### 4° *Chêne yeuse.*

95. Le chêne yeuse ou chêne vert ne se rencontre en France que dans les départements méridionaux.

Dans la Provence et le Languedoc, ainsi qu'en Corse, il forme de nombreuses et vastes forêts.

96. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Il a besoin d'une température chaude ; il se plaît sur les coteaux et sur les montagnes de moyenne hauteur, et réussit à toutes les expositions.

97. TERRAIN. — Cet arbre paraît préférer les sols calcaires ; c'est là du moins qu'on le rencontre le plus habituellement, quoiqu'il croisse aussi dans d'autres terrains, même les plus arides. A la vérité, il végète très-faiblement dans ces derniers, mais avec persistance, et on peut le regarder, forestièrement, comme le sauveur des montagnes du Midi.

98. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles ; les fleurs paraissent au printemps, quelquefois seulement en mai. Le gland mûrit en septembre, parfois même dès l'été de l'année, et tombe avant l'hiver. Quelques chênes yeuses donnent des glands assez doux et mangeables (1), sans qu'il soit possible de reconnaître aucune différence entre les pieds qui produisent ces glands et ceux qui ne portent que des glands amers ; on prétend même que les uns et les autres, se trouvent parfois sur le même arbre. Il paraît probable que c'est

---

(1) Il existe, en Espagne et en Algérie, une variété de l'yeuse appelée *Ballotte* dont les glands sont toujours doux et plus gros que ceux de l'espèce type. Il serait sans doute facile de la naturaliser dans les régions de la France où l'yeuse croît spontanément.

surtout dans les expositions très-chaudes que le gland devient comestible.

99. JEUNES PLANTS. — Quoique très-robustes, et supportant bien les chaleurs, il est à conseiller cependant de leur procurer, dans les deux premières années de leur naissance, un abri contre les ardeurs du soleil.

100. FEUILLAGE. — Les feuilles persistent pendant 2 années sur les rameaux et tombent au commencement de la troisième; elles sont beaucoup plus petites que celles des espèces à feuilles caduques, entières ou dentées et garnies de piquants, selon que le sol est plus ou moins fertile. Le couvert qu'elles donnent est très-épais.

101. RACINES. — Dans les mauvais terrains où il végète en France, l'yeuse n'a que des racines traçantes, fortes et nombreuses, qui pénètrent très-avant dans les fissures des rochers et drageonnent abondamment. Il est probable que, dans un bon terrain, il pivoterait davantage.

102. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance de cet arbre est très-lente, et en France il atteint bien rarement plus de 10 mètres de haut; mais en Italie et en Algérie, où il se trouve parfois dans d'assez bons sols, il paraît qu'il parvient à de belles dimensions. Il vit plusieurs siècles.

103. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois de l'yeuse est remarquable par l'homogénéité et la finesse de son grain, sa densité et son poids. Ces qualités le ren-

draient éminemment propre à être employé, soit comme bois de construction, soit comme bois d'ouvrage, partout où les pièces sont exposées à un frottement continu; aussi, Duhamel conseille-t-il déjà de le préférer, pour ces sortes d'usages, à toutes les autres espèces de chênes. On assure, de plus, que, mis en œuvre, il a une très-grande durée, et résiste longtemps à la pourriture. Malheureusement on le coupe généralement trop jeune, ce qui fait qu'il ne produit guère que du chauffage. Mais, pour cet usage, il est très-estimé et, dans le Midi, on le trouve supérieur même au hêtre.

Son écorce sert au tannage des cuirs, et on la met fort au-dessus de celle des chênes à feuilles caduques.

### 3<sup>e</sup> Chêne liège.

104. Le chêne liège, très-commun en Espagne, où il se fait un grand commerce de son écorce, et en Algérie, est cultivé avec succès dans les parties méridionales de la France. On le trouve dans les départements de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, du Var et de la Corse. Il en existe deux variétés, l'une à glands doux, l'autre à glands amers. La première est la plus estimée pour la qualité de son liège.

105. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Cet arbre ne prospère que dans les pays à température élevée. Il réussit dans les régions moyennes des montagnes

(jusqu'à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer), aussi bien que dans les plaines. C'est dans les pentes méridionales et abritées, et partout où le soleil a beaucoup d'action, que son bois et son écorce acquièrent le plus de valeur.

106. TERRAIN. — Le chêne liège se plaît particulièrement dans les sols feldspathiques. Cependant, il est probable que d'autres terres légères et divisées ne lui seraient pas contraires. Dans le département du Var, des essais de l'élever dans les terrains calcaires ont réussi, mais non sans beaucoup de soins, et il paraît aussi qu'en Catalogne il croît dans des terrains de même nature. Sa racine pivotante demande un sol profond; mais, indépendamment du pivot, cet arbre a aussi des racines traçantes qui lui permettent de croître dans des terrains de moindre profondeur. On voit, sur les montagnes des Pyrénées-Orientales et du Var, des chênes lièges qui se contentent de très-peu de fond, et dont les racines s'implantent même dans les fissures des rochers, et lui donnent une assiette très-solide. Leur écorce, dans ces situations, devient plus légère, plus fine et plus épaisse.

Les sols compactes ou humides sont ceux qui conviennent le moins à cet arbre.

107. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles. Les fleurs paraissent à la fin de mai ou dans le courant de juin, suivant que l'arbre est plus ou moins exposé à la chaleur et abrité des vents du Nord. Les mêmes cir-

constances influent sur la maturité des fruits, et établissent à cet égard une différence de 1 à 2 mois. Les glands mûrissent et tombent depuis septembre jusqu'en décembre de l'année de la floraison. Il est probable que les glands doux du chêne liége sont dus, comme ceux de l'yeuse, à une exposition et à un sol très-chauds où la maturation s'opère d'une manière plus complète.

Cet arbre devient fertile dès l'âge de 15 à 20 ans et porte fruit presque tous les ans.

108. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants ne se montrent sensibles qu'au froid et particulièrement aux gelées tardives ; ils supportent bien l'action de l'air et du soleil. Cependant, aux expositions chaudes, il convient de ne pas les laisser sans abri dans les premières années.

109. FEUILLAGE. — Les feuilles petites, entières, plus ou moins dentées, sont nombreuses, pressées, et persistent plusieurs années. La tête de l'arbre, très-rameuse, fournit un couvert épais.

110. RACINES. — La racine principale pivote et s'enfonce profondément. Les racines latérales tracent au loin et sont disposées à fournir de nombreux drageons. C'est par les drageons que le chêne liége s'est considérablement multiplié dans les forêts incendiées du Var.

111. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du chêne liége est assez active, et sa durée de plusieurs siècles. Il atteint de fortes dimensions. On en cite

un exemplaire qui mesurait 3 mètres 15 centimètres de tour, d'une élévation moyenne, parce qu'il était isolé, mais ayant un feuillage bien nourri, des branches abondantes, fortes, et qui, par leur position verticale, annonçaient encore une végétation vigoureuse. Un autre chêne portait 6 mètres de circonférence, et a fourni 55 stères de bois façonné, ce qui prouve que l'enlèvement de l'écorce ne lui est pas nuisible. Il peut donner du liège pendant 150 et 200 ans, suivant la fertilité plus ou moins grande du terrain.

112. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois du chêne liège a beaucoup de poids et de densité. Il est peu employé aux constructions, attendu son extrême pesanteur et aussi parce que, dit-on, il se pourrit promptement à l'air. Par contre, il est propre à la menuiserie et particulièrement estimé comme bois de chauffage.

C'est l'enveloppe subéreuse de l'écorce qui forme le liège ; livrée à elle-même, elle se crevasse profondément et devient impropre aux usages auxquels le liège est destiné. Lorsqu'elle a été enlevée, elle est remplacée par une zone nouvelle. L'époque à laquelle il convient de commencer l'écorcement se détermine, non d'après l'âge, mais d'après les dimensions de l'arbre, qui doit, à cet effet, mesurer de 30 à 50 centimètres de tour.

L'enlèvement du premier liège ou *liège mâle* qui ne donne qu'un produit grossier et presque de nulle

valeur, se nomme *démasclage*. Le *liège femelle* est celui que l'on récolte par la suite; il est éminemment propre à tous les usages du commerce. Le démasclage ne doit guère dépasser la moitié de la hauteur du tronc de l'arbre; ce n'est que dans les écorcements subséquents que l'on monte jusqu'à la naissance des branches qui, en général, doivent être respectées, à moins qu'elles ne soient de forte dimension. L'opération de l'écorcement se fait à la fin de juin, dans le mois de juillet et quelquefois même en août (1).

#### 6° *Chêne kermès*.

113. Le chêne kermès est très-abondant dans les départements du Midi de la France, et notamment dans ceux des Bouches-du-Rhône et du Var, où il couvre près des trois quarts du sol forestier.

114. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Une température élevée lui est nécessaire; il croît du reste en montagne aussi bien qu'en plaine et à tous les aspects du soleil.

115. TERRAIN. — C'est dans les sols sablonneux et pierreux qu'on le trouve le plus ordinairement, et il paraît très-peu exigeant sous ce rapport. Les fai-

---

(1) Voir, pour plus de détails, sur le chêne liège, la *Flore forestière* déjà citée de M. Mathieu et, dans les *Annales forestières*, année 1858, un article fort intéressant de M. Roussel, garde général des forêts.



bles dimensions qu'il acquiert doivent le faire exclure des terrains de quelque fertilité.

116. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles. Les fleurs paraissent en mai ; les glands qui leur succèdent restent très-petits la première année, et ne sont mûrs que vers la fin de la seconde. Les buissons de chêne kermès portent fruit très-jeunes et presque tous les ans.

117. JEUNES PLANTS. — Cette essence étant sans importance forestière, les exigences de son jeune plant n'ont point été étudiées ; mais, à en juger par la grande facilité avec laquelle elle se propage, son tempérament doit être très-robuste dès sa naissance, au moins pour résister aux chaleurs et à la sécheresse.

118. FEUILLAGE. — Les feuilles sont persistantes et épineuses, à peu près comme celles du houx ; elles donnent un couvert d'autant plus épais que les buissons de chêne kermès sont très-rameux et s'élèvent peu.

119. RACINES. — Les racines sont nombreuses, plus traçantes, dit-on, que pivotantes, et disposées à drageonner.

120. CROISSANCE ET DURÉE. — Ainsi qu'on vient de le dire [115], ce chêne ne prend que de faibles dimensions : il se ramifie dès la base, et n'atteint guère plus de 1 à 3 mètres de haut. Sa durée est probablement beaucoup moindre que celle de ses congé-

nères ; on n'a pas toutefois de notions bien certaines à ce sujet, parce qu'on l'exploite généralement très-jeune.

121. **QUALITÉS ET USAGES.** — Le chêne kermès, attendu ses dimensions, ne produit que du bois de bournées et de fagots employé en général à chauffer les tuileries, briqueteries et les fours à chaux sur place. Dans le Midi de la France, les bois de cette essence sont à peu près tous livrés au pacage. C'est sur cette espèce que l'on trouve l'insecte appelé kermès (*kermès ilicis*), qui se fixe et se nourrit sur les jeunes rameaux. On le récoltait autrefois pour en tirer une couleur rouge, estimée pour la teinture des étoffes.

L'écorce du chêne kermès est, comme celle de tous les autres chênes, propre au tannage des cuirs.

## ARTICLE II.

### Le Hêtre.

122. Cet arbre est l'un des plus utiles et des plus répandus de nos forêts, dont il forme fréquemment l'essence dominante. Il n'en existe qu'une seule espèce indigène : le *hêtre commun* (*fagus sylvatica*, LINNÉ). On le connaît aussi sous le nom de *fayard*, *foyard* ou *fau*.

123. **CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION.** — Le climat tempéré est celui que cet arbre préfère ; il occupe

cependant, dans nos montagnes, à peu près la région du sapin; quelquefois même il lui est supérieur. On le trouve dans les Alpes à 1,500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et dans les Pyrénées il monte jusqu'à 1,800 mètres. Le climat froid des différentes contrées de la France ne lui est donc pas essentiellement contraire.

Dans le centre, le nord, l'est et l'ouest de la France, on le voit prospérer aussi bien dans les plaines que dans les situations montueuses, mais il réussit moins dans les vallons étroits et humides, exposés aux gelées tardives, que sur les plateaux et dans les pentes abritées. Il est exclu des plaines et des côteaux brûlants des départements du Midi.

Les expositions méridionales lui sont contraires; il préfère celles du Nord, du Nord-Ouest et de l'Est.

124. TERRAIN. — A l'exception d'un sable sec, de l'argile compacte et d'un fonds marécageux, le hêtre se contente de toute espèce de terrain, pourvu qu'il soit divisé. Les sols calcaires ou légèrement argileux, fortement mélangés de pierrailles semblent lui convenir particulièrement. Il n'exige qu'une profondeur médiocre, à la condition, toutefois, que l'épaisse couche de feuilles mortes qu'il produit chaque année se maintienne à la surface.

125. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque et en chatons globuleux pour les mâles; les fleurs paraissent avec les feuilles dans le courant

d'avril ou au commencement de mai, suivant la température, et, comme celles du chêne, elles sont souvent victimes des gelées printanières. Ce n'est ordinairement qu'à des intervalles de plusieurs années que l'arbre porte semence. Le fruit appelé *fatne* mûrit et tombe en octobre de l'année même de la floraison; quoique moins lourd que le gland, il ne s'éloigne cependant que peu de l'arbre qui le produit.

Le hêtre ne devient fertile que vers l'âge de 50 ans. Dans les années où il y a faînée complète, on voit des pieds beaucoup plus jeunes chargés de graines. Mais, outre qu'elles sont vaines en grande partie, cette circonstance ne peut être considérée que comme tout à fait exceptionnelle.

126. JEUNES PLANTS. — Les hêtres, à leur naissance, sont très-déliçats et demandent un abri prolongé pendant plusieurs années; ils sont cependant moins sensibles au froid qu'à l'action du soleil, à laquelle ils ne peuvent résister.

127. FEUILLAGE. — Les feuilles sont d'un tissu serré et très-abondantes; elles forment un abri très-épais.

128. RACINES. — Dans la première jeunesse, le pivot est presque aussi prononcé que celui du chêne et muni de peu de racines latérales; mais celles-ci ne tardent pas à se multiplier, sans toutefois s'étaler au loin, tandis que le pivot s'arrête complètement. Parvenu à maturité, l'arbre présente des racines assez fortes qui tracent dans les couches supérieures

du sol et ne s'enfoncent jamais comme celles du chêne. Parfois elles produisent quelques dragons, mais qui sont généralement chétifs et d'une végétation languissante.

129. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du hêtre, dans les dix premières années, est fort lente ; mais aussitôt qu'il a pris un peu de consistance, il devient robuste, et s'élance avec assez de rapidité. En sol convenable, il s'élève à plus de 40 mètres, prend jusqu'à 1 mètre et un mètre 50 centimètres de diamètre à la base, et prospère quelquefois pendant 300 ans.

130. QUALITÉS ET USAGES. — Le hêtre n'est guère propre à la charpente ; son bois ne résiste ni à l'humidité ni aux variations de l'atmosphère. On n'a pu l'employer jusqu'à présent à cet usage qu'en opérant sa dessiccation parfaite, et en le soumettant au feu jusqu'à ce que sa surface soit un peu charbonnée. Il sert cependant à quelques pièces de construction de vaisseaux, soit celles qui sont entièrement à couvert, soit celles qui restent sous eau ; et depuis une dizaine d'années environ, on l'emploie avec succès à faire des traverses de chemins de fer, après l'avoir imprégné de sulfate de cuivre.

Du reste, son bois est d'une utilité générale. C'est un des meilleurs bois de fente : il est employé par les menuisiers, les ébénistes, les charrons, les carrossiers, les tourneurs, les layetiers et les boisseliers. On en fait des rames de bâtiments de mer, des

manches de marteaux de forge et autres usines. Le sabottage qu'on en tire forme un commerce considérable. Il est à observer qu'on ne peut fendre le hêtre que lorsqu'il est vert, mais que, pour l'employer, il faut lui faire subir une dessiccation complète, car il prend beaucoup de retrait.

Le hêtre fournit un excellent chauffage et un charbon très-recherché.

La faine, mêlée avec le gland, sert à nourrir les porcs et à les engraisser; on en retire par ce moyen un produit souvent considérable. Le panage, lorsqu'il y a suffisamment de glands et de faines, peut être mis en adjudication; c'est une ressource très-précieuse, surtout pour les pays pauvres en grains. On ramasse aussi la faine pour en extraire l'huile qui est très-bonne à manger lorsqu'elle est pressée à froid. Cette huile est meilleure à brûler et donne moins d'odeur que d'autres huiles; elle est employée avec avantage dans l'économie domestique et dans les arts.

#### ARTICLE III.

##### Le Châtaignier.

131. Le *châtaignier commun* (*castanea vulgaris*, LAMARCK) est un arbre remarquable par son beau feuillage et son port majestueux, par sa grande utilité et par une croissance des plus rapides. On ne trouve en France, et même en Europe, qu'une seule espèce

de ce genre. Quant aux variétés, qui ne sont dues qu'au climat et à la culture, elles ne se distinguent que par la grosseur et le goût du fruit.

132. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — On rencontre le châtaignier dans toute la France, excepté dans les départements du Nord. Un climat un peu chaud paraît donner plus de solidité à son bois [24], et plus de qualité à son fruit; ce climat lui est même nécessaire, car cet arbre fleurissant plus tard que les autres essences, sa fructification a besoin d'une température douce pour arriver à une maturité parfaite. Il est constant d'ailleurs qu'il supporte mal les froids rigoureux (1).

Le châtaignier se plait particulièrement sur les coteaux et sur les montagnes d'une élévation moyenne. Il réussit moins dans les plaines, et l'on doit éviter de le placer sur les grandes hauteurs et dans les fonds humides.

Les pentes entièrement exposées au midi ne lui conviennent pas, surtout dans les localités où l'on a des gelées printanières à craindre. Cet arbre, ayant une végétation très-précoce, est souvent victime de ces gelées, lorsque, à l'entrée du printemps, le soleil hâte le développement des bourgeons. Il est

---

(1) C'est, à ce qu'on prétend, l'hiver de 1709 qui a généralement détruit les châtaigniers, très-communs autrefois en France. Buffon (2<sup>e</sup> mémoire, *Expériences sur les végétaux*) rejette cette opinion comme n'ayant aucune base sérieuse.

donc préférable de le cultiver aux expositions de l'Est et du Nord-Est.

133. TERRAIN. — Les terres légères, siliceuses ou feldspathiques, mais substantielles et profondes, sont celles où il prospère le mieux ; cependant on le voit réussir aussi dans les sols secs et sablonneux. Dans ceux qui sont légèrement humides, il a une végétation extraordinaire, mais ayant plus souvent à souffrir des gelées printanières, il se creuse bien plus tôt que dans les autres terrains. En général, les terres trop compactes, humides ou marécageuses, sont contraires au châtaignier, et il se refuse à croître dans les sols calcaires, ou du moins il y croît mal.

134. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque ou même polygame, car certains chatons mâles supportent à leur base des fleurs femelles ou hermaphrodites. Les fleurs paraissent dans le mois de juin et quelquefois en juillet seulement. Le fruit mûrit tard et ne se récolte, dans les climats tempérés, que vers le milieu ou la fin de novembre. Sa maturité ne devance cette époque que dans les climats plus chauds, ou lorsque l'été et l'automne ont eu une température élevée. Les châtaignes sont plus lourdes que le gland, renfermées dans une enveloppe presque ligneuse armée de pointes, qu'on appelle vulgairement hérisson ; elles y sont ordinairement à deux et même à trois. Le marron, la plus grosse des châtaignes, y est presque toujours seul.



Le châtaignier porte fruit même très-jeune.

135. JEUNES PLANTS. — On peut entièrement comparer les plants de châtaignier à ceux du chêne. Ils sont robustes dès leur naissance et ne prospèrent pas à l'ombre ; mais ils sont, plus que les jeunes chênes, sensibles aux froids.

136. FEUILLAGE. — Les feuilles du châtaignier sont grandes et abondantes ; elles forment un couvert assez épais.

137. RACINES. — Bien que le châtaignier ne soit pas aussi pivotant que le chêne, il l'est cependant beaucoup plus que le hêtre. Ses racines sont fortes et nombreuses, elles ont toutes une tendance à s'enfoncer dans le sol, où elles pénètrent volontiers jusqu'à un mètre et plus de profondeur. Ordinairement le pivot cesse de s'allonger dès que l'arbre ne croît plus sensiblement en hauteur, et souvent même il meurt tout à fait. Les racines latérales drageonnent facilement.

138. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du châtaignier est très-rapide dès sa jeunesse et se soutient fort longtemps. A l'âge de 60 à 70 ans, ses dimensions sont déjà celles d'un chêne de 130 à 140 ans. Sous le rapport de la durée, cet arbre présente les exemples les plus étonnants. Le plus gros châtaignier que l'on connaisse est celui dit *des cent chevaux*, qui se trouve près du mont Etna en Sicile (1).

---

(1) D'après M. Elisée Reclus (*Revue des deux mondes*, 1<sup>er</sup> juillet 1868) cet arbre n'existe plus. (*Note des éditeurs.*)

et dont le tronc, entièrement creux à la vérité, mesure 50 mètres de circonférence ; sa naissance se perd dans les temps les plus reculés. D'autres châtaigniers moins vieux ont été mesurés à la grosseur de 10 à 15 mètres. En général, cette essence présente l'inconvénient de se creuser, sans toutefois que sa durée ait à en souffrir ; mais il en résulte que les fortes pièces de châtaignier sont extrêmement rares.

**439. QUALITÉS ET USAGES.** — Le châtaignier offre un bois très-propre à la charpente. Quoique plus léger que le chêne, il a presque autant de force que lui, et l'on prétend qu'il l'égale en durée.

Dans sa jeunesse, il est très-liant et propre à faire des cercles ; plus tard, son bois fournit des échelles de toutes dimensions et, pour cet usage, on le préfère au chêne.

Le châtaignier est un bon bois de fente ; en Italie, on en fabrique des douves qui, dit-on, sont d'une qualité supérieure à celles du chêne. On ne connaît pas assez en France tous les usages auxquels il est propre, parce que les forêts de cette essence s'exploitent généralement fort jeunes, et que les arbres qu'on laisse vieillir ne sont cultivés que comme fruitiers, et ne se coupent ordinairement qu'après leur entier dépérissement.

Le châtaignier est moins estimé pour le chauffage que le chêne, et il est sujet à jeter des éclats. Son charbon est un peu léger et ne pourrait servir à la

fonte du minéral ; mais on l'emploie avec avantage à forger le fer.

La châtaigne est un fruit excellent ; dans plusieurs parties de la France, elle forme la principale nourriture des habitants des campagnes.

Il paraît constant que les anciennes charpentes, très-bien conservées, que l'on croyait être en bois de châtaignier, sont en chêne pédonculé (Buffon, mémoire cité plus haut). Quoi qu'il en soit, on ne peut contester la végétation rapide de cet arbre, la bonté de son bois, son utilité pour la construction et l'ouvrage, ainsi que l'excellence de son fruit ; et, sous ces divers rapports, il est digne de toute l'attention du forestier.

#### ARTICLE IV.

##### L'Orme.

140. L'*Orme*, (*ulmus*, LINNÉ) est un des arbres les plus utiles de nos forêts, mais on ne l'y rencontre que très-rarement comme essence dominante. Il présente un grand nombre de variétés ou de variations qui se rattachent les unes aux autres par une multitude de transitions. Les principales espèces, admises par les botanistes, sont :

L'*Orme champêtre* (*ulmus campestris*, SMITH) ; *orme à petites feuilles* ; *orme rouge*. A cette espèce

appartiennent les variétés connues sous le nom d'*orme tortillard* et d'*orme fongueux*.

L'*orme de montagne* (*ulmus montana*, SMITH); *orme à larges feuilles*. Cette espèce est la moins estimée pour la qualité du bois, et il faut par conséquent cultiver de préférence l'orme champêtre.

Il existe une troisième espèce appelée *orme diffus* (*ulmus effusa*, WILDENOW). Elle est peu répandue et son bois n'est pas apprécié (voir la Flore forestière de M. Mathieu).

141. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le climat tempéré est celui où l'orme prend son plus fort développement. La grande chaleur ne lui convient pas; il s'accommode mieux du froid, et l'on rencontre sur d'assez grandes hauteurs l'orme à larges feuilles. Lorsque le terrain lui est favorable, il vient aussi bien en plaine qu'en montagne. Depuis Sully qui a étendu la culture de cet arbre en France, il a été particulièrement planté sur les grandes routes, dans le voisinage des communes, des églises, des cimetières, et sur les remparts des places fortes. Quoique très-utile, il est moins commun dans les forêts.

Dans les situations élevées, il se plaît aux aspects du Midi et du Couchant, tandis que dans les régions basses, on le voit prospérer davantage aux expositions du Nord et de l'Est.

142. TERRAIN. — Cet arbre n'est pas difficile sur le choix du terrain; il ne craint que les sols trop argileux, marécageux, ou trop arides. Dans ces der-

niers, on le voit dégénérer en un arbrisseau diffus (orme tortillard), à feuilles très-petites et qui ne fleurit presque jamais (M. Mathieu). Un sol frais sans être humide accélère sa végétation et n'ôte rien à la bonté de son bois. Il croît avec une extrême rapidité dans les sols un peu humides, mais il y perd en qualité ce qu'il gagne en accroissement.

143. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Les fleurs de l'orme paraissent avant les feuilles, dans les premiers jours du printemps. Elles sont hermaphrodites, et ordinairement très-abondantes. La maturité des graines a lieu dès la fin de mai ou le commencement de juin. La semence est très-petite, entourée d'une membrane circulaire fort légère ; elle est disséminée au loin par les vents, aussitôt qu'elle est mûre. Les ormes sont en général fertiles en graines, et commencent très-jeunes à en porter.

144. JEUNES PLANTS. — Le tempérament des jeunes plants est robuste. Cependant un premier abri leur est utile, parce qu'ils lèvent pendant les chaleurs de l'été ; mais ensuite on peut les abandonner à eux-mêmes.

145. FEUILLAGE. — Les feuilles de l'orme sont rudes, abondantes et donnent un couvert assez épais.

146. RACINES. — Les racines fortes et nombreuses s'étendent au loin. Lorsque le terrain est profond, l'orme pivote autant que le chêne, mais il pousse en même temps un grand nombre de racines latérales. Cette faculté de tracer lui permet de prospé-

rer encore dans les terrains qui ont peu de fond. Les racines de l'orme fournissent de nombreux dragons.

147. CROISSANCE ET DURÉE. — L'orme est remarquable par la promptitude de sa croissance ; il s'élève à une très-grande hauteur et prend une grosseur considérable. Sa vie s'étend à plusieurs siècles. Une grande quantité d'ormes, plantés sous le ministère de Sully, existent encore et sont en bon état de croissance.

148. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois d'orme est très-dur. On peut l'employer à la charpente, quoiqu'il soit, pour cet usage, inférieur au chêne et au châtaignier. Il sert dans les chantiers de la marine pour la carène des vaisseaux, pour les pompes et pour toutes les parties qui sont sous eau.

L'orme est un des meilleurs bois de travail. Le tortillard est surtout recherché pour le charonnage et pour tous les ouvrages qui exigent de la solidité. L'artillerie l'emploie de préférence à tout autre bois pour les affûts de canon, les voitures, etc. L'ébénisterie en tire un excellent parti pour les meubles ; son grain est fin, sa couleur agréablement nuancée, et il prend un beau poli. Sa fibre, très-serrée et coriace, le rend utile à tous les ouvrages exposés au frottement, tels que les vis de pressoir, les écrous, les roues d'engrenage. On en fabrique aussi des arbres et des roues de moulin.

Toutes ces qualités sont celles de l'orme à petites

feuilles. L'orme à larges feuilles ou de montagne ne fournit qu'un bois mou, peu résistant et peu durable; il en est de même de l'orme diffus.

Comme chauffage, l'orme est assez estimé lorsqu'il est complètement sec, mais il n'est pas de première qualité; il en est de même de son charbon.

La cendre de l'orme est une de celles des arbres forestiers qui fournissent le plus de potasse.

Les feuilles peuvent être employées comme fourrage; les bêtes à cornes et les bêtes à laine les mangent volontiers.

#### ARTICLE V.

##### Le Frêne.

149. Il n'y a qu'une seule espèce de frêne qui soit indigène dans nos forêts; c'est le *frêne commun* ou *élevé* (*fraxinus excelsior*, LINNÉ). On le trouve ordinairement parsemé entre les autres bois, et ce n'est que par exception qu'on le voit former l'essence dominante.

150. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — C'est dans les climats tempérés que le frêne prend le plus bel accroissement, mais il réussit aussi dans de plus rigoureux.

On le rencontre dans les plaines et dans les vallons, dans les pentes et sur des plateaux d'une élévation assez considérable. Toutefois, les deux pre-

nières situations, et surtout les vallées ombreuses et fraîches, sont celles qu'il préfère.

Les expositions méridionales sont défavorables à sa croissance.

151. TERRAIN. — Les sols profonds, frais et assez divisés sont les plus convenables au frêne ; aussi est-ce dans les prairies et sur le bord des ruisseaux qu'on lui voit prendre les dimensions les plus fortes. Cependant il ne se plaît pas dans les terrains marécageux. L'argile compacte et le sable pur lui sont contraires, mais on le trouve parfois en assez bon état de croissance dans les sols secs.

152. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est polygame. Les fleurs paraissent avant les feuilles, vers la fin d'avril et quelquefois même plus tôt. Les fruits sont des samares munies d'une aile allongée ; ils se répandent au loin par les vents et mûrissent vers la fin d'octobre. Leur dissémination s'opère en novembre et en décembre, et n'a fort souvent lieu qu'au printemps suivant.

La semence du frêne réussit abondamment presque chaque année et l'arbre devient fertile de bonne heure.

153. JEUNES PLANTS. — Quoique les jeunes frênes ne soient point délicats, ils demandent cependant à être abrités la première année, et l'ombrage continue même à leur être avantageux jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans.

154. FEUILLAGE. — La feuille du frêne est compo-



sée; ses folioles sont petites. Le feuillage est léger et ne donne que peu de couvert.

155. **RACINES.** — Les racines, menues et très-nombreuses, tracent et pivotent tout à la fois. Elles s'enfoncent jusqu'à 1 mètre 50 centimètres et plus, et s'étendent horizontalement à 6 et à 7 mètres. Cette dernière disposition rend le frêne fort nuisible dans les champs et les prés; cependant on l'y plante fréquemment, mais on remarque que, même à une assez grande distance, il y enlève la nourriture aux plantes qui l'avoisinent.

Le frêne drageonne, moins abondamment toutefois que l'orme.

156. **CROISSANCE ET DURÉE.** — Dès sa première jeunesse, le frêne a une croissance très-rapide qui se soutient jusqu'à 70 et 80 ans. À cet âge, l'arbre a souvent de 30 à 33 mètres de hauteur et un diamètre de 66 centimètres à sa base. Il peut atteindre des dimensions bien plus fortes encore, car il vit deux siècles et au delà.

157. **QUALITÉS ET USAGES.** — Le frêne peut être employé avec avantage à la charpente, lorsqu'on le place à couvert ou entièrement sous eau. Mais on le voit fort rarement servir à cet usage, car dès que les pièces sont un peu fortes, elles acquièrent une valeur très-grande comme bois d'ouvrage. Le frêne sert à la menuiserie, à l'ébénisterie et à la boissellerie, mais il est surtout recherché pour le charronnage (particulièrement pour les timons et brancards) à cause de sa

fibres souple et coriace. Les sabotiers et les tourneurs en font grand cas ; on l'emploie aussi dans les manufactures d'armes. Son chauffage et son charbon sont très-estimés et valent ceux du hêtre.

L'écorce peut servir au tannage ; on en retire une couleur bleue.

Les cendres fournissent beaucoup de potasse ; enfin, les feuilles, soit vertes, soit sèches, sont employées, dans les pays pauvres en fourrage, à la nourriture du bétail qui en est très-friand.

## ARTICLE VI.

## Les Erables.

158. On rencontre communément trois espèces d'érable dans nos forêts. Ce sont :

L'*érable sycomore* (*acer pseudo-platanus*, LINNÉ) ;

L'*érable plane* (*acer platanoides*, LINNÉ) ;

Et l'*érable à petites feuilles*, ou *érable champêtre* (*acer campestre*, LINNÉ).

Comme les frênes, les érables ne forment presque jamais l'essence dominante des bois.

159. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Sous le triple rapport du climat, de la situation et de l'exposition, les érables ont à peu près les mêmes exigences que le frêne. Le plane et le sycomore supportent mieux, toutefois, les grandes élévations ; dans les

Alpes, on a trouvé ce dernier à 1,700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

**160. TERRAIN.** — Les sols profonds, frais et divisés sont ceux que les érables préfèrent; mais ils s'accommodent très-bien des terrains de moyenne fertilité, tels que ceux qui conviennent, par exemple, au hêtre avec lequel ils croissent souvent en mélange. L'argile compacte, les sables secs et les marais leur sont entièrement contraires.

**161. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est hermaphrodite, accidentellement et par avortement, polygame. Les fleurs de l'érable plane paraissent vers la fin d'avril, et celles du sycomore et de l'érable champêtre seulement dans le courant de mai. Les fruits sont des samares doubles, dont chacune est munie d'une large membrane en forme d'aile; elles mûrissent en octobre et se disséminent aussitôt.

**162. JEUNES PLANTS.** — Le tempérament des jeunes plants est assez robuste, mais un premier abri leur est nécessaire.

**163. FEUILLAGE.** — Les feuilles du sycomore et celles du plane sont fort grandes; celles de l'érable champêtre le sont beaucoup moins; mais le feuillage de tous trois est abondant et procure un couvert épais.

**164. RACINES.** — Les racines des érables tracent et pivotent à la fois. Leur extension horizontale est beaucoup moindre que celle des racines de frêne, et une profondeur de 30. à 60 centimètres leur suffit.

pour produire de forts beaux arbres. Il est rare qu'elles drageonnent.

**165. CROISSANCE ET DURÉE.** — L'érable sycomore et le plane croissent rapidement dès leur jeunesse ; le premier l'emporte cependant sur son congénère. A l'âge de 60 à 70 ans, ils ont, en sol convenable, une élévation de 20 à 25 mètres, et un diamètre de 66 centimètres à la base. Ils peuvent atteindre des dimensions bien plus fortes encore ; ils vivent en effet jusqu'à 150 et 200 ans, et même au delà.

L'érable champêtre, qui est tantôt arbre et tantôt arbrisseau, croît plus lentement. Dans le premier cas, il peut s'élever de 10 à 15 mètres au plus. Il vit, comme les deux autres, jusqu'à 150 et 200 ans, mais sa croissance se ralentit déjà beaucoup, avant qu'il ait accompli le siècle.

**166. QUALITÉS ET USAGES.** — Les érables ne servent point à la charpente, quoiqu'ils y soient propres, lorsqu'ils sont garantis des variations de l'atmosphère. Le plane et surtout le sycomore sont extrêmement recherchés pour la menuiserie et l'ébénisterie ; ils prennent un beau poli, sont agréablement veinés et d'un beau jaune pâle. Les charrons, les tourneurs et plusieurs métiers encore, en font aussi très-grand cas. L'érable a la propriété de ne point se tourmenter et de n'être pas attaqué par les vers.

Les qualités de ce bois pour le travail rendent nécessairement très-rare son emploi comme chauff-

lage ou comme charbon, quoiqu'il soit supérieur, pour ces usages, à la plupart des autres essences.

Les cendres des érables fournissent beaucoup de potasse.

Leurs feuilles peuvent servir à la nourriture des bêtes à laine; la sève du sycomore, ainsi que celle du plane, contient du sucre, mais pas assez sans doute pour que l'extraction en soit avantageuse.

#### ARTICLE VII.

##### Le Bouleau.

167. Sous le nom générique de bouleau, on réunit, en langage forestier, deux espèces : le *bouleau blanc* (*betula alba*, LINNÉ) et le *bouleau pubescent* (*betula pubescens*, EHRHARDT). Les caractères de ces deux espèces sont purement botaniques, mais les qualités, le tempérament de l'une et de l'autre paraissent identiques et il n'est pas nécessaire, par conséquent, d'en maintenir la distinction dans la pratique.

Quoique très-répandu dans les forêts, le bouleau y forme rarement l'essence dominante. Ce n'est guère que sur les grandes sommités dévolues surtout au bouleau blanc, et quelquefois dans les marais tourbeux que recherche particulièrement le pubescent, qu'on le rencontre seul. Dans d'autres localités, s'il occupe exclusivement le terrain, ce fait est d'ordi-

naire le résultat d'une culture particulière et non l'ouvrage de la nature.

168. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le bouleau supporte les climats les plus froids ; en s'élevant sur les montagnes, on le voit dépasser de beaucoup la limite extrême de toutes les autres essences et c'est, vers le pôle du Nord, le dernier arbre que l'on rencontre. Les étés chauds et prolongés ne lui sont pas favorables, et dans le Midi, il ne réussit que sur les grandes sommités. Sur les Pyrénées, on trouve encore des bouleaux à près de 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les régions tempérées n'en sont pas moins celles qu'il préfère, et où il prend le plus bel accroissement. Dans ces régions, il prospère particulièrement aux expositions du Sud-Est et du Sud-Ouest, quoique les autres ne lui soient point absolument contraires.

169. TERRAIN. — Le sol qui convient le mieux au bouleau est un sable gras ; mais cet arbre se contente d'ailleurs d'un terrain médiocre et d'une nature quelconque, pourvu qu'il ne soit pas trop compacté. Le bouleau blanc ne se plaît pas dans les sols marécageux dont le pubescent, au contraire, s'accommode très-bien.

170. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque et amentacée pour les deux sexes ; les fleurs paraissent en même temps que les feuilles, vers la fin d'avril. Le fruit est un cône et mûrit dans les derniers jours du mois d'août ou au commence-

ment de septembre. Les semences se disséminent immédiatement et tombent avec les écailles qui se détachent de l'axe ; elles sont très-petites, munies d'une membrane légère et se répandent fort loin par les vents.

Le bouleau devient fertile à un âge peu avancé, et sa graine réussit presque tous les ans.

171. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants sont vigoureux dès leur naissance et résistent aux froids comme aux ardeurs du soleil.

172. FEUILLAGE. — Les feuilles sont petites, peu abondantes, et ne donnent qu'un couvert fort léger qui n'empêche point la végétation autour de l'arbre. Cette propriété, avantageuse quelquefois, est souvent, cependant, un obstacle à la bonne croissance du bouleau, lorsqu'il forme l'essence dominante. En effet, les rayons du soleil, ayant action sur la surface du sol, en pompent l'humidité, empêchent que le terrain ne s'amende par la décomposition des feuilles mortes et, de plus, favorisent la crue des herbes et des arbustes nuisibles.

173. RACINES. — Les racines du bouleau sont nombreuses, déliées et très-traçantes ; lorsqu'elles sont entièrement à découvert, elles produisent assez fréquemment des drageons.

174. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du bouleau est rapide, mais elle se ralentit considérablement vers la 60<sup>e</sup> année. Sa durée ne dépasse pas ordinairement 80 à 90 ans.

175. **QUALITÉS ET USAGES.** — Le bouleau sert rarement à la bâtisse, et ce n'est qu'à couvert qu'il peut être employé à cet usage ; mais il est très-estimé pour le charonnage, la menuiserie, la fabrication des sabots, etc. ; sa fibre est coriace, et il a, comme l'érable, la précieuse propriété de ne point se gercer et d'être à l'abri de la vermoulure.

Le bouleau produit un assez bon chauffage, il brûle avec une flamme claire et égale. Son charbon est aussi fort estimé, et ses jeunes rameaux servent à faire des balais.

L'écorce est employée au tannage dans le Nord ; elle contient une huile essentielle qui communique au cuir de Russie l'odeur qui le caractérise. En Pologne et en Russie, on prépare avec la sève du bouleau une espèce de vin et d'assez bon vinaigre.

#### ARTICLE VIII.

##### Le Robinier faux Acacia.

176. Le *robinier faux acacia* (*robinia pseudo-acacia*, LINNÉ), originaire de l'Amérique septentrionale a été introduit en France sous Henri IV, par Robin. Il est parfaitement acclimaté et, chaque année, se propage de plus en plus. Ses précieuses qualités, la rapidité de sa croissance et la beauté de son port justifient la faveur dont il jouit parmi les arboriculteurs.

177. **CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION.** — Les climats



rigoureux ne conviennent pas au robinier ; il demande, pour prospérer, une température douce et égale, et les grands froids le font souvent périr entièrement. Aussi est-ce dans les pays de plaines et de coteaux que sa culture est réellement avantageuse. On doit, autant que possible, placer les bois de robiniers dans des situations abritées des grands vents, car cet arbre se casse très-facilement.

Les expositions chaudes sont celles qu'il préfère.

178. TERRAIN. — Le robinier prospère dans les terrains légers, mais substantiels, et principalement dans les sables gras pourvus de terreau. Les sols arides, ou mouilleux, ou trop compactes lui sont contraires.

179. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Le robinier fleurit au commencement de juin ; ses fleurs sont hermaphrodites. Les semences sont petites, rondes et sans ailes ; elles sont renfermées dans une gousse à laquelle elles demeurent adhérentes en tombant, ce qui donne plus de prise au vent pour les emporter. Elles mûrissent au mois d'octobre, mais la dissémination n'a lieu que pendant l'hiver ou au printemps suivant.

Le robinier devient fertile fort jeune, ses années de semence sont fréquentes.

180. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants ne craignent point les ardeurs du soleil, mais ils ont besoin, dans les premières années, d'un abri contre les froids trop vifs.

181. FEUILLAGE. — Les feuilles du robinier sont

composées ; leurs folioles sont petites et légères et ne donnent que peu de couvert.

182. **RACINES.** — Les racines s'enfoncent jusqu'à 33 et 66 centimètres, lorsque le sol le permet ; mais elles tracent surtout et s'étendent fort loin. Elles sont nombreuses, munies d'un chevelu très-abondant et très-disposées à drageonner.

183. **CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du robinier est des plus rapides. A l'âge de 40 ans, il a souvent une hauteur de 12 et même de 18 mètres sur 66 centimètres de diamètre à la base. Sa durée ne semble pas pouvoir se prolonger au delà de 80, 90 et 100 ans au plus.

184. **QUALITÉS ET USAGES.** — Le bois de robinier résiste fort longtemps à la pourriture, et cette qualité, jointe à une grande dureté le rend très-propre à la bâtisse, dans les places où les pièces de bois sont le plus exposées aux variations de température et aux injures de l'atmosphère.

En Amérique, on s'en sert même pour des constructions maritimes quand on en trouve des échantillons convenables.

Comme bois de travail, on l'estime beaucoup ; il prend un très beau-poli, est agréablement nuancé, et sert à la menuiserie et à l'ébénisterie. Les échelas de vigne fournis par le robinier ont plus de durée que ceux d'aucun autre bois. En Angleterre, il est l'essence préférée pour les gournables, parce qu'il se durcit beaucoup en vieillissant.

Sa qualité, comme bois de chauffage, passe généralement pour assez médiocre; cependant, d'après l'expérience de T. Hartig, il donne beaucoup de chaleur rayonnante, ce qui le rendrait très-propre au chauffage à foyer ouvert.

Ses feuilles fournissent un fourrage excellent.

#### ARTICLE IX.

##### Le Charme.

185. Le *charme commun* (*carpinus betulus*, LINNÉ) est un des bois les plus utiles et les plus répandus de nos forêts. Ordinairement, on l'y trouve mélangé avec le chêne, le hêtre, le tilleul, le tremble, etc. : mais souvent aussi il occupe des étendues considérables comme essence dominante.

186. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le charme supporte les climats rigoureux, mais il prospère davantage dans les tempérés. Aussi est-ce dans les plaines, sur les coteaux et les montagnes de moyenne hauteur qu'on le rencontre le plus fréquemment et qu'il prend l'accroissement le plus beau. Il s'accommode à peu près de toutes les expositions; néanmoins, sa végétation est peu satisfaisante dans les pentes entièrement méridionales.

187. TERRAIN — Les sols argileux, divisés par le sable ou par de petites pierrailles et riches en terreau, sont ceux que le charme préfère; mais il croît aussi dans les fonds de moindre qualité, fussent-ils même

un peu humides. Les terrains secs et arides, ou trop compactes, ou marécageux lui sont contraires.

**188. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque et en chatons cylindriques pour les deux sexes. Les fleurs paraissent en même temps que les feuilles, au commencement de mai. Le fruit qui mûrit en octobre et se dissémine immédiatement après, est un petit gland ovale, muni de côtes saillantes et renfermé dans une cupule foliacée. Cette cupule est assez grande pour favoriser la dispersion de la graine par les vents.

Dès l'âge de 30 ans le charme devient fertile, et la semence réussit abondamment presque chaque année.

**189. JEUNES PLANTS.** — Les jeunes charmes supportent mieux les froids rigoureux que les gelées printanières, et ils se trouvent bien d'être garantis pendant plusieurs années des ardeurs du soleil.

**190. FEUILLAGE.** — Les feuilles sont de moyenne grandeur, d'un tissu assez serré et très-abondantes ; elles donnent un couvert épais, quoique moindre que celui du hêtre.

**191. RACINES.** — On ne remarque point chez le charme un pivot bien caractérisé ; mais ses racines ont toutes une tendance à s'enfoncer obliquement dans le sol où elles pénètrent souvent jusqu'à un mètre et plus de profondeur ; elles sont nombreuses, s'étendent au loin et drageonnent facilement.

**192. CROISSANCE ET DURÉE.** — Sous le rapport de

la croissance, le charme égale le hêtre jusqu'à l'âge de 30 à 40 ans ; mais, après cette époque, il est d'ordinaire dépassé par ce dernier. Ce n'est toutefois qu'à 70 ou 80 ans que son accroissement commence à se ralentir, et on le voit végéter en très-bon état jusqu'à 130 et même 150 ans.

193. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois de charme est d'une densité très-égale ; il est très-dur et sa fibre est coriace. On l'emploie peu à la charpente, parce qu'il résiste mal à l'action de l'humidité et aux variations de la température et que, d'ailleurs, ses dimensions en grosseur et en hauteur sont rarement convenables pour cet usage. Sous le rapport de la grosseur, le charme offre, en effet, cette particularité, que son tronc n'est presque jamais rond comme celui des autres bois ; il présente des cannelures nombreuses, irrégulières, souvent très-profondes, qui rendent difficile, par conséquent, son équarrissage.

C'est surtout comme bois de travail qu'il est précieux. Il est employé par les charrons ; on en fait des roues d'engrenage, des leviers, différents instruments aratoires, et en général toute espèce de pièces exposées à un frottement continu ou à une forte pression. Son chauffage et son charbon sont de première qualité et supérieurs à ceux du hêtre.

Les cendres du charme fournissent beaucoup de potasse, et son feuillage, vert ou sec, sert à la nourriture des bestiaux.

## ARTICLE X.

## L'Alisier.

194. Nos forêts présentent communément deux espèces d'alisier, que l'on trouve mélangées parmi les autres bois. Ce sont :

1° *L'alisier blanc* ou *allouchier* (*pyrus aria*, EHRHARDT) ;

2° *L'alisier torminal* (*pyrus torminalis*, EHRHARDT).

195. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — L'alisier torminal et surtout l'alisier blanc supportent les climats froids de nos hautes montagnes, mais leur croissance y est lente ; la plupart du temps, ils y dégénèrent en arbrisseaux. Ce n'est que dans les régions tempérées qu'ils ont une belle végétation, et tous deux prospèrent principalement dans les plaines et sur les coteaux.

Les expositions entièrement méridionales ralentissent la croissance des alisiers qui paraissent se plaire principalement à celles de l'Ouest, de l'Est et du Sud-Est.

196. TERRAIN. — Les alisiers réussissent dans toutes sortes de terrains ; mais ils semblent surtout préférer les sols calcaires ou argileux, assez profonds et mélangés de terreau. Ils ne supportent ni les sables secs, ni les fonds humides ou marécageux.

197. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Les fleurs des alisiers sont hermaphrodites ; elles paraissent

dans le courant de mai, quelquefois au commencement de juin, selon la température. Les fruits qui leur succèdent sont de petites pommes rouges, presque sèches et non comestibles pour l'alisier blanc, molles et comestibles lorsque, après avoir fermenté, elles deviennent blettes pour l'alisier torminal. Ils mûrissent au mois d'octobre et leur dissémination a lieu dans le courant de l'hiver. Dès l'âge de 20 ans, les alisiers deviennent fertiles.

198. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants sont assez robustes ; un léger abri semble cependant leur être favorable dans les premières années.

199. FEUILLAGE. — Les feuilles sont grandes, épaisses, et donnent un couvert assez complet.

200. RACINES. — Les racines des alisiers sont à la fois traçantes et pivotantes, lorsque le sol le permet. Elles s'accommodent cependant d'un terrain sans profondeur, et semblent avoir une disposition particulière à pénétrer dans les fentes des rochers, où elles trouvent souvent une nourriture abondante, produite par le détritux des végétaux qui y est retenu. Elles sont nombreuses et fournissent des drageons.

201. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance des alisiers est lente. Leur durée peut se prolonger jusqu'à 200 ans et au delà, mais leur accroissement diminue beaucoup dès l'âge de 90 ou 100 ans. Ils s'élèvent jusqu'à 15 et 20 mètres et prennent de 40 à 66 centimètres de diamètre à la base. L'alisier blanc paraît moins disposé à croître en hauteur que le torminal.

202. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois des alisiers est très-dur, blanc, d'un grain égal et serré ; il prend un beau poli. Parmi les bois d'ouvrage, il figure au premier rang. Il est précieux pour les dents de roues, les écrous, les vis, etc. ; on en fait toutes sortes de petits meubles ; il sert aux sculpteurs, aux tourneurs, aux fabricants d'instruments de musique, etc.

Son chauffage et son charbon sont fort estimés, Ainsi que nous l'avons dit [197], les fruits de l'alisier torminal, que l'on nomme *alises* ou *aloses*, peuvent se manger lorsqu'on les a laissé blétir ; on en distille aussi de l'eau-de-vie, et l'on en fabrique du vinaigre.

#### ARTICLE XI.

##### Le Sorbier.

203. On trouve dans nos forêts deux espèces de sorbier :

*Le sorbier des oiseleurs* (*pyrus aucuparia*, GÆRTNER) ;

*Le sorbier cormier* (*pyrus sorbus*, GÆRTNER).

Tous deux n'y existent que mêlés avec les autres essences ; le premier est bien plus répandu que le second.

204. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le climat tempéré est celui où ces deux sorbiers prospèrent le mieux ; mais on trouve le sorbier des oiseleurs sur les plus grandes hauteurs, où il finit, à la vérité, par



dégénérer en arbrisseau, tandis que l'on voit le cormier rechercher les plaines et les vallées abritées.

Le sorbier des oiseleurs réussit à toutes les expositions ; mais le cormier préfère celles où le soleil est moins ardent, et où la terre conserve, par conséquent, plus de fraîcheur.

205. TERRAIN. — Le sorbier des oiseleurs se contente de toute espèce de terrain pourvu qu'il ne soit point humide. Les sols siliceux mêlés de terreau, ainsi que les argiles divisées sont ceux qu'il préfère ; le cormier au contraire, bien plus difficile sous ce rapport que son congénère, se plaît davantage dans les sols calcaires et dans les terres fortes. On voit souvent le sorbier des oiseleurs prendre racine et croître dans les fentes des rochers, et même sur de vieilles murailles.

206. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Les fleurs des sorbiers sont hermaphrodites ; elles paraissent vers la fin de mai ou au commencement de juin. Le fruit du sorbier des oiseleurs est une petite pomme sèche, rouge et non comestible ; celui du cormier est de la grosseur d'une petite poire. Lorsqu'il a subi un commencement de fermentation, il blêmit et devient comestible ; on l'appelle *sorbe*. La maturité de l'un et de l'autre a lieu vers la fin de septembre ou au commencement d'octobre, et la dissémination naturelle s'opère dans le courant de l'hiver.

Le sorbier des oiseleurs devient fertile fort jeune.

mais il faut près de 60 ans au cormier pour qu'il porte des fruits en abondance.

207. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants du sorbier des oiseleurs sont robustes dès leur naissance ; un premier abri pourrait être utile à ceux du cormier.

208. FEUILLAGE. — Le feuillage des sorbiers est délicat, et ne donne qu'un couvert fort léger.

209. RACINES. — Ces deux sorbiers ont un pivot très-prononcé qui pénètre jusqu'à 1 mètre 33 centimètres et plus, lorsque le sol le permet. Leurs racines traçantes sont nombreuses, s'étendent au loin et drageonnent facilement.

210. CROISSANCE ET DURÉE. — Le sorbier des oiseleurs a une croissance peu rapide. A l'âge de 60 ou 70 ans, il atteint une hauteur de 8 à 10 mètres, sur 33 à 50 centimètres et plus de grosseur. Il vit jusqu'à 100, 120 ans et au delà.

La végétation du cormier est plus lente encore ; mais, vivant plus longtemps, il parvient à des dimensions plus considérables. Il prend jusqu'à 20 mètres de hauteur sur une grosseur de près d'un mètre à la base. Sa durée varie de 150 à 200 ans.

211. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois des sorbiers est dur, pesant, coriace, et prend un beau poli. Il est recherché par les menuisiers, les ébénistes, les tourneurs et les mécaniciens. Ces derniers en fabriquent des dents de roue, des vis, des écrous, des chevilles, etc. Le chauffage et le charbon en sont fort estimés ; l'écorce peut servir au tannage.

Le fruit du sorbier des oiseleurs, ainsi que l'indique son nom, sert d'appât pour prendre les oiseaux. Celui du cormier, comme nous l'avons dit [206], est bon à manger lorsqu'on le laisse blétir sur la paille. On en fabrique une espèce de cidre, du vinaigre et de l'eau-de-vie.

## ARTICLE XII.

## Le Micocoulier.

212. Nous n'avons qu'une seule espèce de micocoulier qui soit indigène. C'est le *micocoulier de Provence* (*celtis australis*, LINNÉ); on l'appelle aussi *fabrecoulier*, *falabriquier* et *fabrégulier*. Il appartient principalement (comme l'indique son nom) aux départements méridionaux.

On ne connaît aucun massif formé par le micocoulier, mais on le cultive sur différents points, et les nombreux avantages que présente cette culture doivent faire désirer qu'elle se propage le plus possible.

213. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Ainsi que nous venons de le dire, le micocoulier appartient plus particulièrement aux climats chauds; malgré cela, il réussit fort bien dans les parties tempérées de la France, lorsqu'on a soin de le garantir, dans sa jeunesse, des froids trop vifs.

Les plaines et les élévations moyennes paraissent convenir également au micocoulier, et il prospère à toutes les expositions.

**214. TERRAIN.** — Le micocoulier n'est pas difficile pour le choix des terrains ; toutefois il préfère ceux qui sont profonds, légers et un peu frais. On le trouve, dit-on, en bon état de croissance dans des sols secs, rocailleux où d'autres essences ne croîtraient qu'avec peine.

**215. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est polygame. Les fleurs paraissent en mai avec les feuilles. Le fruit est une petite drupe ronde, peu charnue, renfermant un noyau ligneux ; il est mûr au mois de novembre et ne se dissémine ordinairement qu'au printemps suivant.

L'arbre porte fruit à un âge peu avancé.

**216. JEUNES PLANTS.** — Les jeunes plants du micocoulier résistent facilement, à ce qu'il paraît, aux ardeurs du soleil, mais ils ont besoin d'être garantis du froid dans le centre, le nord et l'est de la France. Ordinairement, on les recouvre en hiver de feuilles mortes ou de paille, jusqu'à ce qu'ils aient atteint une hauteur de 66 centimètres à 1 mètre, après quoi ils deviennent très-robustes.

**217. FEUILLAGE.** — Les feuilles du micocoulier sont grandes, leur couvert néanmoins n'est pas épais.

**218. RACINES.** — Lorsque le sol le permet, le micocoulier pivote assez profondément ; mais il pousse aussi de nombreuses racines traçantes, au moyen desquelles il peut se passer de pivot dans les sols peu profonds. Il drageonne, dit-on, assez fréquemment.

**219. CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du micocoulier est rapide, et sa durée est de plusieurs siècles. Dans les climats convenables, il atteint, à l'âge de 50 à 60 ans, une hauteur de 12 à 16 mètres sur 50 à 60 centimètres de diamètre à la base.

Il existe dans les environs de Montpellier un micocoulier de 3 mètres de circonférence. Celui qui se voit sur une des places de la ville d'Aix est plus gros encore.

**220. QUALITÉS ET USAGES.** — Le bois du micocoulier est plus dur, plus coriace et plus souple que la plupart des autres bois ; aussi est-il très-recherché pour le charromage et pour divers autres usages tels que menuiserie, marqueterie, sculpture, etc. On en fait aussi d'excellents cercles de tonneaux, des fourches, des baguettes de fusil, et surtout des manches de fouets, que l'on connaît dans le commerce sous le nom de *bois de Perpignan*, et que l'on apprécie beaucoup à cause de leur souplesse.

Comme chauffage, il est fort estimé.

Ses feuilles servent à nourrir les moutons et les chèvres.

#### ARTICLE XIII.

##### Le Cerisier.

**221.** On trouve trois espèces de cerisier dans nos forêts :

1° Le *cerisier merisier* ou *des bois* (*cerasus avium*, de CANDOLLE) ;

2° Le *cerisier à grappes* (*cerasus padus*, de: CAN-DOLLE);

3° Le *cerisier mahaleb* ou *bois de Sainte-Lucie* (*cerasus mahaleb*, MILLER.)

La première espèce est la plus répandue, quoiqu'elle n'existe jamais comme essence dominante et, sous le rapport de ses qualités et de sa croissance, elle est aussi la plus importante. Les deux autres, qui ne se rencontrent que plus rarement et presque toujours sous forme d'arbrisseau, ne sont que d'un intérêt très-secondaire pour le forestier. Nous ne nous occuperons donc ici que du merisier.

222. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le merisier ne redoute pas les climats un peu rudes, tout en préférant les tempérés, et on le trouve abondamment, dans les pays de montagnes, à des situations même assez élevées; il prospère également en plaine.

Toutes les expositions lui conviennent, quoiqu'il semble se plaire plus particulièrement à celles du Midi et de l'Ouest.

223. TERRAIN. — Les terrains légers et substantiels, quelle que soit d'ailleurs leur nature, conviennent au merisier. Mais il vient aussi dans les fonds médiocres et sans profondeur, pourvu qu'il puisse y étendre ses racines. Les sols humides lui sont entièrement contraires, et il ne prospère pas dans les argiles compactes et dans les sables secs.

224. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Les fleurs du merisier sont hermaphrodites; elles paraissent

à la fin d'avril ou au commencement de mai. Le fruit, que l'on nomme cerise des bois ou *merise*, est une petite drupe charnue et noire qui mûrit dans le mois de juin ou de juillet, et qui tombe un mois ou six semaines après.

Les merisiers portent fruit très-jeunes.

225. JEUNES PLANTS. — Le tempérament des jeunes plants est très-robuste. L'ombre leur est absolument contraire.

226. FEUILLAGE. — Quoique les feuilles de cet arbre soient grandes, elles ne procurent qu'un couvert fort léger.

227. RACINES. — Les racines sont nombreuses et traçantes; elles s'étendent fort loin et drageonnent abondamment.

228. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du merisier est très-rapide et, à l'âge de 15 ans, il a déjà les dimensions d'un chêne de 50. Dans une période de 50 à 60 ans, il prend de 25 à 28 mètres de hauteur sur 1 mètre à 1 mètre 33 centimètres de grosseur au pied. Son existence ne se prolonge que jusqu'à 70 ou 80 ans au plus.

229. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois du merisier n'est point employé pour les constructions, mais il est d'autant plus recherché comme bois de travail, par les menuisiers, les ébénistes, les tabletiers et même les luthiers. Lorsqu'il est jeune, on l'emploie beaucoup à faire des cercles, car il est très-liant. Son

chauffage et son charbon, sans être de première qualité, sont cependant assez estimés.

Les merises servent de nourriture aux oiseaux destructeurs d'insectes et, sous ce rapport, elles sont d'une utilité réelle, quoique indirecte, pour le forestier. On en retire, par la distillation, une liqueur fort appréciée, connue sous le nom de *kirsch-wasser*, et qui, en France, se prépare principalement dans les départements des Vosges, de la Haute-Saône, du Haut et du Bas-Rhin. La gomme qui découle assez abondamment des merisiers sur le retour est employée, dans beaucoup de cas, à l'égal de la gomme arabique.

#### ARTICLE XIV.

##### L'Aune.

230. On connaît dans nos forêts deux espèces d'aunes : L'*aune commun*, *aune visqueux*, appelé aussi *verne* ou *vergne* (*alnus glutinosa*, GÆRTNER); et l'*aune blanc* (*alnus incana*, WILDENOW.) Ce dernier est peu répandu.

Les aunes n'admettent point les autres essences en mélange avec eux et, dans les parties de forêts qu'ils habitent, on les trouve presque toujours maîtres exclusifs du terrain. Le frêne est peut-être la seule essence qui puisse leur être adjointe avec avantage.

231. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — L'aune est un des arbres les moins difficiles sous le rapport du



climat; Desfontaines dit qu'on le trouve depuis la Laponie jusque sur les côtes septentrionales de l'Afrique. Il en est à peu près de même quant à la situation ; car, si on le rencontre dans les plaines et dans les fonds humides qu'il recherche de préférence, on le retrouve cependant aussi dans les vallées fort élevées des Alpes et des autres régions montagneuses ; là il finit, à la vérité, par dégénérer en buisson. C'est surtout l'aune blanc qui habite les régions froides et élevées, où cependant son congénère le saule souvent d'assez près.

Quant aux expositions, l'aune paraît préférer les moins chaudes.

232. TERRAIN. — C'est principalement sur le bord de l'eau, dans les terrains humides et même aquatiques, que l'aune prend un bel accroissement. Il prospère cependant aussi dans d'autres sols, pourvu qu'ils soient substantiels, frais et divisés. Les terres glaises lui sont absolument contraires.

Dans les marais, dont il s'accommode sans toutefois les préférer, l'aune est précieux, non-seulement parce qu'il utilise des terrains qui sans lui demeureraient improductifs, mais encore parce qu'il en neutralise les émanations malfaisantes.

233. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison de l'aune est monoïque et amentacée pour les deux sexes ; les fleurs paraissent dans le mois de mars, avant les feuilles. Le fruit qui leur succède est un petit cône ligneux et brunâtre dont les écailles per-

sistent sur l'aune et s'entr'ouvrent simplement pour laisser échapper les graines. Celles-ci, bordées d'une aile peu développée, sont mûres en octobre et se disséminent à l'entrée de l'hiver ou au printemps, selon la température. Les aunes deviennent fertiles dès l'âge de 12 à 15 ans.

234. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants de l'aune n'ont pas besoin d'abri, pourvu que le sol dans lequel ils lèvent ait de la fraîcheur ; ils se montrent assez sensibles aux gelées printanières.

235. FEUILLAGE. — La feuille de l'aune est grande et épaisse ; mais le couvert que son feuillage procure est, malgré cela, assez incomplet. Cette circonstance, réunie à la fraîcheur des terrains dans lesquels végète l'aune, fait que le sol se couvre très-souvent d'herbes et de plantes diverses et n'est point meuble, comme dans d'autres forêts. Cependant, dans les sols aquatiques, que l'aune occupe à l'exclusion de presque toutes les autres essences, cet envahissement ne se produit pas.

236. RACINES. — Les racines de l'aune sont nombreuses ; elles pivotent peu, mais tracent au loin, surtout quand le sol est très-humide. L'aune commun drageonne peu, tandis que l'aune blanc a cette propriété au plus haut degré.

237. CROISSANCE ET DURÉE. — L'accroissement de l'aune est très-rapide dès sa jeunesse. A l'âge de 40 à 50 ans, il atteint souvent jusqu'à 20 et 25 mètres de hauteur sur 50 à 66 centimètres de diamètre au

pied. Il acquiert même des dimensions plus fortes, et vit, en bon état de croissance, jusqu'à 80 et 90 ans.

**238. QUALITÉS ET USAGES.** — L'aune n'est point propre à la charpente en plein air, ni même à couvert, parce qu'il se pique facilement; mais, employé sous eau, il est de la plus grande durée. Aussi le recherche-t-on surtout pour les constructions hydrauliques, telles que corps de fontaine et de pompe, pilotis, digues, galeries dans les mines, etc.

Comme bois de travail, il est également fort estimé des tourneurs, des menuisiers et des ébénistes. Il a le grain fin, égal, est agréablement veiné et prend un beau poli. On dit que l'aune blanc est préférable, pour ces divers usages, à l'aune commun.

Le chauffage et le charbon de l'aune ne sont pas de première qualité; cependant il gagne considérablement sous ce rapport lorsqu'on a soin de le mettre en lieu sec, aussitôt après l'abatage. Traité ainsi, il brûle d'une flamme claire et égale, et les boulangers le préfèrent à tout autre bois pour chauffer le four. Les expériences comparatives faites sur la valeur calorifique des deux aunes, établissent encore la supériorité de l'aune blanc. Cette circonstance, jointe à la précédente, doit encourager sa culture.

Les cendres de l'aune fournissent beaucoup de potasse. Son écorce peut servir utilement au tannage; on en obtient aussi une couleur brune ou noire qui est employée à teindre les cuirs et les feutres.

Les bêtes à cornes mangent les feuilles d'aune, mais s'en soucient peu ; les bêtes à laine les refusent absolument.

## ARTICLE IV.

## Le Tilleul.

239. On connaît en France deux espèces de tilleuls indigènes :

Le *tilleul à petites feuilles, tilleul sauvage ou des bois* (*tilia microphylla*, VENTNAT) ;

Le *tilleul à larges feuilles ou de Hollande* (*tilia platyphylla*, SCOPOLI).

C'est le premier que l'on rencontre d'ordinaire dans les forêts, mêlé aux autres bois ; le second s'y trouve aussi, mais rarement.

240. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Les tilleuls prospèrent à peu près dans toute espèce de climat ; on les trouve dans les plaines comme sur les montagnes élevées. Le tilleul sauvage est celui qui supporte le mieux les climats rigoureux et les grandes hauteurs, quoique sa croissance et ses dimensions y soient bien moindres que dans les régions tempérées.

Les expositions du Nord-Ouest et du Nord paraissent être celles que préfèrent les tilleuls, mais on les trouve aussi en assez bon état de croissance aux autres aspects du soleil.

241. TERRAIN. — Les tilleuls se plaisent principa-

lément dans un sol sablonneux, profond et frais; on les voit aussi prospérer dans les terrains argileux, pourvu qu'ils soient suffisamment divisés; les glaises et les marais leur sont contraires. Le tilleul des bois se contente quelquefois des terrains les plus ingrats, tels que les rocailles et les sables quartzeux.

242. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Les fleurs du tilleul sont hermaphrodites. Celles du tilleul à larges feuilles paraissent vers la fin de juin ou au commencement de juillet, et celles du tilleul des bois quinze jours plus tard.

Le fruit, qui est une petite noix globuleuse et velue, renfermant ordinairement une et quelquefois deux graines, mûrit en octobre et se dissémine à l'entrée de l'hiver.

Les tilleuls portent semence abondamment et à un âge peu avancé.

243. JEUNES PLANTS. — Un premier abri paraît favorable aux jeunes plants qui redoutent les chaleurs trop vives; ils sont du reste d'un tempérament robuste.

244. FEUILLAGE. — Le feuillage des tilleuls est abondant, touffu, et procure un couvert épais.

245. RACINES. — Cet arbre a un pivot très-prononcé qui s'enfonce jusqu'à 1 mètre et 1 mètre 50 centimètres. Les racines traçantes sont très-nombreuses, et s'étendent à des distances très-considérables; elles drageonnent assez fréquemment.

246. CROISSANCE ET DURÉE. — Le tilleul croît avec

rapidité dans sa jeunesse ; à l'âge de 80 à 100 ans, il atteint une hauteur de 20 à 30 mètres sur 66 centimètres à 1 mètre de diamètre à la base. Passé cet âge, il continue à croître en grosseur, mais il commence ordinairement à se creuser dans le centre. Cette circonstance ne l'empêche pas cependant de végéter avec vigueur et de parvenir à un âge très-avancé. Le tilleul est un des bois qui fournissent les exemples les plus remarquables de longévité. On connaît, tant en France qu'en Allemagne, un assez grand nombre de ces arbres dont on porte l'âge à 200, 300 et même jusqu'à 500 ans et plus. Plusieurs d'entre eux présentent jusqu'à 10, 12 et 13 mètres de circonférence à la base. Tous ces arbres sont de l'espèce à larges feuilles (*platyphylla*) ; le tilleul sauvage croît un peu moins vite et ne dure pas au delà de 200 ou de 300 ans au plus.

247. QUALITÉS ET USAGES. — Le tilleul n'est point propre à la charpente, mais il est très-estimé pour la menuiserie, l'ébénisterie et même pour la sculpture. Son bois est tendre, très-blanc, d'un grain égal et fin ; il ne se gerce et ne se tourmente point, et n'est pas sujet à la vermoulure.

Le chauffage du tilleul est peu prisé ; son charbon est aussi très-médiocre comme combustible ; mais on s'en sert avec avantage pour la fabrication de la poudre à tirer.

L'écorce (principalement le liber) est employée à

la fabrication de cordes qui sont très-estimées à cause de leur force et de leur souplesse.

Les feuilles, vertes ou séchées, peuvent servir avec avantage à la nourriture des bêtes à laine.

#### ARTICLE XVI.

##### Le Peuplier.

248. Le genre des peupliers est fort nombreux et mérite toute l'attention du planteur. Mais une seule espèce croît spontanément dans nos bois; c'est le *peuplier tremble* (*populus tremula*, LINNÉ). C'est donc de lui seul que nous nous occuperons ici (1).

249. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le tremble préfère les climats tempérés; il résiste cependant aussi dans les régions froides et élevées, quoiqu'il y dégénère en arbrisseau. Les climats chauds lui paraissent contraires. Ainsi l'on remarque que, par

(1) Les autres espèces de peuplier sont :

1<sup>o</sup> Le *peuplier blanc*, appelé aussi *ypréau*, *blanc de Hollande* (*populus alba*, LINNÉ);

2<sup>o</sup> Le *peuplier grisaille* (*populus canescens*, SMITH);

3<sup>o</sup> Le *peuplier noir* (*populus nigra*, LINNÉ);

Ces trois espèces croissent spontanément dans les îles et sur les bords du Rhin; mais, à part cette région, on ne les retrouve guère en France que cultivées;

4<sup>o</sup> Le *peuplier d'Italie* ou *pyramidal* (*populus fastigiata*, POIRET).

Cette espèce, dont on connaît maintenant les pieds femelles, est originaire d'Orient.

delà la Loire, en se dirigeant vers le Midi, il devient de plus en plus rare et qu'il disparaît même tout à fait dans les départements les plus chauds de la France. Les expositions du Nord et de l'Est lui conviennent particulièrement, mais il prospère aussi aux autres aspects.

**250. TERRAIN.** — Les sols légers, frais et même humides, sont ceux où le tremble prend le plus bel accroissement ; on le rencontre dans les terres fortes comme dans les sables purs, mais il y reste chétif. Les marais lui sont contraires.

**251. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison du peuplier tremble est dioïque et en chatons cylindriques pour les deux sexes ; les fleurs paraissent avant les feuilles, dès le mois de mars. Les fruits réussissent avec une extrême abondance chaque année ; ce sont des capsules qui contiennent une grande quantité de graines, pour ainsi dire microscopiques, munies d'une aigrette soyeuse et souvent transportées par les vents à plusieurs lieues.

L'arbre devient fertile vers l'âge de 20 à 25 ans.

**252. JEUNES PLANTS.** — Les jeunes plants sont très-robustes et résistent, dès leur naissance, à toutes les influences de l'atmosphère. Ils restent très-petits la première année ; mais, à la seconde, ils prennent un accroissement plus rapide que celui de la plupart des autres bois. Cette circonstance, jointe à l'abondance et à la facilité avec lesquelles sa graine se répand au loin, fait que le tremble s'introduit dans toutes les



forêts, ne tarde pas à s'y multiplier et à végéter aux dépens des essences plus précieuses, si des exploitations bien entendues n'y mettent obstacle.

253. FEUILLAGE. — Le feuillage du tremble est très-léger, mobile et peu abondant ; il ne donne, par conséquent, qu'un couvert très-incomplet.

254. RACINES. — Le tremble est entièrement traçant. Ses racines sont fort nombreuses, s'étendent très-loin et produisent des drageons en abondance.

255. CROISSANCE ET DURÉE. — Ainsi qu'on vient de le dire, la croissance du tremble est des plus rapides. A l'âge de 50 à 60 ans, il acquiert une hauteur de 25 à 30 mètres, sur 66 centimètres et même plus de diamètre au pied. Passé cet âge, il se pourrit ordinairement à l'intérieur ; cette circonstance a même lieu plus tôt, lorsqu'il se trouve dans un sol humide ou très-substantiel.

256. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois du tremble est très-tendre, blanc et chargé d'humidité, ce qui fait qu'il prend beaucoup de retrait. Dans les pays où le sapin manque, on emploie le tremble à la charpente en lieu sec. Il peut servir aussi, comme l'aune, à des conduites d'eau, parce qu'il résiste très-longtemps à la pourriture, surtout dans les terrains humides.

Comme bois de travail, il est employé à la menuiserie, à la sculpture, à l'ébénisterie, etc. L'arbre se garnissant peu de branches et n'étant, par conséquent, pas noueux, on en fabrique beaucoup de

voliges, ou planches très-minces, dont on se sert pour l'intérieur des meubles et surtout pour les caisses d'emballage.

Son chauffage est de mauvaise qualité, mais on l'emploie volontiers pour chauffer le four, parce qu'il brûle promptement et avec une flamme très-vive ; son charbon est recherché pour la fabrication de la poudre à tirer.

L'écorce peut servir au tannage, et les feuilles, vertes ou sèches, peuvent s'employer comme fourrage pour les bêtes à laine et même pour les chevaux.

## ARTICLE XVII.

## Le Saule.

257. Parmi la grande quantité d'espèces et de variétés qui composent le genre des saules, un assez grand nombre croissent spontanément dans nos forêts. Deux espèces, cependant, méritent seules l'attention du forestier, tant à cause de l'abondance avec laquelle elles sont répandues et de leurs grandes dimensions, que par rapport aux avantages que présente leur culture. Ce sont :

Le *saule marceau* (*salix capræa*, LINNÉ) ;

Le *saule blanc* (*salix alba*, LINNÉ).

Une variété de ce dernier, à rameaux d'un jaune orangé vif au printemps, est connue sous le nom de *saule osier jaune* (*salix vitellina*, LINNÉ). Nous ferons

néanmoins remarquer que cette dénomination d'*osier* ne lui est pas spéciale et s'applique à tous les saules dont les jeunes pousses flexibles sont employées par les vanniers.

Parmi les autres espèces de saules que l'on trouve le plus communément et qui servent à maintenir et à fixer les terres sur le bord des rivières et des ruisseaux, nous nous contenterons de nommer les suivantes :

1° *Saule cendré* (*salix cinerea*, LINNÉ) ;

2° *Saule à oreillettes* (*salix aurita*, LINNÉ), particulièrement commun dans les lieux marécageux et tourbeux des forêts ;

3° *Saule viminal* (*salix viminalis*, LINNÉ), connu aussi sous le nom de *saule flexible*, de *saule à longues feuilles* ;

4° *Saule pourpre ou à une étamine* (*salix purpurea*, *salix monandra*, de CANDOLLE) ;

5° *Saule à trois étamines ou à feuilles d'amandier* (*salix triandra* vel *amygdalina*, LINNÉ) ;

6° *Saule fragile* (*salix fragilis*, LINNÉ).

258. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le saule marceau prospère dans tous les climats de l'Europe, sur les montagnes les plus élevées comme dans les vallons et à toutes les expositions ; il est peut-être sous ce rapport l'essence la plus remarquable que nous possédions. Le saule blanc réussit aussi dans toutes les parties de la France, mais seulement dans les plaines et les vallons, et à des élévations moyennes.

**259. TERRAIN.** — Tous les sols, tels quels, conviennent au saule *marceau*; cependant il se plaît de préférence dans un sable gras un peu frais. C'est aussi dans un pareil sol que prospère son congénère, qui d'ailleurs se trouve fréquemment sur le bord des rivières et des ruisseaux, dans les prairies, autour des communes, et en général dans les lieux frais ou humides; cependant les marais, comme les terres trop compactes, sont contraires à l'un et à l'autre.

**260. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — Les saules sont dioïques. Le *marceau* fleurit avant l'apparition des feuilles; le saule blanc fleurit en avril en même temps que les feuilles poussent. Les fruits, semblables à ceux des peupliers, sont des capsules qui contiennent des semences munies d'une aigrette soyeuse; les vents les transportent à des distances considérables. La semence du *marceau* mûrit et se dissémine en mai, et celle du saule blanc à la fin de juin ou au commencement de juillet. Les saules, à peine âgés de quelques années, sont déjà fertiles, et les graines réussissent très-abondamment chaque année.

**261. JEUNES PLANTS.** — Ces arbres sont très-robustes dès leur naissance. Comme le tremble, le *marceau* se répand dans toutes les forêts et y croît au détriment des autres essences, si les exploitations n'y portent remède.

**262. FEUILLAGE.** — Le feuillage des saules est léger et ne donne qu'un faible couvert.

est monoïque. Les fleurs, en châtons globuleux, paraissent à la fin d'avril ou au commencement de mai. La graine, très-petite et munie d'une aigrette soyeuse, mûrit et se dissémine l'automne suivant. Le platane porte fruit très-jeune et presque tous les ans, mais ses graines, surtout quand elles proviennent de pieds ayant moins de 30 ou 40 ans, sont souvent vaines.

270. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants paraissent réclamer un premier abri; ils lèvent et croissent rapidement.

271. FEUILLEAGE. — Les feuilles du platane, semblables quant à la forme à celles de nos grands érables, sont grandes, nombreuses et disposées sur les rameaux de manière à fournir un couvert aussi épais que celui du hêtre.

272. RACINES. — Les racines sont longues, fortes et traçantes.

273. CROISSANCE ET DURÉE. — Sous le rapport de la rapidité de croissance, on a comparé le platane au peuplier noir. Il atteint les plus fortes dimensions et sa durée, d'après ce que l'on sait, paraît s'étendre à près de deux siècles.

274. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois du platane a beaucoup d'analogie avec celui du hêtre qu'il égale comme chauffage et qu'il surpasse comme bois de menuiserie et d'ébénisterie. Il est abondamment et largement maillé, agréablement nuancé et prend un beau poli. M. T. Hartig rapporte que des pièces de platane, ayant été enterrées, ont résisté pendant 14

années à la pourriture, à l'égal du chêne et de l'orme, tandis que des pièces semblables en hêtre, placées dans des conditions identiques, étaient entièrement pourries au bout de 5 ans.

---

---

## CHAPITRE CINQUIÈME.

---

### DES BOIS RÉSINEUX.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Le Sapin.

275. Le *sapin commun* (*abies pectinata*, de CANDOLLE) est connu aussi sous le nom de *sapin argenté*, *blanc*, *à feuilles d'if*, *sapin des Vosges*, *de Normandie*. Il peuple à lui seul des forêts de la plus grande étendue, quoiqu'on le trouve souvent mélangé avec d'autres essences, notamment avec le hêtre et l'épicéa.

276. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Le sapin habite les climats froids et les tempérés ; il se plaît davantage dans ceux-ci, et y acquiert de plus fortes dimensions. Quoiqu'il ne craigne pas les frimats, on ne le voit pas sur d'aussi grandes hauteurs que l'épicéa et le mélèze. En général, les montagnes lui conviennent ; on le rencontre sur les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes, et dans quelques autres parties montagneuses de la France. C'est entre 500 et 1,000 mètres au-dessus du niveau de la mer que sa région semble être fixée, quoiqu'on le

trouve encore à de plus grandes élévations. Dans les Pyrénées, il est confiné dans les régions élevées de 1,500 à 2,000 mètres; dans les Alpes, dans le Jura et dans l'Auvergne, il s'arrête à 1,500 mètres, et dans les Vosges à 1,000 mètres.

Les expositions méridionales lui sont contraires, et sa végétation y est languissante. C'est aux expositions du Nord et de l'Est qu'il réussit le mieux.

**277. TERRAIN.** — Le sapin demande un terrain un peu profond, frais et facile à pénétrer. Du reste il s'accommode assez volontiers de toute espèce de sol, sauf les terrains marécageux ou aquatiques dans lesquels il ne peut vivre, et les sables trop légers, où son accroissement est très-faible. Souvent on le voit en très-bon état de croissance dans des terrains entièrement couverts de roches. Ses racines, dans ce cas, s'introduisent dans les fissures et les intervalles que présentent ces roches, et profitent de la fraîcheur et du terreau qui s'y amasse abondamment.

**278. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque. Les fleurs paraissent fin d'avril et en mai, et sont placées vers la cime de l'arbre. Le fruit est un cône ou strobile dont la maturité a lieu au commencement d'octobre de l'année même de la floraison. Les semences sont munies d'une aile latérale et se disséminent immédiatement après la maturité. Cette dissémination a cela de particulier que, les cônes étant redressés, les écailles se désarticulent et tombent avec les graines, tandis que les strobiles



des autres bois résineux indigènes ne font que s'entr'ouvrir pour laisser échapper la semence.

Le sapin devient complètement fertile vers l'âge de 60 à 70 ans, selon les climats, et sa semence réussit communément tous les deux ou trois ans.

**279. JEUNES PLANTS.** — Le sapin est très-délicat dans sa première jeunesse, plus même que le hêtre. Il demande un abri prolongé, surtout contre les chaleurs auxquelles il ne peut résister.

**280. FEUILLAGE.** — Les feuilles du sapin sont courtes et étroites, mais épaisses et extrêmement nombreuses, ce qui fait qu'elles donnent dans leur ensemble un couvert très-complet; elles persistent ordinairement pendant trois ans sur l'arbre.

**281. — RACINES.** Le sapin est un des bois résineux les plus fortement enracinés; ses racines latérales, ainsi que son pivot, s'enfoncent jusqu'à 1 mètre et plus, lorsque le sol le permet; mais, comme nous venons de le dire, elles s'accommodent aussi d'un terrain rocailleux et s'y fixent fortement.

Il arrive fréquemment que les racines d'arbres voisins s'entrelacent et s'anastomosent de telle façon que leur végétation devient solidaire. Ce phénomène en produit un autre, celui de la continuité de croissance de souches dont les troncs sont coupés depuis longues années. On voit alors ces souches former des couches annuelles de bois aussi longtemps que l'arbre auquel elles sont mariées reste sur pied.

**282. CROISSANCE ET DURÉE.** — Cet arbre croît d'a-

bord très-lentement, mais quand il a acquis un peu de force, il s'élance avec rapidité et parvient souvent à une hauteur de 40 à 45 mètres. On a coupé des sapins qui avaient atteint l'âge de 300 ans sans dépérir, et qui présentaient jusqu'à 6 et 9 mètres de tour à la base.

283. QUALITÉS ET USAGES. — Le sapin n'est pas employé à la mâture, du moins dans la marine impériale (1). Son bois n'a pas, comme les différentes espèces de pin, des canaux résinifères au moyen desquels le tronc se trouve pénétré, dans toutes ses parties, d'une résine concrète qui lui donne la flexibilité et la durée nécessaires; mais il sert, du reste, dans la construction des vaisseaux, à tous les ouvrages de menuiserie qui garnissent l'intérieur du navire.

Dans les constructions civiles, cet arbre est très-apprécié comme charpente et, placé en travers, il résiste mieux et se tourmente moins que le chêne. Il est à observer que, pour cet usage ainsi que pour la mâture, contrairement à ce qui a lieu pour le chêne [76 bis], le bois de sapin (comme celui de tous les

---

(1) La marine du commerce se sert fréquemment, pour mâture, de sapins provenant du Jura et des Alpes et, en 1846, une commission, composée d'ingénieurs et de forestiers, a constaté, par des expériences exécutées sous ses yeux, que les sapins tirés des forêts du département de l'Aude (Montagne noire) avaient plus de force, de résistance et de ténacité que les pins du Nord et du Canada, le mélèze, l'épicéa et le sapin de Trieste. Il serait à désirer que la pratique pût confirmer un aussi précieux résultat.

résineux en général) est d'autant meilleur que ses couches annuelles sont plus étroites, son grain plus fin et plus serré.

On débite les sapins surtout en planches, dont on fait un commerce considérable. Ceux des Vosges et du Jura se transportent, les premiers à Paris et dans l'intérieur de la France, les autres dans le Midi et jusqu'à la Méditerranée.

Le sapin sert aux menuisiers et aux ébénistes ; ceux-ci en font principalement la carcasse des meubles en marqueterie et en placage. Il est façonné en douves pour la tonnellerie, en cerches pour la boissellerie, et en planchettes minces ou bardeaux pour la couverture des maisons. Différentes pièces de charonnage se confectionnent aussi en sapin.

A l'exception de l'écorce qui fournit un excellent combustible, son chauffage est d'une qualité médiocre et, sous ce rapport, il est au hêtre comme 11 est à 15. Son charbon, quoique inférieur aussi à celui du hêtre, est cependant employé avec avantage à forger le fer.

Le sapin fournit une résine très-liquide, dont on fabrique la térébenthine dite de Strasbourg. Elle se trouve dans les cônes verts ainsi que dans la semence, mais plus particulièrement sous l'écorce vive des jeunes sujets, où elle existe dans de petites tumeurs ou vésicules. On la recueille avec des cornets en fer-blanc qui, au bord de la partie évasée, sont munis d'un petit bec terminé en pointe aiguë. La

pointe sert à crever la tumeur, et la goutte de résine qui en sort coule jusqu'au fond du cornet. On obtient de cette térébenthine, par distillation, une huile essentielle employée dans la médecine et dans les arts, et surtout dans la composition des vernis.

Le résidu de la térébenthine distillée donne la colophane.

Le résinage du sapin ne cause aucun préjudice à l'arbre, mais il est peu productif.

Dans quelques parties des Vosges, les habitants se servent, pour leur éclairage, de la résine qu'ils expriment des semences du sapin.

Le sapin fournit encore le produit appelé *salin*. On peut sans doute le retirer de tous les autres bois, puisqu'il n'est dû qu'aux cendres lessivées des végétaux, mais il en coûte moins pour l'obtenir du sapin, un des bois qui en fournit le plus. Ordinairement on emploie à cet effet la sciure qui se trouve abondamment dans les scieries où le sapin se débite en planches. Dans les Vosges, on a l'habitude de joindre à cette sciure, en la brûlant, de l'urine de bestiaux; il en résulte, à la vérité, une plus grande quantité de salin, mais il est d'une moindre qualité.

La calcination du salin produit la potasse du commerce, employée à de nombreux usages dans les arts.

## ARTICLE II.

## L'Épicéa.

284. *L'épicéa commun* (*picea excelsa*, LINK, *abies picea*, MILLER; *abies excelsa*, DE CANDOLLE) est aussi connu sous les noms de *sapin épicéa*, *pesse*, *fic*, *sapin gentil*, *sapin rouge*, *fiwe*; il forme, tantôt seul, tantôt avec le sapin et le hêtre, des forêts considérables.

285. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — L'épicéa supporte les frimats mieux que le sapin, et réussit à de plus grandes hauteurs de montagne. On le rencontre ordinairement à 800, 1,000, 1,500 et 1,800 mètres d'élévation au-dessus du niveau de la mer et, dans les Alpes, il se trouve même à 2,000 mètres et plus.

Quoiqu'il préfère les expositions du Nord et de l'Est, les expositions plus chaudes lui sont cependant moins contraires qu'au sapin.

286. TERRAIN. — Le sol propre au sapin est aussi celui qui convient à l'épicéa; mais comme il est principalement nourri par les racines latérales, il se contente de peu de fond; il vient mieux que le sapin dans les sols un peu humides, et s'accommode même des terrains tourbeux.

287. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque; les fleurs paraissent en mai. Les cônes qui leur succèdent sont mûrs à la fin de l'automne qui suit la floraison, mais la graine, sauf dans

les années très-chaudes, ne se dissémine qu'au printemps suivant. Les premières chaleurs de cette saison agissant sur les cônes, les écailles s'entr'ouvrent sans se détacher de leur axe et laissent échapper la semence qui, plus petite que celle du sapin, est aussi garnie d'une aile.

Dans quelques localités plus chaudes que celles que l'épicéa habite ordinairement, dans certaines parties des Alpes françaises par exemple, il paraît que la dissémination a généralement lieu au mois d'octobre.

Vers l'âge de 50 à 60 ans, l'épicéa devient complètement fertile; il porte semence à peu près tous les deux ans.

288. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants de l'épicéa sont plus robustes que ceux du sapin. Il est possible de les élever sans abri aux expositions du Nord et du Nord-Est, mais ils ne résisteraient pas de même dans les pentes méridionales, à moins que la situation ne fût très-élevée [40].

289. FEUILLAGE. — Les feuilles de l'épicéa sont plus courtes et plus étroites que celles du sapin et, comme celles-ci, extrêmement serrées sur les rameaux où elles persistent de 3 à 5 et même, dit-on, jusqu'à 7 ans. Aussi le couvert fourni par cet arbre est-il très-épais.

290. RACINES. — L'épicéa n'a que très-peu de pivot et souvent même il en est entièrement dépourvu. Ses racines latérales sont plus déliées que celles du

sapin ; elles tracent entièrement à la surface du sol et semblent, comme ces dernières, avoir une disposition particulière à s'introduire et à s'attacher dans les fissures des rochers.

291. CROISSANCE ET DURÉE. — L'épicéa a une végétation lente dans les premières années ; mais il ne tarde pas à s'élancer, et dès lors il devance le sapin par les progrès de son accroissement. Il vit autant que cet arbre et acquiert les mêmes dimensions.

292. QUALITÉS ET USAGES. — L'emploi de l'épicéa est généralement le même, et au même degré d'utilité, que celui du sapin, tant pour les constructions que pour le travail. Il sert en outre aux luthiers pour les tables de différents instruments de musique.

Son chauffage et son charbon sont un peu meilleurs que ceux du sapin. Dans les pays du nord, l'écorce s'emploie au tannage.

On obtient aussi de l'épicéa la poix jaune ou poix de Bourgogne ; la résine qui la fournit circule principalement entre l'écorce et le bois. On fait au printemps des incisions à l'écorce jusqu'aux premières couches ligneuses, ce qui procure l'écoulement du suc résineux pendant l'été et, lorsque ce suc est coagulé, on l'enlève avec des racloirs ou lames de fer recourbées et l'on rafraîchit ainsi la plaie. Ces incisions ne peuvent être que très-préjudiciables aux épicéas. Dans tous les cas, elles ralentissent la végétation de l'arbre, diminuent la qualité de son bois et, quand elles sont faites sans règles et sans précautions, elles occasionnent son dépérissement.

La résine obtenue, on la met, pour la faire fondre et l'épurer, dans de grandes chaudières sur un feu de flamme. Une fois liquéfiée, on la verse dans un sac de toile, puis on l'exprime au moyen de la presse; elle est ensuite reçue dans des boîtes ou barils pour être livrée au commerce. On peut aussi, par la distillation, obtenir la térébenthine de cette résine.

Les résidus qui sortent de la presse, ou qu'on trouve au fond des chaudières, sont conservés pour faire du noir de fumée.

## ARTICLE III.

## Le Pin Sylvestre.

293. Le *pin sylvestre* (*pinus sylvestris*, LINNÉ) est connu sous une foule de dénominations diverses : *pin sauvage*, *pin du Nord*, *de Riga*, *de Haguenau*, *de Genève*, *Pinasse*, etc. Le *pin rouge* ou *pin d'Ecosse* n'en est qu'une variété, reconnaissable à ses feuilles plus courtes, à ses cônes plus petits et réunis en verticilles et à ses jeunes pousses rougeâtres. Le pin sylvestre forme l'essence dominante dans un grand nombre de forêts très-considérables, où il se trouve fréquemment mélangé avec le chêne et le bouleau.

294. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Les climats tempérés sont ceux où le pin sylvestre a la végétation la plus active. Les pays froids ne lui sont cependant



pas contraires, car, dans le Nord de l'Europe, en Russie surtout et en Suède, il acquiert les qualités et les dimensions les plus précieuses et couvre, à lui seul, de vastes étendues de pays. Il habite la plaine aussi volontiers que les sols en pente, mais les grandes élévations ne lui conviennent pas. Dans ces dernières localités, la neige et le givre s'attachent en grandes masses à ses feuilles, plus qu'à celles des autres résineux des climats froids, et font ainsi rompre ses branches et souvent même sa cime entière.

Le pin sylvestre réussit à toutes les expositions, et même en plein Midi. Lorsqu'il s'agit de repeupler des vides ou des parties de forêts dégradées, exposées au Midi, il est d'une grande ressource non-seulement parce qu'il se contente d'un sol maigre et sec, mais encore parce que les jeunes plants de cette essence supportent mieux que ceux des autres bois résineux les ardeurs du soleil. Nous ne parlons ici que des parties tempérées de la France; les départements du midi ont des pins qui leur sont propres, tels que le pin maritime et le pin d'Alep; et il est probable que le sylvestre y viendrait mal, à moins qu'on ne l'y placât à des élévations où le climat serait moins brûlant (1).

295. TERRAIN. — Le pin sylvestre demande un sol profond et léger; il vient même dans des sables

---

(1) Dans les Pyrénées, on le trouve à une altitude de 1,200 mètres.

entièrement dépourvus de liaison, et son bois y est de meilleure qualité que dans les terrains plus substantiels. Les terrains compacts lui sont entièrement contraires et quoiqu'il réussisse dans les calcaires, sa croissance y est cependant beaucoup moins belle que dans les terres siliceuses.

On le trouve quelquefois dans les parties humides et tourbeuses, mais sa végétation y est languissante ; il s'y présente ordinairement sous un aspect si particulier qu'il a été pris pour une espèce différente.

296. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque ; les fleurs paraissent en avril ou en mai, suivant la température.

Le strobile reste très-petit la première année ; au printemps suivant il commence à grossir, et parvient à son entier développement vers la fin de l'été. Il est mûr au commencement de novembre ; mais il n'entr'ouvre ses écailles pour laisser échapper la graine qu'au printemps suivant. Il lui faut donc au moins dix-huit mois pour mûrir, et environ deux ans pour la dissémination de la graine ; toutefois, ce qui a été dit de la dissémination de l'épicéa dans les Alpes françaises [287] s'applique aussi au pin sylvestre croissant dans les mêmes localités.

Le pin sylvestre devient complètement fertile vers la 40<sup>e</sup> année. Les fruits réussissent à peu près tous les deux ou trois ans ; les semences sont ailées et petites comme celles de l'épicéa.

**297. JEUNES PLANTS.** — Les pins sylvestres sont très-robustes dès leur naissance, et ne prospèrent pas sous un couvert prolongé. On peut en général les élever sans abri; cependant, sur un terrain très-sec et à une exposition entièrement méridionale, il serait utile qu'ils fussent ombragés la première année.

**298. FEUILLAGE.** — Les feuilles du pin sylvestre sont plus longues que celles des deux essences précédentes; mais, comme elles persistent rarement sur les rameaux plus de trois ans, il en résulte que l'arbre ne donne qu'un couvert assez léger.

**299. RACINES.** — Les racines sont fortes et disposées à s'enfoncer. Lorsque le sol le permet, le pivot pénètre jusqu'à un mètre et plus, quoiqu'une profondeur moindre puisse suffire pour assurer à l'arbre une assez belle végétation. Dans les terrains humides, pauvres, ou dans ceux qui manquent de fond, le pivot disparaît à peu près totalement et les racines latérales prennent une direction entièrement semblable à celle de l'épicéa; mais la croissance de l'arbre s'en ressent défavorablement.

**300. CROISSANCE ET DURÉE.** — La végétation du pin sylvestre est très-rapide dès les premières années; lorsque le sol lui convient il s'allonge, dans sa jeunesse, quelquefois d'un mètre et au delà par an. Il vit jusqu'à deux siècles et atteint jusqu'à 33 mètres et plus de hauteur, sur un diamètre de 1 mètre à 1 mètre 20 centimètres à la base.

**301. QUALITÉS ET USAGES.** — Le pin sylvestre est

employé, comme bois de construction et de travail, aux mêmes usages que le sapin et l'épicéa. Son bois, quand il a atteint toute sa maturité, est même considéré comme aussi solide et aussi durable que celui du chêne. Dans la marine, il sert à la charpente et aux planchers mêmes des ponts et c'est presque le seul arbre dont on fabrique les mâts. La France, à cet égard, est tributaire du nord de l'Europe, ce qui doit nous faire attacher beaucoup d'importance à cultiver le pin sylvestre dans des conditions qui puissent favoriser une aussi précieuse production.

Or, ce n'est que dans les régions élevées de nos principales chaînes de montagnes, où les accroissements sont lents et la texture ligneuse très-serrée, que nous pouvons espérer de voir acquérir au bois du pin sylvestre le degré de souplesse et d'élasticité réclamé pour la maturé. On devra donc rechercher avec soin, dans ces régions, les parties les plus abritées, où cette essence aura le moins à souffrir des neiges et des frimats, pour y élever des massifs destinés à satisfaire à ce besoin de haute utilité publique (1).

Le chauffage qu'il fournit est bien supérieur à celui du sapin et de l'épicéa; il en est de même de son charbon qui est recherché pour les forges.

---

(1) Voir sur ce sujet le mémoire de MM. Bravais et Martins, inséré dans le deuxième volume des *Annales forestières*, année 1843, pages 369 et 361).

Le pin sylvestre produit une partie du goudron dont la marine fait usage. Ce sont les souches et les racines qui en rendent le plus ; on l'en retire communément en les soumettant, dans des fourneaux, à une distillation lente et graduée. Le bois ainsi privé de résine, se réduit en un charbon que l'on emploie à divers usages. Il se fait, dans beaucoup de pays, des adjudications très-productives de souches de pin sylvestre, avec faculté d'établir des fours à goudron.

Dans certaines localités, les maraudeurs ont l'habitude d'entailler fortement le tronc des pins sylvestres, pour en enlever quelques morceaux plus particulièrement chargés de résine qu'ils reconnaissent à une couleur jaune foncé, au poids, et à l'odeur forte qui s'en exhale. Ces morceaux, coupés en petits fragments, sont très-inflammables et se vendent pour remplacer les allumettes et pour activer le feu. Il n'est pas nécessaire de dire que ce délit est des plus préjudiciables.

#### ARTICLE IV.

##### Le Pin à crochets.

302. Le *pin à crochets* (*pinus uncinata* DE CANDOLLE, p. *mugho*, POIRET) appelé aussi *pin suffin*, *pinerin*, *suffis* (1), habite les régions élevées des Alpes,

---

(1) Nous n'avons pas eu occasion d'observer par nous-même le pin à

des Pyrénées et du Jura où il peuple, tantôt seul, tantôt en mélange avec le pin sylvestre et le mélèze, des forêts assez considérables. On le trouve aussi, mais par bouquets seulement, sur quelques hauts plateaux des Vosges. Outre les qualités de son bois, cette propriété de végéter en bon état dans des régions où la plupart de nos essences résineuses ne sauraient prospérer, le rend précieux pour le forestier, dont un des principaux soins doit être d'assurer le boisement des hautes sommités de nos chaînes de montagnes (1).

303. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Cet arbre, ainsi qu'on vient de le dire, appartient surtout aux climats secs et froids ; dans les Alpes, il apparaît à 1,500 mètres, monte jusqu'à 2,200 mètres et se main-

---

crochets. Les renseignements qui nous ont mis à même de le décrire sont dus, en très-grande partie, à MM. Du Guiny et Broilliard, qui ont administré, pendant plusieurs années, les cantonnements de Guillestre et de Briançon.

(1) Le *pin chétif* ou *mugho* (*pinus pumilio* ou *mughus*) qu'avec plusieurs botanistes, nous avons considéré pendant longtemps comme une variété du pin sylvestre, produite par l'influence simultanée d'un climat rigoureux et d'un sol tourbeux, est aujourd'hui généralement reconnu comme étant une modification du pin à crochets. Il est particulier aux tourbières et aux marais des hautes montagnes sur lesquels sa tige et ses branches rampent souvent à une longueur de plus de 10 mètres en s'entrelaçant et se coudant de manière à former des lacis impénétrables de 1 mètre 50 à 2 mètres de hauteur. Quoique impropre, par sa forme et ses dimensions, à tout autre usage que le chauffage, cette variété mérite d'être appréciée, puisqu'elle permet de maintenir boisés, des lieux où toute autre végétation ligneuse serait impossible.

tient même à 2,500 mètres d'altitude. Ses branches moins nombreuses et moins fortes, ses feuilles plus raides et plus serrées que celles du pin sylvestre, semblent être la cause pour laquelle il est moins exposé que ce dernier à souffrir de la neige et des frimats (1).

Les expositions du Sud sont celles où il prospère le mieux. Dans les arrondissements de Briançon et d'Embrun, où le pin à crochets est surtout répandu, il forme l'essence dominante de presque tous les versants méridionaux.

304. TERRAIN. — Le pin à crochets s'accommode de toute espèce de terrain quelles que soient sa nature et sa profondeur; on le trouve même sur des rochers. Toutefois, les sols légers et frais sont ceux qui lui conviennent le mieux, mais il s'y carie facilement lorsqu'ils sont très-substantiels.

305. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque; les fleurs paraissent en juin et juillet.

Les cônes grossissent et mûrissent dans le même espace de temps que ceux du pin sylvestre, et la semence, semblable à celle de ce dernier arbre, se dissemine à la même époque. L'arbre devient fertile à un âge peu avancé et ses fruits sont abondants.

306. JEUNES PLANTS. — Les jeunes plants du pin

---

(1) Cela peut tenir aussi à ce que la neige est ordinairement fine et pulvérulente dans les régions élevées qu'habite le pin à crochets.

(Note de M. Parade.)

à crochets sont plus robustes que ceux du pin sylvestre, en ce sens que s'ils croissent, aussi bien que ces derniers, sans abri, ils supportent, beaucoup mieux qu'eux, un couvert prolongé et résistent aux froids les plus rigoureux.

307. FEUILLAGE. — Les feuilles sont raides et serrées sur les rameaux; elles donnent un couvert épais.

308. RACINES. — Les racines sont surtout traçantes; on n'y remarque pas de pivot proprement dit. Elles pénètrent facilement et très-avant dans les fentes des rochers.

309. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du pin à crochets est très-lente, égale et se prolonge jusqu'à un âge fort avancé. Vers 160 à 200 ans, il atteint une circonférence au pied de 1 mètre à 1 mètre 40 sur 18 à 25 mètres de hauteur. Dans le cantonnement de Guillestre (arrondissement d'Embrun) quelques arbres, crûs dans un sol sec et à l'exposition du Midi, mais dont on ne connaît pas l'âge, ont présenté jusqu'à 3 mètres de circonférence à la base, et 20 mètres de hauteur.

310. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois est estimé pour la charpente et, à l'exception du mélèze, on le préfère, dans les Alpes, aux autres essences résineuses; son grain est fin, il se fend et se travaille facilement et sert à la fabrication de toutes sortes d'ustensiles de ménage. Comme chauffage, il est aussi très-apprécié.



La finesse et l'égalité de ses accroissements annuels [283], la rareté relative de ses branches peu développées, enfin la beauté de son port, ont fait penser que le pin à crochets pourrait devenir une ressource précieuse pour notre mûture, si, dans ce but, on lui laissait atteindre un âge suffisamment avancé.

Quelques échantillons fraîchement coupés de ce bois, envoyés à l'École forestière en 1856, ont présenté cette particularité que, gorgés abondamment de térébenthine à leur arrivée, cette substance n'a pas tardé à s'évaporer pour ne laisser, dans le bois desséché, qu'une faible quantité de résine. Cette expérience peut faire craindre que, comme le sapin et l'épicéa, le pin à crochets n'ait pas, dans ses tissus, suffisamment de résine concrète pour donner à son bois l'élasticité et la durée exigées pour la mûture. Cependant, il serait prématuré, à notre avis, de se prononcer à cet égard. D'une part, en effet, les échantillons dont il s'agit n'avaient guère plus de 100 ans, ce qui est un âge peu avancé pour une essence qui, croissant aussi lentement, atteint cependant de très-fortes dimensions [309] et peut vivre, par conséquent, deux et trois siècles. D'un autre côté, les échantillons ne provenaient-ils pas d'arbres crûs dans un sol frais et substantiel, tandis que ce sont certainement les terrains secs et exposés au Midi, qui produisent le bois le plus fortement incrusté de résine concrète ?

Il est donc nécessaire de continuer, sur les lieux, l'étude de cette importante question. On ne saurait

trop la recommander à l'attention des forestiers en position de s'y livrer.

## ARTICLE V.

## Le Pin maritime.

311. Le *pin maritime*, *pin de Bordeaux* (*pinus pinaster*, SOLAND; *pinus maritima*, LAMARCK) couvre des parties de forêts considérables dans les Landes, en Provence, dans le Languedoc et en Corse.

312. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Quoique cet arbre appartienne plus particulièrement aux climats chauds, on le cultive cependant avec succès dans les départements de l'Ouest; mais il y est exposé aux gelées, ne fournit pas des bois de valeur et n'atteint pas un âge avancé. Son élévation et sa grosseur y sont médiocres et son utilité restreinte. Il en est de même des semis faits dans la forêt de Fontainebleau et dans les environs de Paris. On ne peut douter que, transporté plus au Nord, il soit impossible au pin maritime de s'acclimater, étant très-sensible au froid.

Lorsqu'il jouit d'une température convenable, il prospère en plaine, sur les collines et même sur des montagnes de hauteur moyenne (1). Il est d'autant plus utile sur les bords de la mer que ses racines pivotantes et latérales lui donnent une assiette solide

---

(1) En Corse, on le trouve encore à une altitude de 1,000 mètres.

et le mettent en état de résister aux efforts des vents.

**313. TERRAIN.** — Le pin maritime se contente d'un sol médiocre, pourvu que ce sol soit profond ; il réussit même très-bien dans les sables purement quartzeux, ce qu'on reconnaît dans ceux rejetés par les eaux et amoncelés sur le littoral de l'Océan. Les terrains compactes et marécageux lui sont contraires.

**314. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque. Les fleurs paraissent en mars et en avril dans le midi de la France, et au mois de mai dans les régions plus tempérées.

La semence est plus grosse que celle du pin sylvestre et munie d'une aile proportionnée à son volume ; elle mûrit au bout du même laps de temps que celle-ci, et se dissémine à la même époque.

La fertilité de cet arbre est extraordinaire. Il porte fruit presque tous les ans et dès l'âge de 12 ou 15 ans, quelquefois plus jeune. Néanmoins, pour être sûr de la bonté des graines, il convient de ne les cueillir que sur des arbres plus âgés.

**315. JEUNES PLANTS.** — Le pin maritime est très-robuste dès sa naissance, et tout abri un peu prolongé lui est nuisible. Il n'y a que dans les sables brûlants des dunes de Gascogne et dans les expositions chaudes du midi de la France qu'il est nécessaire de l'ombrager les premières années.

**316. FEUILLAGE.** — Quoique les feuilles du pin maritime soient très-longues, leur ensemble cepen-

dant ne donne qu'un faible couvert ; comme celles du pin sylvestre, elles tombent la troisième année.

317. RACINES. — Cet arbre a une racine pivotante qui s'enfonce très-avant dans le sol ; il a, en outre, des racines traçantes qui, dans toute leur longueur, jettent des pivots profonds. Cette propriété, jointe à sa rapide végétation, le rend très-propre à fixer les sables mobiles des dunes.

318. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du pin maritime est remarquablement prompte, et il acquiert de fortes dimensions. On voit dans une partie des dunes de Gascogne, sur un sol profond et substantiel, plusieurs arbres non résinés qui ont une élévation de 27 à 30 mètres sur 2, 3 et 4 mètres de tour à 1 mètre du sol. Cette grosseur se soutient bien et donne aux arbres une forme cylindrique ; leur âge est de 150 à 170 ans, et ils ne montrent aucun signe de dépérissement. Il est donc permis de penser que le pin maritime peut atteindre au moins l'âge de 200 ans dans les terrains qui lui conviennent.

319. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois du pin maritime est jugé inférieur en qualité à celui du pin sylvestre et des autres essences résineuses dont nous avons parlé. On ne s'en sert pas moins pour différentes constructions civiles. On en fait des pilotis et des étais dans les chantiers de la marine, pour soutenir les vaisseaux en construction, et on le débite en planches et en échalas.

Le chauffage et le charbon de ce pin sont aussi de faible qualité.

On pourrait se tromper cependant en prononçant définitivement sur la valeur du bois du pin maritime. Pour qu'un pareil jugement pût être porté, il faudrait que, dans le sol et dans le climat qui lui conviennent, il eût été traité d'après le meilleur régime d'exploitation, et qu'on l'eût garanti de l'élagage et de l'extraction de la résine. Or, dans les départements des Landes et de la Gironde, cette extraction, que l'on exprime par les mots *gemmage*, *gemmer*, se pratique dans les dunes depuis plusieurs siècles (1); et, dans les vastes terrains appelés landes, où le sol est généralement ingrat et où le gemmage a pris peu d'extension, on exploite le pin maritime très-jeune, soit pour en tirer quelques pièces de charpente, soit pour échafasser les vignes : il en est de même dans les départements situés plus au midi. On voit donc que dans l'un et l'autre cas, on ne saurait apprécier avec certitude les qualités de cet arbre.

Les procédés employés pour tirer de cet arbre le suc résineux donnent la mesure du préjudice qu'on lui occasionne. C'est à 25 ans ordinairement que l'on commence le gemmage, depuis le mois d'avril ou de mai, jusqu'au mois de septembre. La première opération consiste à enlever une bande d'écorce de 12 à

---

(1) Une charte du 10 octobre 1468, octroyée par Gaston de Foix capitaine de Buch, reconnaît aux habitants de la Teste la faculté de faire gemme et résine dans ses pignadas de la Teste, à charge de payer une redevance.  
(Note de M. Parade.)

16 centimètres de large, depuis le pied de l'arbre jusqu'à 33 et 50 centimètres de haut, et à entailler assez profondément pour entamer l'aubier ; car le suc résineux s'écoule principalement du corps ligneux et d'entre l'écorce et le bois. Chaque semaine le résinier rafraîchit la plaie. Ces entailles se prolongent les années suivantes jusqu'à une hauteur de 4 à 5 mètres. On commence ensuite, au pied du même arbre, une nouvelle entaille parallèle à la première qui n'en est séparée que par 5 et 6 centimètres d'écorce ; on la conduit à la même hauteur, et ainsi des entailles suivantes, jusqu'à ce qu'elles fassent le tour de l'arbre. Ces entailles sont appelées *quarres*.

Le mode de gemmage que nous venons de rapporter est le plus modéré ; on le nomme *gemmage à vie*. Quand on veut aller plus vite, on fait deux entailles à la fois, l'une dans le haut, l'autre dans le bas ; la première dite *quarre haute*, la seconde *basson*, et souvent on taille simultanément sur toutes les faces de l'arbre. C'est ce qu'on appelle *gemmer à mort* ou *à pin perdu*. Jusqu'à présent le pin maritime est principalement cultivé pour son suc résineux qui fournit des produits d'une importance incontestable, consistant en térébenthine, brai, goudron et noir de fumée. Sous le rapport du revenu, il est hors de doute que ce mode d'exploitation est le plus profitable, et, par conséquent, il se justifie parfaitement. Mais, dans les départements de la Gironde et des Landes, on va plus loin, et l'on prétend que le pin

maritime, pour être d'un bon usage doit être résiné. On va jusqu'à affirmer, malgré les exemples contraires [318], que l'extraction de la résine est indispensable à cet arbre pour assurer sa prospérité et même son existence. La dernière opinion ne nous paraît pas digne d'être discutée ; la première, qui est fondée jusqu'à un certain point, a besoin d'explication.

On conçoit, en effet, que le gemmage doit apporter une certaine perturbation dans la croissance du pin maritime. La nature ne lui a pas donné en vain la résine comme suc propre, et ce suc, indépendant de la sève, paraît s'unir à elle pour procurer la nutrition et l'accroissement du végétal. Ce qui le prouve, c'est que des pins gemmés, et qui étant abattus ont pu être vérifiés, présentaient des couches annuelles très-étroites et annonçaient ainsi un accroissement ralenti, tandis que le contraire a été reconnu sur des arbres non gemmés ayant crû d'ailleurs dans les mêmes circonstances que les premiers. Mais on a vu plus haut [283] que le bois des arbres résineux est d'autant plus ferme et plus résistant que les accroissements annuels sont plus serrés. De plus, le gemmage provoque, du centre à la circonférence de la tige, un courant actif de térébenthine, dont la partie fluide s'écoule en laissant, dans les tissus ligneux qu'elle parcourt, une quantité notable de résine concrète (1). On comprend donc que le ralentissement

---

(1) Mathieu, *Flore forestière*, page 353.

prématuré que le gemmage procure à la croissance du pin maritime, donne, en même temps, à son bois, des qualités que, dans l'état de nature, il n'aurait acquises qu'à un âge plus avancé.

Reste toujours la déformation que cette pratique cause au tronc de l'arbre qui présente des cannelures nombreuses et profondes, devient tortueux la plupart du temps et impropre, par conséquent, à tout usage de quelque importance.

#### ARTICLE VI.

##### Le Pin laricio.

320. Le *pin laricio* (*pinus laricio*, POIRET) est aussi connu sous le nom de *pin de Corse*, de *Calabre*, parce que dans ces deux pays il peuple de grandes forêts.

321. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Ce pin se trouve en Corse, à une altitude de 1,000 à 1,500 mètres, ce qui lui donne un climat très-tempéré; on le rencontre même à 1,600 et 1,700 mètres; mais dans ces hauteurs, sa végétation est lente et l'arbre chétif. On est parvenu à l'acclimater très-bien dans le nord et l'est de la France et, quoiqu'il ne semble pas supporter les grands froids aussi bien que le pin sylvestre, il craint cependant peu nos hivers.

Comme ce dernier pin il réussit à toutes les expositions.

322. TERRAIN. — Les sols qu'il préfère sont les



sables gras, provenant de la décomposition des roches granitiques. Il est probable qu'il ne réussirait pas, comme le pin sylvestre, dans les sables purs.

323. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque. Les fleurs paraissent à la fin de mai et même au commencement de juin sous le climat de Paris.

Ses semences, ailées et légères, sont un peu plus grosses que celles du pin sylvestre; elles demandent le même temps que celles-ci pour la maturité et la dissémination.

324. JEUNES PLANTS. — Le tempérament des jeunes plants est aussi robuste que celui du pin sylvestre.

325. FEUILLAGE. — Les feuilles tiennent, quant à leur longueur, de milieu entre les feuilles du pin sylvestre et celles du pin maritime; le couvert qu'elles fournissent est également fort léger.

326. RACINES. Quoique, dans la première jeunesse, le pin laricio ait un pivot prononcé, ses racines, dès qu'il a atteint un certain développement, sont entièrement traçantes, et peu étendues eu égard aux dimensions de l'arbre.

327. CROISSANCE ET DURÉE. La croissance du laricio est très prompte, plus prompt même que celle du pin sylvestre. Il vit plusieurs siècles et prend les plus fortes dimensions. On en voit en Corse qui ont de 33 à 40 et même 45 mètres de haut, sur 3 et 4 mètres de circonférence à la base.

328. QUATRES ET USAGES. Le laricio est très-

estimé comme bois de charpente ; on l'emploie aussi dans les constructions navales. Dès 1787, on a tiré des forêts de la Corse un grand nombre de mâts des plus fortes dimensions et, de 1812 à 1822, les pins laricios ont approvisionné exclusivement le port militaire de Toulon. Cependant quelques constructeurs ont trouvé que cet arbre avait moins d'élasticité et beaucoup plus d'aubier que les pins de Riga et de Norvège. Il est permis de croire que ces observations ont été faites sur des pièces qui ne réunissaient point (probablement en raison de leur âge) toutes les qualités que l'essence est susceptible d'acquérir. Il résulte, en effet, d'un rapport fait au Ministre de la Marine, par un Ingénieur des constructions navales, envoyé en Corse vers 1845, afin de reconnaître les ressources que les forêts de cette île pourraient offrir à la marine, « que le pin laricio a le grain fin et serré, » des couches annuelles étroites, un tronc parfaitement droit et très-élevé sous branches ; que la résine y est abondante, et enfin, que son aubier a, » dans certaines localités, de 20 à 30 centimètres et » dans d'autres seulement de 8 à 10 centimètres d'épaisseur sur le diamètre. » Ces faits, constatés par un juge aussi compétent, doivent nous faire attacher une haute importance aux forêts de la Corse et nous encourager à multiplier le laricio dans toutes les localités de la France où nous pouvons espérer de le voir réussir.

Le laricio se débite aussi en planches et en ma-

driers ; il est employé à la menuiserie et par divers autres métiers. Quand il n'est pas trop gorgé de résine, son bois est d'un travail facile et peut même servir à la sculpture.

Comme chauffage, il est probable qu'il ne le cède pas au pin sylvestre.

Le laricio est très-résineux et susceptible de fournir les mêmes produits que les autres pins : poix, goudron, etc. Jusqu'à présent, il n'a pas été soumis au résinage ; il serait à désirer qu'il pût en demeurer exempt, c'est-à-dire que le corps de cet arbre précieux ne fût jamais gemmé. Rien n'empêcherait, comme il a été dit à l'article *pin sylvestre*, de mettre à profit la résine qui se trouve dans la souche et les racines.

#### ARTICLE VII.

##### Le Pin noir.

329. Le *pin noir* ou d'*Autriche* (*pinus nigra*, LINNÉ, *pinus austriaca*, *pinus laricio austriaca*, ENDLICHER) est une espèce très-voisine ou, selon plusieurs botanistes, une variété constante du pin laricio. Dans les Alpes styriennes, dans les montagnes de la Dalmatie et de la Croatie, de même que dans une partie de la Hongrie et aux environs de Vienne, il peuple des forêts considérables tantôt seul, tantôt en mélange avec le chêne ou le hêtre, le pin sylvestre ou le mélèze. Depuis une trentaine d'années environ, on a beaucoup propagé cet arbre dans les diverses contrées de

l'Allemagne et, plus récemment, on a commencé aussi à s'en occuper en France. La rapidité de sa croissance, les bonnes qualités de son bois et surtout son extrême rusticité qui le fait végéter en bon état dans les sols calcaires les plus arides, justifient la faveur dont il jouit parmi les sylviculteurs.

330. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Les montagnes dans lesquelles ce pin est indigène ont une altitude de 800 à 1000 mètres ; on le trouve encore à de plus grandes hauteurs, mais alors sa végétation se ralentit sensiblement. Il réussit aussi bien dans les pentes que sur les plateaux et toutes les expositions semblent lui convenir (1).

331. TERRAIN. — Ainsi qu'on vient de le dire, le pin noir préfère surtout les sols légers, secs et calcaires, quelque pauvres qu'ils soient en humus. Cette sobriété le rend propre au reboisement de rochers nus, pourvu qu'ils présentent quelques fissures où ses racines puissent s'insinuer. Il prend pied dans les terrains provenant d'éboulements, lors même qu'ils ont peu de fond, et sa végétation n'y semble pas sensiblement ralentie (2). Les sols argileux lui conviennent médiocrement et, lorsqu'ils sont humides, ils lui sont absolument contraires.

332. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — Sous ce dou-

---

(1) Zoell, conseiller des forêts et des mines en Tyrol, *Manuel de sylviculture des hautes montagnes*.

(2) Zoell, même ouvrage.

ble rapport, le pin noir est entièrement semblable au pin lariçio.

333. JEUNES PLANTS. — Il est très-robuste dès sa naissance et ne craint ni le froid ni la chaleur.

334. FEUILLAGE. — Les feuilles sont très-serrées, d'un vert sombre et persistent pendant 5 et 6 ans. L'arbre ayant des branches nombreuses et touffues, il donne un couvert épais et fournit au sol un détritus abondant.

335. RACINES. — Les racines sont traçantes, robustes et s'étendent au loin ; le pivot est presque nul.

336. CROISSANCE ET DURÉE. — La végétation du pin noir est rapide et se soutient jusqu'à un âge très-avancé. Quand il croît dans les conditions qui lui conviennent, il vit 2 et 3 siècles et atteint un diamètre de 1 mètre et plus à la base, sur 30 et 33 mètres de hauteur (1). Quelques auteurs on dit que sa tige était rarement droite. Cependant Zoetl, dont nous avons déjà cité l'ouvrage, et qui avait longtemps administré des forêts de pin d'Autriche, ne parle pas de cette particularité et considère le pin noir comme un excellent bois de construction. Or, un tel emploi ne saurait se concilier avec un tronc de forme défectueuse.

337. QUALITÉS ET USAGES. — Ainsi qu'on vient de le voir, le pin noir est très-estimé en Autriche comme bois de construction et l'on assure que, pour cet

---

(1) Hoess, *Monographie du pin noir*.

emploi, sa durée égale celle du mélèze. Placé sous eau, il est, pour ainsi dire, incorruptible. Il donne un bon chauffage et son charbon équivaut à peu près à celui du hêtre. Comme il est très-résineux, il est soumis au gemmage, dans les pays qu'il habite. Il est probable que la forme tortueuse du tronc, qu'on lui a reprochée, est le résultat de cette pratique, bien plutôt qu'une disposition particulière à la croissance de l'arbre [319].

## ARTICLE VIII.

## Le Pin d'Alep.

338. Le *pin d'Alep* ou de *Jérusalem* (*pinus halepensis*, MILLER.), qui paraît originaire de la Syrie et de la Barbarie, est assez commun dans les départements méridionaux de la France.

339. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Un climat chaud, ou au moins très-tempéré, lui est nécessaire. C'est avec peine qu'on parvient à l'acclimater dans les environs de Paris ; il souffre des froids de l'hiver, et plus au Nord il ne pourrait y résister.

Cet arbre se plaît dans les plaines et sur les coteaux.

Dans les départements du midi, toutes les expositions semblent lui être favorables.

340. TERRAIN. — Le pin d'Alep se contente d'un sol très-médiocre, pourvu qu'il soit léger et sec ; en général, on remarque qu'il prospère plutôt dans les terrains calcaires que dans les siliceux.

341. FLORAISON ET FRUCTIFICATION. — La floraison est monoïque ; les fleurs paraissent en mai.

La maturité de la graine, qui est ailée et légère comme celle des autres pins, a lieu à la fin du second été qui suit la floraison, et la dissémination ne s'opère que dans le courant du troisième.

342. JEUNES PLANTS. — Même sous le ciel de la Provence, le jeune pin d'Alep résiste parfaitement aux ardeurs du soleil ; mais, par contre, il paraît craindre les gelées dans les trois ou quatre premières années de son existence, lorsqu'il est semé à découvert. Après cet âge il devient plus robuste.

343. FEUILLAGE. — Le pin d'Alep a les feuilles très-fines et longues ; elles ne persistent guère que 2 ans et ne fournissent, par conséquent, qu'un léger couvert.

344. RACINES. — Les racines pivotent assez profondément, lorsque le sol le permet ; mais elles s'accoutument aussi de tracer, et l'on voit parfois des sujets d'assez fortes dimensions, assis sur des rochers entièrement nus dont quelques crevasses seulement permettent aux racines de s'y cramponner.

345. CROISSANCE ET DURÉE. — Cet arbre a une croissance très-rapide dans sa jeunesse. Situé en bon sol, il s'élève beaucoup et est susceptible de prendre de fortes dimensions.

346. QUALITÉS ET USAGES. — Le pin d'Alep sert à la bâtisse, et surtout à la menuiserie ; il a le grain fin et se travaille facilement. On extrait sa résine,

qui est moins abondante que celle du pin maritime, d'après les mêmes procédés que pour cette dernière, et l'on en fabrique les mêmes produits. La résine liquide, qui découle en premier des incisions, est confondue dans le commerce avec la térébenthine de Venise.

## ARTICLE IX.

## Le Pin pinier.

347. Le *pin pinier* ou à *pignons* (*pinus pinea*, LINNÉ), *pin cultivé*, *pin bon*, *pin de pierre*, *pin parasol*, etc., croît naturellement dans le midi de la France, en Italie, en Espagne et sur les côtes de Barbarie.

En France, surtout, il n'est cultivé que comme arbre fruitier.

348. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Quoiqu'il demande, pour prospérer, un climat chaud, il supporte cependant celui de Paris et y porte fruit; mais il est douteux qu'il puisse végéter plus au Nord. Les départements maritimes de l'Ouest sont les seuls, après ceux du Midi, où il serait possible de l'acclimater; il paraît rechercher de préférence les plaines, les vallées, et c'est sur les bords de la mer et le long des rivières qu'il montre la plus belle croissance.

349. TERRAIN. — Il faut à cet arbre un terrain



léger et profond, il se contente même d'un sol sablonneux, pourvu qu'il soit frais.

**350. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison du pin pinier est monoïque ; les fleurs paraissent à la fin de mai ou au commencement de juin. Les strobiles qui leur succèdent sont plus gros que ceux de tous les autres conifères, et n'atteignent leur maturité qu'à la fin de la troisième année après la floraison. A la base de chaque écaille se trouvent deux loges dont chacune renferme une amande de la grosseur d'une petite noisette, enveloppée d'une coquille ligneuse et bordée d'une aile caduque très-petite.

L'arbre ne devient fertile qu'à un âge assez avancé.

**351. JEUNES PLANTS.** — Les exigences du jeune plant sont peu connues parce que, les fruits étant récoltés avec soin avant la dissémination naturelle de la graine, on ne trouve pas de jeunes sujets ayant levé spontanément. Les plants que l'on emploie proviennent de pépinières où ils reçoivent les soins artificiels les plus propres à assurer et à hâter leur développement.

**352. FEUILLAGE.** — Les feuilles sont longues, épaisses et assez larges ; elles donnent un couvert plus complet que celles des autres pins.

**353. RACINES.** — Les racines sont fortes et pivotantes.

**354. CROISSANCE ET DURÉE.** — Ce pin, dit-on, se distingue des autres par une cime en parasol, largement étalée et qui ne lui permet pas de croître à

l'état serré. Nous croyons qu'on se hâte trop de se prononcer à cet égard, attendu qu'il n'a encore été trouvé qu'isolé et que, dans toute la Provence qu'il habite particulièrement, ainsi qu'en Algérie où on le trouve parfois en forêt, il n'existe pas un seul massif de cette essence (1).

Il paraît que le pin pinier peut arriver à un grand âge et atteindre jusqu'à 30 mètres d'élévation. On cite celui qui existe aux Sablettes en Provence ; il a 4 mètres de circonférence, son tronc est nu jusqu'à une hauteur de 10 mètres et, des premières branches au sommet, il a une hauteur au moins égale. La circonférence de sa tête est de 100 mètres.

355. QUALITÉS ET USAGES. — Cet arbre est très-propre à la charpente ; on en fait des planches et des corps de pompe. En Orient, on l'emploie, dit-on, beaucoup à la mâture, ainsi qu'aux bordages des vaisseaux.

Il sert aussi à la menuiserie et à divers autres métiers. Son chauffage est peu apprécié.

Le pin pinier n'est pas très-résineux, ce qui le garantit des saignées.

---

(1) On a attribué pendant longtemps cette même anomalie au cèdre. Or, on sait aujourd'hui que, dans les forêts de cette essence que possède l'Algérie, les cèdres à cimes coniques sont très-communs et s'accommodent parfaitement de croître en massif. Tous les pins, d'ailleurs, sans en excepter le sylvestre, montrent plus ou moins de disposition à former une cime étalée, quand ils atteignent un âge avancé.

Son fruit, connu sous le nom de *pignon*, est une amande douce, agréable à manger et donnant une bonne huile ; le seul inconvénient qu'elle présente, c'est d'être enveloppée d'un noyau dur. On trouve en Italie une variété de pin pinier qui fournit des pignons à noyau tendre ; il serait facile de l'acclimater et de la propager dans le midi de la France.

## ARTICLE X.

## Le Pin Cembro.

356. Le *pin cembro* (*pinus cembra*, LINNÉ), *Auvier*, *Tinier*, forme, en Russie, des forêts très-étendues. En France, de même qu'en Suisse, il est peu répandu et croît généralement en mélange avec l'épicéa, le mélèze et le pin à crochets (1).

357. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — La zone naturelle de cet arbre se réduit en France, ainsi qu'on vient de le dire, aux parties les plus élevées des Alpes du Dauphiné et de la Provence (2000 à 2,500 mètres d'altitude environ). Il paraît que, dans ces localités, il s'accommode de toutes les expositions.

358. TERRAIN. — C'est dans les sols un peu sub-

---

(1) Dans le cantonnement de Briançon, la forêt communale de Vâllars-Saint-Pancrace contient un massif pur de pin cembro, d'une étendue de 200 hectares. C'est peut-être le seul qui existe encore dans les Alpes (M. Broilliard, Sous-Inspecteur).

stantiels, frais, profonds et divisés que le cembro se plaît surtout; mais il s'accommode aussi d'un terrain légèrement humide, et ne redoute pas ceux qui sont pierreux.

**359. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — Les fleurs sont monoïques et paraissent en mai ou au commencement de juin. Les strobiles renferment, sous chaque écaille, deux amandes à noyau dur un peu moins grosses que celles du pinier; elles mûrissent pendant l'automne de l'année qui suit celle de la floraison et se disséminent au printemps suivant.

**360. JEUNES PLANTS.** — Le jeune plant ne paraît craindre ni le froid ni le soleil; mais si, du sommet des hautes montagnes qu'il habite, on veut le transporter dans des régions plus tempérées, il faut choisir les lieux les moins chauds, et ceux surtout qui sont le moins exposés aux gelées printanières, auxquelles les plantes alpines sont très-sensibles.

**361. FEUILLAGE.** — Le feuillage du cembro est assez touffu et donne un couvert épais.

**362. RACINES.** — Cet arbre a, dans sa jeunesse, un pivot prononcé, mais, plus tard, les racines latérales continuent seules à croître; elles sont fortes et tracent au loin.

**363. CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du pin cembro est extrêmement lente et sa longévité peut atteindre 4 et 5 siècles. Dans le Briançonnais on trouve des pieds de cette essence qui mesurent de 3 à 4 mètres de circonférence à la base sur 15 à 20 mètres de hauteur (M. Broilliard).

364. QUALITÉS ET USAGES. — Le bois est impropre aux constructions. Il est d'un travail facile et très-recherché pour la sculpture et la menuiserie ; son chauffage équivaut à peu près à celui du sapin.

Le fruit est une amande douce, bonne à manger et très-nourrissante ; on en exprime une huile assez agréable.

Le pin cembro contient abondamment une térébenthine très-fluide ; toutefois, il n'est pas soumis au résinage.

#### ARTICLE XI.

##### Le Pin du Lord Weymouth.

365. Le *pin du Lord Weymouth* (*pinus strobus*, LINNÉ) a été importé, au commencement du dernier siècle, des Etats-Unis et du Canada en Angleterre, par le Lord dont il porte le nom ; mais il y a cent ans à peine qu'on a commencé à le cultiver sur le continent. Quoique exotique, on l'associe aux bois indigènes de la France, parce qu'il y est parfaitement naturalisé. Il se distingue par la beauté de son port.

366. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — On cultive ce pin avec succès dans toutes les parties de la France, à l'exception du Midi qui paraît ne pas lui convenir ; il préfère généralement les régions un peu froides. En Amérique, il habite surtout la plaine et les pays de coteaux.

367. **TERRAIN.** — Le pin du Lord ne se plaît ni dans les sables arides, ni dans les sols trop compactes ou marécageux. C'est dans un terrain légèrement humide, profond et substantiel qu'il végète le mieux ; il se contente cependant d'un sol moins fertile, pourvu qu'il soit frais, divisé, et qu'il ait du fond. Il prospère surtout le long des cours d'eau.

368. **FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque ; les fleurs paraissent en mai ou au commencement de juin. Les strobiles sont mûrs seize mois après la floraison, et la dissémination de la graine, qui est légère et ailée, a lieu aussitôt, c'est-à-dire, en septembre ou en octobre de l'année qui suit celle de la floraison.

L'arbre porte semence très-jeune.

369. **JEUNES PLANTS.** — Les jeunes plants demandent, au moins aux expositions chaudes, de l'abri pendant les premières années ; on peut assimiler leur tempérament à peu près à celui des plants d'épicéa [288].

370. **FEUILLAGE.** — Le feuillage du pin du Lord est fin, léger, et donne assez peu de couvert. Ses feuilles ne persistent pas plus de deux ans.

371. **RACINES.** — Son pivot est très-prononcé, il est accompagné de racines latérales nombreuses qui s'étendent au loin.

372. **CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du pin du Lord est très-rapide ; les pousses annuelles s'allongent quelquefois, dans sa jeunesse, de 66 cen-

timètres à 1 mètre. Il atteint un âge très-avancé et prend les plus fortes dimensions. En Amérique, on en a trouvé qui avaient jusqu'à 50 et 60 mètres de hauteur, sur 1 mètre 66 centimètres de diamètre à la base.

373. QUALITÉS ET USAGES. — Aux États-Unis, le pin du Lord a un bois ferme ; il est léger, peu noueux et facile à travailler. Les Américains en tirent un grand parti pour la charpente et même pour la construction des vaisseaux. Ils l'emploient aussi à la mâture ; mais, quoique plus léger que le pin sylvestre, il n'est pas à cet effet d'un aussi bon usage.

Pour les constructions civiles, s'il est placé à l'abri des variations de l'atmosphère, ce bois a la durée et la consistance de nos meilleurs pins ; mais il ne faut l'employer ni sous l'eau ni dans la terre, où il est sujet à pourrir.

Il est très-recherché par différents métiers ; sa texture est fine, et il prend un beau poli.

On ne peut affirmer que toutes ces précieuses qualités se retrouvent dans les pins du Lord que nous cultivons en France. Ceux que l'on a pu y exploiter jusqu'à présent étaient évidemment trop jeunes pour servir de sujets d'expérience ; le bois en était mou, léger, peu résineux et peu résistant. Le temps seul pourra nous apprendre ce que nous avons à espérer de cette essence.

Le pin du Lord contient beaucoup de térébenthine qui se volatilise promptement. En France, il est de

meuré jusqu'à présent à l'abri du résinage, mais dans l'Amérique du Nord, il paraît qu'il est soumis à cette pratique.

## ARTICLE XII.

## Le Mélèze.

874. Le *mélèze* (*larix europæa*, DE CANDOLLE), par la beauté de son port, la durée et l'utilité de son bois, tient le premier rang parmi les bois résineux. Il est le seul dont les feuilles soient caduques.

Il peuple des forêts considérables, tantôt seul, tantôt en mélange avec l'épicéa, le pin sylvestre, le pin à crochets et le cembro.

875. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — Cet arbre qui, dans le Nord de l'Europe, occupe tantôt la plaine et tantôt la montagne, ne se trouve en France que dans les Alpes où il apparaît à 1200 mètres d'altitude, s'élève en bon état jusqu'à 2000 mètres et résiste même, mais à l'état de buisson rabougri, jusqu'à une élévation de 2400 mètres. Ce sont les situations où l'état habituel de l'atmosphère est à la fois sec et froid, qui semblent surtout lui convenir; il redoute les climats brumeux et les vents humides.

Sur les montagnes où il est indigène, il prospère particulièrement aux expositions du Nord et de l'Est. A de grandes hauteurs, on le trouve aux aspects du Sud et de l'Ouest, mais il n'y est pas bienvenant (M. du Guiny).



**376. TERRAIN.** — Le mélèze demande une terre divisée, profonde et surtout fraîche. Cette dernière condition, qu'il recherche d'une manière très-marquée, le rend souvent accommodant sur les deux autres. Dans les terrains très-substantiels, il est, comme le pin à crochets [304], exposé à se carier (M. du Guiny). Les sols argileux et compactes ne lui conviennent pas plus que les sables purs et trop légers; les terrains mouillés aussi lui sont contraires.

**377. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — Les fleurs sont monoïques, et paraissent en avril ou en mai, selon la température. Les graines légères et ailées sont mûres à la fin de l'année même de la floraison, et se disséminent au printemps suivant; dans certaines circonstances, néanmoins, cette dissémination s'effectue, comme celle de l'épicéa [287], dès le commencement de l'automne.

Le mélèze porte semence à un âge peu avancé, surtout dans les climats tempérés, où sa trop grande fécondité, toutefois, doit être considérée comme l'indice d'un ralentissement prématuré de croissance.

**278. JEUNES PLANTS.** — Dans les climats où il est indigène, le jeune plant du mélèze est robuste dès sa naissance et susceptible de résister aux froids comme aux ardeurs du soleil; mais, sous un ciel plus doux, on fera bien de l'ombrager pendant les premières années.

**379. FEUILLAGE.** — Les feuilles sont petites, tendres et ne donnent qu'un couvert fort léger; elles

fournissent au sol un détritus beaucoup plus abondant que celui d'aucun autre conifère (expériences de M. T. Hartig).

**380. RACINES.** — Le mélèze pivote à un mètre et plus de profondeur ; ses racines traçantes sont nombreuses, déliées et s'étendent au loin.

**381. CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance du mélèze est très-prompte ; il acquiert une grande hauteur et prend beaucoup de diamètre. On en a trouvé sur les Alpes qui avaient de 33 à 40 mètres de haut sur 5 mètres de tour à la base. Sa durée s'étend à trois et quatre siècles (1).

---

(1) Nous devons à l'obligeance de M. Davall de Joffrey ; conseiller des forêts à Vevey, canton de Vaud (Suisse), la notice suivante sur un mélèze que l'on voyait encore en 1850 dans le voisinage du hameau de Forclar, dans la vallée d'Ormont, sur le bord d'une forêt située dans un versant au Nord en pente rapide, à 1,400 mètres environ au-dessus du niveau de la mer.

Quoiqu'il fût partie d'une forêt particulière, cet arbre avait été placé sous la surveillance spéciale de l'Inspecteur forestier de la contrée et le propriétaire avait consenti à ne pas le faire abattre. Mais la foudre le frappa et le mutila tellement que la hache dut l'achever.

Croissant isolé, le mélèze de Forclar était très-branchu et sa hauteur ne dépassait pas 23 mètres, mais sa souche avait, près du sol, un diamètre de 2 mètres. Son âge était, au plus, 275 ans et sur la souche on comptait distinctement 257 couches de bois parfait et 15 couches seulement d'aubier ; l'écorce avait une épaisseur de 0<sup>m</sup>,13.

Le premier billon, parfaitement sain, d'une longueur de 9<sup>m</sup>,3, avait au gros bout, 1<sup>m</sup>,9 de diam. et 270 couches, et au petit bout 0<sup>m</sup>,95 et 248 couches. Il cubait donc 14 m. c. 394 d. c..

Dans les régions tempérées, sa végétation surpasse en rapidité celle de tous les autres bois résineux ; cependant elle se ralentit déjà considérablement dès l'âge de 60 ou 70 ans, et quelquefois même plus tôt. Souvent, à la vérité, il a à cet âge de 25 à 30 mètres de haut sur 25 à 33 centimètres de diamètre ; mais son bois alors est loin de présenter les qualités qu'on lui reconnaît à un âge plus avancé, dans le pays où il est indigène.

Ces faits qui se sont vérifiés sur différents points de l'Allemagne et notamment dans la Forêt-Noire et dans les montagnes du Harz, sont de nature à faire croire que le mélèze n'est point encore parfaitement acclimaté dans les situations peu élevées.

La culture en grand de cet arbre semble donc, quant à présent, devoir se borner aux très-hautes montagnes ; mais on n'en devra pas moins continuer et multiplier les essais sur nos élévations moyennes. On sait, en effet, que ce n'est souvent qu'après plusieurs générations, qu'un arbre parvient à se faire entièrement au climat où il a été importé, et à y recouvrer, au moins en partie, les propriétés qu'il possède dans son pays natal (1).

---

(1) Dans un grand domaine de l'Angleterre où existaient d'importantes plantations de mélèzes âgés de plus d'un siècle, le propriétaire s'est décidé, il y a peu d'années, à exploiter ces arbres dont les dimensions étaient déjà considérables. Ils avaient été plantés, les uns aux exposi-

**382. QUALITÉS ET USAGES. —** Le mélèze résiste très-longtemps à l'air et se conserve, dans les lieux humides et sous eau, aussi longtemps que le chêne. Des habitations sur les Alpes entièrement construites de ce bois, dont les pièces équarries sont placées les unes sur les autres, ont une durée des plus longues.

---

tions du Nord et de l'Est, les autres sur des versants aux aspects du Sud et de l'Ouest.

Examinés par des Ingénieurs maritimes, les premiers furent trouvés de très-bonne qualité et payés fort cher pour être employés dans la construction des vaisseaux; les autres, au contraire, parurent aux mêmes juges de qualité fort médiocre et tout à fait impropres au service d'élite qu'il s'agissait d'approvisionner.

Cet exemple tend, selon nous, à prouver : 1° que le mélèze, transporté dans d'autres climats, y manifeste les mêmes exigences que dans son pays natal, en ce qui concerne l'exposition; 2° que, quand ces exigences, jointes sans doute à celles concernant le sol, sont satisfaites dans une certaine mesure, son bois conserve, en grande partie, les précieuses qualités qui le distinguent dans les régions élevées.

M. T. Hartig, dans son excellent ouvrage déjà cité, rapporte, de son côté, des expériences plus encourageantes encore pour prouver que les qualités si remarquables du mélèze n'appartiennent pas seulement à cette essence croissant dans les climats froids.

Son illustre père avait fait disposer, pour tuteurs des arbres du jardin de l'École vétérinaire à Berlin, des perches ou piquets de diverses essences. Ces piquets, écorcés, avaient un diamètre de 3 pouces (1 décimètre environ). Ceux en bois de mélèze se maintinrent intacts pendant 14 ans et ne trouvèrent de rivaux en durée que parmi les robiniers, les cembros, les thuyas et les genévriers. Une expérience analogue et simultanée fut faite avec des madriers de 4 pouces qu'on enterra dans le même lieu. Ceux en mélèze, en robinier et en pin sylvestre vieux et très-résineux, furent les seuls qui restèrent sains aussi longtemps que les piquets. Or, les mélèzes employés provenaient des environs de Berlin.

Dans une de ces cabanes, bâtie depuis 240 ans, on a trouvé les bois parfaitement sains (1). Cet arbre est également précieux pour les constructions tant civiles que navales. Si on le voit rarement dans les chantiers de la marine, la cause en est uniquement dans la difficulté de l'extraire des localités où il se trouve et dans les frais considérables de transport. Des ingénieurs de marine le considèrent comme plus résineux, plus fort, et plus léger que le laricio et, par conséquent, plus propre à la mâture. Les bordages faits de ce bois durent plus longtemps que ceux de chêne, ce qui a été reconnu dans les bâtiments employés à la navigation du lac de Genève.

Le mélèze est très-propre à la menuiserie et à d'autres métiers ; il a un grain très-fin et prend un beau poli. On en fait aussi du merrain, et il fournit pour la vigne de très-bons échelas.

Son chauffage et son charbon ne sont pas de première qualité ; cependant, il passe dans le pays natal de l'arbre, pour être préférable à celui des pins et des sapins. Ce bois a l'inconvénient de pétiller, de

---

(1) Il faut observer cependant que cette durée extraordinaire n'est pas uniquement due à la bonté du bois. Il n'est pas douteux que les froids vifs et prolongés des grandes hauteurs doivent retarder la décomposition de toute espèce de bois qui y serait mis en œuvre et que des mélèzes, employés aux constructions sur des élévations peu considérables ou dans des vallées, n'y résisteraient pas aussi longtemps, attendu les variations fréquentes que présente la température de ces localités.

lancer des éclats et de s'allumer beaucoup plus difficilement que les autres bois résineux. C'est sans doute à cette dernière propriété qu'il a dû la réputation d'incombustibilité qu'on lui avait faite chez les Romains (Vitruve).

On tire du mélèze un suc résineux connu sous le nom de térébenthine de Venise. Dans le Valais, on l'obtient en pratiquant dans le tronc, avec une tarière, des trous faiblement inclinés de bas en haut, mais qui ne dépassent pas l'aubier. A l'orifice de ces trous, on place des gouttières faites en bois de mélèze, par le moyen desquelles la térébenthine coule dans des auges disposées à cet effet au pied de l'arbre. Cette récolte a lieu sur les Alpes depuis la fin de mai jusqu'au commencement de septembre ; elle est sans doute d'un grand produit, car on prétend qu'un mélèze peut fournir, pendant 40 ou 50 ans, de 3 à 5 kilogr. de térébenthine chaque année ; mais cette opération rend ordinairement le bois impropre au service.

La térébenthine distillée donne une huile essentielle qui, cependant, n'est pas aussi estimée que celle qu'on obtient de la térébenthine du sapin.

L'écorce du jeune mélèze est très-propre au tannage des cuirs.

## ARTICLE XIII.

## Le Cèdre.

383. Le *cèdre* ou *cèdre du Liban* (*cedrus libani*, BARREL) se trouve en Asie, principalement sur le mont Liban et sur le mont Taurus ; depuis la conquête de l'Algérie, on en a reconnu de vastes forêts dans les montagnes de l'Atlas. Il peut être considéré comme le géant des conifères.

384. CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — L'habitation du cèdre devrait faire présumer que cet arbre ne craint pas les climats froids ou, au moins, qu'il doit très-bien réussir dans les climats tempérés de la France. En effet, sur le mont Liban, dont le sommet est couvert de neiges perpétuelles, on ne le rencontre que dans une région déjà assez élevée, et en Afrique, ce n'est qu'à 1,400 mètres au moins au-dessus du niveau de la mer que se trouvent les forêts de cèdre (1). Cependant, dans le climat de Paris, on est forcé de lui donner beaucoup de soins dans sa jeunesse, et de l'abriter contre les gelées. Ce n'est que dans sa sixième ou huitième année qu'on peut

---

(1) Voyez l'intéressante notice de M. Renou, inspecteur des forêts de l'Algérie, dans le 3<sup>e</sup> vol. des *Annales forestières*, année 1844, p. 1 à 7.

l'abandonner à lui-même ; il résiste alors aux plus grands froids.

Les montagnes paraissent lui convenir mieux que les plaines, et la température que lui offre son pays natal semble exiger qu'on ne le cultive pas dans des parties trop exposées aux ardeurs du soleil.

**385. TERRAIN.** — Les sols graveleux, un peu secs et profonds paraissent convenir au cèdre. Ainsi que les autres conifères dont nous avons parlé, il ne vient ni dans les terres trop compactes, ni dans celles qui sont marécageuses.

**386. FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque ; mais, contrairement à ce qui existe pour les autres essences, elle n'a lieu qu'en septembre et octobre.

Les observations faites sur les cèdres de l'Algérie (1) ont fait connaître que les graines ne mûrissent, dans ces climats, que dans le mois de juillet de la seconde année après la floraison, c'est-à-dire, 20 mois après celle-ci. La dissémination s'opère en général, trois ou quatre mois plus tard, à l'époque des pluies d'automne, et quelquefois même seulement à la fin de l'hiver.

Comme pour le sapin, les écailles du cône du cèdre se désarticulent et tombent avec la graine.

---

(1) Voyez la notice déjà citée.



Le cèdre cultivé commence à donner des fruits vers 50 ans.

387. JEUNES PLANTS. — En Afrique les jeunes plants sont aussi robustes que ceux du pin sylvestre [297]; mais en France, ainsi que nous l'avons déjà dit, ils sont plus délicats et demandent de l'abri contre le froid pendant les six ou huit premières années. Cette circonstance est un obstacle majeur à la culture en grand de cet arbre, mais qui ne doit pas faire renoncer à multiplier les essais dans différentes localités et à différentes hauteurs. Il est probable qu'après plusieurs générations, le cèdre finira par s'acclimater entièrement, ou qu'au moins on reconnaîtra quel est le climat qui lui convient le mieux.

388. FEUILLAGE. — Les feuilles du cèdre sont nombreuses, touffues, et donnent un couvert assez épais.

389. RACINES. — Le cèdre pousse, avec un pivot très-fort, de nombreuses et fortes racines latérales, qui s'étendent beaucoup et le fixent fortement au sol.

390. CROISSANCE ET DURÉE. — La croissance du cèdre est lente dans le principe, mais elle devient très-active après les huit ou dix premières années. Il peut acquérir plus de dix mètres de circonférence sur une hauteur considérable, et son existence se prolonge, dit-on, pendant plusieurs siècles.

391. QUALITÉS ET USAGES. — On attribue au cèdre la force, la durée et l'incorruptibilité. Cependant tous les auteurs qui en ont parlé ne sont pas du même avis; quelques-uns lui accordent peu de qualités.

Quant à son poids, les uns le classent au rang des bois les plus légers, les autres l'assimilent presque au chêne. Il semble impossible, dans les circonstances actuelles, de juger un arbre dont la vie est aussi longue et qui ne peut atteindre sa perfection qu'à un âge avancé. Il faudrait savoir d'où ont été tirés les cèdres sur lesquels on a fait des expériences. Les plus vieux cèdres de l'Europe datent de 1683, et le premier qui a été planté en France, fut apporté par Bernard de Jussieu, en 1734. Ces arbres subsistent encore. Ceux qui en sont provenus, et que l'on a pu abattre, avaient-ils assez d'âge pour faire reconnaître les qualités de ce bois ? Etaient-ils dans le climat et dans le sol convenables à cet arbre ? En Asie, en Afrique, il habite de grandes élévations et, jusqu'à présent, on ne lui a donné place, en Europe, que dans des parcs et des jardins paysagers.

L'éloge que les anciens ont fait du cèdre, les grandes constructions auxquelles il a été employé, et le respect religieux qu'il inspirait dans l'antiquité, pourraient déterminer notre opinion à son égard. Mais l'identité de cet arbre a été mise en question, et l'on a prétendu qu'on donnait anciennement le nom de cèdres à différentes espèces résineuses.

Espérons que nos forêts de l'Algérie pourront bientôt fournir aux travaux publics, ainsi qu'à la marine, les moyens d'expérimenter sûrement cette importante essence, et que la sylviculture sera, par là, mise à même de décider jusqu'à quel point les


**essais d'acclimatation tentés jusqu'ici méritent d'être continués et étendus (1).**

---

(1) D'après quelques expériences faites en Afrique par des officiers du génie concurremment avec des agents forestiers, le cèdre serait plus léger, moins élastique et plus cassant que le sapin ; il offrirait aussi une résistance horizontale moindre que ce dernier arbre qu'il pourrait, toutefois, remplacer dans beaucoup de circonstances, mais non égaler. Comme chauffage et comme charbon, il aurait à peu près la même valeur. Le cèdre paraît plus apprécié pour le travail et l'industrie. Il prend un beau poli, est agréablement nuancé, se façonne facilement et n'est pas sujet à la vermoulure.

---

## LIVRE SECOND.



---

## LIVRE SECOND.

---

### PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'EXPLOITATION DES BOIS.

---

#### DÉFINITIONS.

392. Le nombre d'années déterminé pour l'exploitation d'une forêt se nomme *révolution*.

Or, comme il est de règle de retirer d'une forêt des produits *annuels*, et que la régénération du lieu où le bois a été coupé doit être, autant que possible, une conséquence immédiate de cette coupe (voir l'Introduction), il s'en suit qu'une forêt exploitée ainsi par portions annuelles présente, la plupart du temps, autant de parties de bois différant entre elles d'un an d'âge, qu'il y a d'années dans la révolution.

393. Un bois est *exploitable* quand il a atteint le maximum de son accroissement ou de son utilité.

Il semblerait que l'accroissement doit être le régulateur naturel de l'*exploitabilité*, mais celle-ci est presque toujours modifiée par les besoins de la société et les intérêts des propriétaires.

394. L'*accroissement* d'un arbre est l'augmentation de volume résultant de son grossissement et de son allongement.

L'*accroissement annuel* est le volume dont il s'augmente pendant une année ; l'*accroissement moyen*, au contraire, est la moyenne tirée de tous les accroissements annuels, depuis la naissance du bois jusqu'à la dernière année de l'âge pour lequel il s'agit de déterminer cet accroissement.

395. Les économistes désignent ordinairement par *rente* la portion du produit de la terre qui excède les frais de production, en comprenant, dans ces frais, un certain bénéfice qui représente, la rémunération légitime de l'industrie.

Mais, dans la langue usuelle et même, en certains cas, dans le langage scientifique, on appelle aussi *rente* le rapport du revenu au prix d'achat. C'est cette dernière définition que nous adopterons en disant que *la rente exprime le rapport entre le revenu net d'un bois et le capital qui le produit*.

396. On entend par *possibilité* la quotité de matière qu'on peut retirer annuellement d'une forêt, sous la condition d'en maintenir la production constante autant que possible ; résultat que nous exprimons par le terme de *rapport ou rendement soutenu*.

397. Par *peuplement complet* on exprime l'état d'un bois composé du plus grand nombre de tiges possible, eu égard à leur âge et à leur volume.

398. Toute étendue déterminée dans une forêt pour y abattre le bois, en totalité ou avec réserve d'un certain nombre d'arbres se nomme *coupe*.

399. La désignation du lieu où doit se faire une coupe s'appelle l'*assiette*. Ainsi, *asseoir une coupe*, ou *faire l'assiette d'une coupe* c'est désigner son emplacement.

400. Par *vidange*, on entend le transport des bois hors d'une coupe.

401. Une coupe est *en usance*, lorsqu'on l'exploite; elle est *usée*, quand elle est exploitée et vidée.

402. Les arbres déracinés ou rompus par les vents se nomment *chablis*; on donne le même nom à ceux qui sont brisés sous le poids de la neige ou du givre.

La partie d'un arbre rompu, tombée à terre, s'appelle *valis*; celle qui demeure debout se nomme *quille*, *chandelier* ou *tronc*.

---



Il semble  
gulateur  
presqu  
ciété

## CHAPITRE PREMIER.

### DE L'EXPLOITABILITÉ.

#### ARTICLE PREMIER.

#### De l'Exploitabilité en général.

403. L'exploitabilité d'une forêt est la base de son traitement; elle fixe l'âge auquel les bois doivent être abattus, et nous met à même (ainsi qu'on le verra bientôt) de déterminer la possibilité.

L'exploitabilité varie selon les considérations d'après lesquelles on la détermine. Les objets que l'on considère, ensemble ou séparément, pour cette détermination sont : la longévité des essences, la plus grande production en matière, la rente la plus élevée et les qualités les plus utiles des bois.

Déterminée d'après ces bases, l'exploitabilité peut être *physique, absolue, relative ou composée*.

## ARTICLE II.

## De l'Exploitabilité physique.

404. Pour atteindre l'*exploitabilité physique*, on laisse croître les bois jusqu'à ce qu'ils ne prennent plus qu'un très-faible accroissement et qu'ils aient acquis tout le développement dont ils sont susceptibles, en raison de la nature de l'essence, du sol et du climat. Alors on ne considère les forêts que par rapport à la longévité des essences, sans s'occuper de l'intérêt du propriétaire, ni des besoins de la consommation. C'est assez dire que, dans l'état actuel de la société, cette exploitabilité ne peut trouver son application qu'exceptionnellement : par exemple, lorsqu'il importe de conserver certains bois, soit à cause de leur influence manifeste sur l'état climatique d'un pays, soit comme préservatifs contre les avalanches et les éboulements, ou bien pour des motifs d'agrément.

## ARTICLE III.

## De l'Exploitabilité absolue.

405. Un bois est parvenu à son *exploitabilité absolue*, lorsqu'il a atteint son plus grand accroissement moyen. C'est cette exploitabilité qu'il faut adopter lorsque, considérant la production en matière d'une

manière *absolue*, on ne se propose d'autre but que le *maximum* de cette production.

406. Pour prouver que le bois coupé à l'époque de son exploitabilité absolue fournit, dans un temps donné, les plus grands produits matériels possibles, il suffit de faire voir qu'on en obtiendrait de moindres en devançant ou en dépassant cette époque.

Or, si l'on considère la marche de la végétation d'une forêt ou d'une portion de forêt, soumise à un traitement rationnel, on observe que, dans les premières années, les *accroissements annuels* sont faibles, comparés à ce qu'ils deviennent plus tard ; qu'ils augmentent ensuite jusqu'à un âge plus ou moins avancé, sans toutefois suivre une marche régulièrement progressive ; puis enfin, qu'ils diminuent de plus en plus (1). Parallèlement à cette marche des accroissements annuels, on constate que les *accroissements moyens* correspondants suivent aussi d'abord une progression croissante, puis entrent dans une

---

(1) Ce sont surtout nos arbres forestiers les plus importants et les plus répandus (bois durs) qui, considérés en masse, ont, dans leur première jeunesse un accroissement très-faible comparativement à ce qu'il devient plus tard. Le plus ordinairement cet accroissement va en s'augmentant d'année en année jusqu'à l'âge de 60, 80, 90, 100 ans et même au delà, selon les essences, les sols et les climats, en supposant toutefois que les essences soient appropriées aux sols et aux climats. Parvenu à ce point, l'accroissement demeure sensiblement le même pendant un certain temps, puis il commence à diminuer d'une manière plus marquée, et finit par devenir presque nul.

phase à peu près stationnaire, et enfin tendent à décroître constamment.

Cela posé, admettons deux forêts parfaitement égales sous tous les rapports et soumises au même mode de traitement, l'une dont la révolution soit fixée au terme de son plus grand accroissement moyen, 100 ans, par exemple ; l'autre qui s'exploite à un terme beaucoup plus rapproché, tel que celui de 25 ans. Il est évident que la première, parcourant dans ce délai de 100 ans, toute l'échelle ascendante de la végétation, fournira un produit matériel à la composition duquel auront contribué les années les plus favorables à la production ; tandis que la seconde, coupée quatre fois pendant ce temps, se trouvera rejetée ainsi quatre fois dans l'âge du plus faible accroissement, et ne pourra rendre, par conséquent, que des produits beaucoup moindres.

Supposons, au contraire, que de ces deux forêts l'une continue à être coupée à 100 ans et que la révolution de la seconde soit portée à 200 ; il est non moins évident que cette dernière donnera dans ce délai moins de bois que la première, parce qu'après 100 ans, elle entrera dans une période de décroissance pendant laquelle l'autre parcourra une seconde fois la progression ascendante des accroissements, et atteindra de nouveau les années d'âge moyen les plus favorables à la production.

Donc, dans les deux cas, soit que l'on devance, soit que l'on dépasse l'époque de l'exploitabilité ab-

solue, la production est moindre que si l'on s'en tient à cette époque.

407. De la proposition que nous venons de démontrer, ainsi que de la définition des accroissements [394], on déduit facilement les corollaires suivants :

1° Tant que l'accroissement annuel augmente, l'accroissement moyen augmente évidemment aussi ;

2° Lorsque l'accroissement annuel diminue, l'accroissement moyen continue à augmenter aussi longtemps que l'accroissement annuel, tout en diminuant, reste plus grand que l'accroissement moyen correspondant ;

3° L'accroissement moyen atteint son point culminant lorsqu'il devient égal à l'accroissement annuel correspondant ;

4° L'époque du plus grand accroissement moyen tombe nécessairement dans la phase descendante des accroissements annuels, d'où il suit que l'écart entre le *maximum annuel* et le *maximum moyen* est plus ou moins grand, selon les conditions de la végétation.

408. La détermination rigoureuse de l'exploitabilité absolue d'une forêt, est une question de calcul importante, et qui exige une suite de recherches et d'expériences dont le détail ne saurait trouver place ici. Au surplus, l'observation attentive de la marche de la croissance des bois a fourni à cet égard des indications assez précises pour pouvoir suppléer au calcul dans un grand nombre de cas.

*Les bois sont en bon état de végétation, et leur accroissement augmente progressivement, lorsque les pousses annuelles sont fortes et allongées, le feuillage abondant et d'un vert vif et brillant, l'écorce unie, les jeunes branches souples et relevées vers le tronc, l'extrémité de la cime fortement saillante.*

*L'accroissement a atteint son point culminant et devient stationnaire aussitôt que les pousses annuelles sont plus faibles et moins allongées que celles des années précédentes, et que la flèche de la cime est moins prononcée (1).*

*Le bois entre en retour ou en décroissance, lorsque la cime n'offre plus qu'une tête arrondie, et lorsqu'on voit en automne les feuilles du sommet jaunir et tomber plus tôt que celle des branches inférieures (2). Cette décroissance devient très-marquée lorsque le bois commence à se couronner, c'est-à-dire, lorsqu'il meurt quelques branches à la cime.*

*Le dépérissement est arrivé quand l'écorce se gerce profondément, se sépare du bois, et que par les ger-*

---

(1) A ce sujet, il faut remarquer cependant, qu'il serait possible que la dernière année observée n'eût pas été favorable à la végétation à cause des froids, de la sécheresse ou des insectes. Dans ce cas, la faiblesse de la pousse n'aurait qu'une cause accidentelle et momentanée, indépendante de l'âge et de la croissance du bois.

(2) Ce dernier signe, naturellement, ne peut exister chez les bois résineux, mais le premier, en revanche, est d'autant plus caractérisé chez eux, qu'il contraste davantage avec la forme parfaitement conique qu'affecte leur cime, lorsqu'ils sont en pleine croissance.

çures on aperçoit des écoulements de sève ; quand les mousses, les lichens, les agarics et les champignons s'attachent en grande quantité à l'écorce, et qu'on la voit marquée de taches noires et rousses.

## ARTICLE IV.

## De l'exploitabilité relative.

409. Lorsqu'on se propose d'obtenir soit la rente la plus élevée, soit les bois les plus utiles sous le rapport de leurs dimensions et de leurs qualités, l'exploitabilité est dite *relative*.

410. L'exploitabilité relative de première sorte trouve son application toutes les fois que, considérant une forêt comme un capital placé en fonds de terre, on ne se propose d'autre but que de faire fonctionner ce capital aux conditions les plus profitables à l'intérêt pécuniaire du propriétaire. Dans ce cas, l'exploitation d'une forêt devient une affaire de pure spéculation, et la mesure de l'avantage, que procure l'opération, se trouve exprimée par la proportion entre le revenu net de la propriété et le capital employé à le produire. Or, ce rapport entre le revenu et le capital producteur n'est autre chose que le *taux de placement* de ce capital ou ce que nous avons appelé la *rente* [395]. Et comme le taux des placements en fonds de terre se trouve établi d'une manière à peu près invariable dans chaque localité ou province

d'un grand pays, d'après les conditions générales auxquelles se font les achats et les ventes de propriétés, il s'en suit que lorsqu'on veut appliquer à une forêt l'exploitabilité relative à la rente la plus élevée, il faut constituer les peuplements et fixer la révolution de manière à obtenir le revenu *maximum*, sans que le rapport entre ce revenu et le capital engagé dans la propriété, s'abaisse au-dessous du taux ordinaire des placements en biens-fonds dans la localité.

410 (*bis*). Le capital placé dans une propriété boisée se compose, à un âge quelconque : 1° de la valeur du fonds de terre; 2° de la valeur sur pied du matériel ligneux; 3° de la somme nécessaire pour fournir, en intérêts, les frais annuels de garde, d'entretien et d'impôt (1); 4° de ces intérêts, accumulés eux-mêmes avec intérêts, depuis la naissance du massif. — A ce capital s'ajoute chaque année : 1° la valeur d'un accroissement annuel (2) augmentée de

---

(1) Une propriété qui s'achète 20,000 fr., et qui entraîne à 100 fr. de frais annuels, coûte en réalité 22,000 fr. (en admettant le taux de 5 p. %); car, pour faire face à ces frais, l'acquéreur se prive de la jouissance d'un capital de 2,000 fr. De même, si la propriété est revendue 20,000 fr., le vendeur rentre dans la jouissance du capital correspondant aux 100 fr. de frais, ce qui, de fait, porte le prix de vente à 22,000 fr.

(2) L'accroissement annuel du matériel ligneux est une fonction double du fonds de terre et des accroissements antérieurs, tout comme l'accroissement annuel d'une somme placée à intérêts composés est une fonction double du capital primitif et des intérêts accumulés depuis le jour où le placement a eu lieu.



la plus value acquise par le bois en vieillissant ;  
2° une année de frais, plus les intérêts, pendant un an, des frais déboursés jusqu'alors.

Le revenu, au même âge, c'est l'accumulation des accroissements annuels que le bois a pris depuis sa naissance ; ce n'est donc autre chose que la portion du capital producteur comprise dans le matériel ligneux. — Ce revenu s'accroît, chaque année, de la valeur d'une pousse augmentée de la plus value acquise par le bois en vieillissant.

Le capital producteur, tout en s'augmentant d'une même quantité que le revenu, s'augmente donc en outre d'une valeur qui croît avec la puissance des intérêts composés ; et, quelle que soit la valeur progressive des accroissements annuels, il est incontestable qu'elle ne peut pas être longtemps proportionnelle à cette puissance.

Il suit de là que, pour chaque année de retard apportée à l'exploitation, le rapport entre le revenu et le capital producteur, c'est-à-dire, la rente ou le taux de placement, varie avec le rapport des quantités dont ils se sont accrus, et devient égal, à un moment donné, au taux admis dans la localité.

Remarquons encore que, en exploitant un an plus tôt, le propriétaire aurait pu placer à intérêts la somme réalisée, et qu'il se serait produit un nouvel accroissement ; nous pouvons donc conclure que : *pour que le propriétaire ait intérêt à différer sa coupe d'une année, il faut que le matériel ligneux acquière*

*une plus value supérieure à l'intérêt de la somme qu'il aurait pu réaliser, un an plus tôt, augmenté de la valeur des bois qui se fussent reproduits si l'exploitation avait eu lieu l'année précédente.*

Cette exploitabilité répond évidemment le mieux à la spéculation particulière ; elle abrège les révolutions le plus possible et reste, généralement, en deçà de l'exploitabilité absolue (1).

411. Quand la révolution n'est relative qu'à la qualité et aux dimensions des bois, on peut être amené, selon les circonstances, tantôt à dépasser, tantôt à devancer plus ou moins l'exploitabilité absolue.

Le premier cas se présente s'il s'agit, par exemple, d'élever de fortes pièces pour les constructions navales ou autres ; le second, si la consommation ne demande que des bois de faible dimension, tels qu'il en faut pour cercles de futailles ou pour pisseaux de vigne (2).

---

(1) Il peut même se présenter des cas où un propriétaire aurait avantage à abattre son bois avant même qu'il ait atteint l'exploitabilité relative que nous considérons ici : par exemple, si des circonstances exceptionnelles et momentanées lui offraient à la fois l'occasion de placer sa marchandise à des prix élevés qu'il n'espérait pas en retirer plus tard, et un emploi avantageux et sûr de ses capitaux dans un autre ordre de spéculation.

(2) Dans ce dernier cas, l'exploitabilité de seconde sorte se confondrait évidemment avec celle de première sorte.

## ARTICLE V.

## De l'exploitabilité composée.

412. *L'exploitabilité composée* trouve son application lorsqu'il s'agit d'obtenir, dans un temps donné, ou le plus grand produit matériel joint à la rente la plus élevée, ou la matière à la fois la plus considérable et la plus utile.

413. La réunion des deux premières conditions se présente dans les bois qui, soit à cause de la nature de l'essence, soit à cause de la mauvaise qualité du fonds, entrent en décroissance à un âge peu avancé, avant lequel ils n'auraient pas de valeur commerciale assurée ; parce qu'alors, en effet, la question matérielle, d'accord avec la question financière, commande une révolution de courte durée. Cette exploitabilité convient évidemment au plus haut degré à l'intérêt particulier, en même temps qu'elle satisfait l'intérêt général. Au point de vue de ce dernier, il est donc exact de dire que les forêts médiocres sont les seules bien placées entre les mains des particuliers.

414. Au contraire, réunir les deux autres conditions, c'est-à-dire, obtenir les produits à la fois les plus considérables et les plus utiles, c'est répondre complètement à l'intérêt général, et c'est, par conséquent, dans les forêts de l'État surtout, qu'on doit

se proposer un tel but. On le peut dans un grand nombre de cas, et notamment dans les forêts où les essences les plus importantes et les plus répandues, telles que chêne, hêtre, châtaignier, sapin, épicéa, pin sylvestre, etc., occupent le sol qui leur convient. L'accroissement de ces bois parcourt effectivement d'abord une longue période ascendante; puis, après avoir atteint son apogée, il se soutient pendant assez longtemps à peu près au même niveau. Il résulte de là qu'ils peuvent, sans décroître sensiblement, être conduits à un âge avancé, et acquérir, par suite, les dimensions et les qualités réclamées le plus ordinairement pour les emplois les plus intéressants, tels que la construction et le travail.

---

## CHAPITRE SECOND.

---

### DE LA POSSIBILITÉ.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### De la possibilité en général.

415. Dans une forêt telle que la théorie peut la concevoir, où les essences seraient parfaitement appropriées au sol, le peuplement complet dans toutes ses parties, et l'âge des bois convenablement gradué (1), dans une forêt *normale*, enfin, la possibilité doit être égale à l'accroissement moyen. Il est évident, en effet, que si l'on exploite chaque année un volume exactement égal à celui dont la forêt s'accroît moyennement par an, celle-ci pourra fournir

---

(1) Ce que l'on pourrait concevoir de plus parfait sous le rapport de la gradation des âges, ce serait une forêt qui, sur des étendues égales ou proportionnelles à la fertilité du sol, présenterait des bois de tous les âges, depuis l'arbre exploitable jusqu'au brin naissant.

le même produit annuel à perpétuité ; tout comme un capital continuera à rapporter les mêmes intérêts, aussi longtemps que sa quotité et les conditions du placement ne varieront point.

416. Mais, comme dans la réalité les forêts sont toujours plus ou moins éloignées de l'état normal, et que d'ailleurs une foule de circonstances fortuites rendent infiniment difficile et incertaine l'exacte détermination de cet accroissement moyen, on se contente ordinairement de régler la quotité à exploiter par année, de manière qu'elle ne varie que le moins possible. C'est là ce que l'on nomme exploiter sous la condition d'un *rapport soutenu*.

La plupart du temps, il n'importe point, au surplus, d'atteindre une minutieuse parité entre les produits annuels et successifs, il s'agit seulement d'éviter sous ce rapport de brusques inégalités, de nature à léser à la fois et le propriétaire et le consommateur.

417. Pour déterminer la possibilité, on peut se fonder sur deux bases différentes, l'*étendue* et le *volume*.

#### ARTICLE II.

##### De la possibilité par étendue.

418. La possibilité fondée sur l'étendue s'obtient en divisant la surface totale de la forêt par le nombre d'années de la révolution, ce qui fait connaître la

contenance de la coupe annuelle. Pour procéder ainsi, on pose en principe, que les produits matériels sont entre eux comme les surfaces; d'où il suit qu'égaliser les unes, c'est égaliser les autres. Ce principe toutefois n'est jamais rigoureusement vrai, et il ne devient admissible que quand les essences, la qualité du sol et la croissance du bois ne présentent généralement que peu de dissemblance, parce qu'alors il peut assurer le rapport soutenu. Mais il ne saurait en être ainsi dans une forêt de quelque étendue, où la situation, l'exposition et la nature du terrain apportent souvent des différences très-tranchées dans l'état du bois, et où, par conséquent, sur d'égales contenance, les produits matériels peuvent être d'une inégalité extrême. Dans ce cas, il est évident que le principe que nous venons de poser cesse d'être admissible et que, sous peine de renoncer au rapport soutenu, il devient nécessaire de le modifier dans son application.

419. L'idée qui se présente d'abord pour atteindre ce but, c'est de rendre les contenance des coupes proportionnelles à la fertilité du terrain. Toutefois, ce moyen n'est pas celui que l'on emploie communément, parce qu'il en existe un autre qui, plus simple en pratique, satisfait en outre à plusieurs conditions importantes.

Voici comment on procède.

420. On scinde la forêt en un certain nombre de *grandes divisions*, suivant les nuances les plus

générales du terrain et du peuplement, mais sans s'arrêter aux différences qui se feraient remarquer sur de faibles étendues. Dans ces divisions, on cherche à réunir, autant que possible, des bois dont l'âge soit convenablement gradué, puis on considère chacune d'elles comme un tout isolé qui, en présentant l'homogénéité désirable, rentre ainsi dans les conditions voulues pour permettre de baser la possibilité sur la contenance. Ces divisions ont reçu le nom de *séries d'exploitation*, parce que chacune d'elles est effectivement destinée à fournir, durant toute la révolution, une série de coupes successives et annuelles. Outre la facilité qu'elles donnent pour la fixation de la possibilité particulière à chacune d'elles, elles créent encore des chances de voir leurs produits annuels respectifs se compenser entre eux, ce qui tend dès lors à assurer d'autant mieux la possibilité générale de la forêt. Enfin elles permettent d'appliquer à chaque localité, sans faire naître de confusion, la révolution et le traitement convenables et d'établir des exploitations permanentes sur les divers points de la forêt, où la consommation et l'intérêt du propriétaire peuvent les réclamer.

421. La possibilité par étendue mérite la préférence dans un grand nombre de cas, à cause de sa simplicité et de la régularité qu'elle imprime à la marche des exploitations; cependant, dans les forêts soumises au mode d'exploitation de la futaie



(III<sup>e</sup> livre), il devient impossible de l'adopter, en raison des obstacles nombreux auxquels elle donne lieu, et qui doivent lui faire préférer la possibilité fondée sur le volume.

#### ARTICLE III.

##### De la possibilité par volume.

422. Pour déterminer la possibilité par volume, on conçoit qu'on pourrait procéder d'une manière analogue à celle qu'on suit pour la fixation de la possibilité par étendue ; il n'y aurait qu'à substituer à la contenance de la forêt, la masse totale de bois à y abattre dans le cours de la révolution donnée, et à diviser ce volume par le nombre d'années de cette révolution ; le quotient ferait connaître la quotité de la coupe annuelle.

423. Mais pour suivre une telle marche dans la pratique, il se présente plusieurs difficultés majeures, dont la principale gît dans l'appréciation exacte du volume à employer comme dividende. Pour le trouver, il ne suffit pas, en effet, d'estimer le matériel actuel en bois, il faut encore évaluer celui qui résultera de tous les accroissements successifs pendant la révolution. Or, il est facile d'entrevoir tout ce qu'une pareille opération doit présenter d'éventuel et même de problématique, surtout lorsque la révolution est longue.

De toutes les différentes méthodes plus ou moins ingénieuses, plus ou moins compliquées, qui ont été imaginées jusqu'ici pour déterminer la possibilité en fonction des produits matériels de toute la révolution, aucune n'a encore conduit entièrement au but, parce que la nature des choses ne permet pas d'y atteindre. Mais on peut parvenir à concilier le rapport soutenu de la forêt avec l'ordre et la régularité des exploitations, sans se baser sur une possibilité aussi rigoureusement déduite, et en procédant d'une manière simple, expéditive et cependant suffisamment sûre.

424. Après avoir, s'il y a lieu, partagé la forêt en séries [420], et avoir fixé le terme de la révolution pour chacune, on divise de même la durée de cette révolution en plusieurs époques ou *périodes*, afin d'embrasser plus aisément la marche des exploitations, et de pouvoir la vérifier et la rectifier avec plus de facilité, si, dans un moment quelconque, on le jugeait nécessaire. Il convient, en général, que ces périodes soient des parties aliquotes (1) de la révolution et, de plus, égales entre elles; le plus ordinairement on les fait de 20 ou 10 années, et, dans ce dernier cas, on leur donne le nom de *décennies*.

425. Cela fait, on opère sur chaque série séparé-

---

(1) Quantité contenue exactement un nombre entier de fois dans un tout.

ment, et l'on s'occupe d'y assigner à chaque période ou décennie les parties destinées à être exploitées pendant sa durée. On colloque dans la première les bois les plus vieux, et successivement dans les autres les bois moins âgés, jusqu'à la dernière, où doivent se trouver les plus jeunes (1). Dans ce travail, on examine attentivement les nuances qui se présentent dans l'état du bois, selon le sol, le climat et le peuplement plus ou moins complet, circonstances d'où dépend la production. Si, sous ces divers rapports, il n'existe pas de fortes différences, on affecte aux périodes des *contenances égales* parce que l'on peut considérer qu'en raison de l'étendue toujours assez grande de ces *affectations* périodiques, les différences dont il est question se compensent suffisamment pour pouvoir être négligées.

*Les affectations d'égale contenance doivent être préférées autant que possible.* Mais, quand les nuances dans l'état du bois sont très-prononcées et se pré-

---

(1) Certaines circonstances peuvent quelquefois faire classer une partie de bois dans une période à laquelle elle n'appartiendrait pas par son âge : telles sont, par exemple, l'enclave au milieu d'autres parties dont il conviendrait qu'elle subit le traitement pour satisfaire aux règles sur l'assiette des coupes, ou à d'autres principes de culture ; le dépérissement prématuré ; etc.

La saine application des principes dont nous venons de parler et qui seront l'objet de nos études, de même que l'inspection attentive et réfléchie des localités, fait toujours facilement découvrir et apprécier ces diverses circonstances exceptionnelles.

sentent sur d'assez grandes surfaces pour influencer d'une manière notable sur les produits matériels, et quand, surtout, l'intérêt du propriétaire réclame une égale répartition des produits par période, il devient alors nécessaire d'attribuer aux affectations des *contenances proportionnelles*. La proportion s'établira facilement, si, rapportant les différents états de production tous à un seul, pris pour unité ou terme de comparaison, on les exprime par des nombres. Le rapport des surfaces sera alors évidemment l'inverse de celui des productions, de sorte qu'à une production double ou triple, par exemple, répondra la contenance du tiers ou de la moitié donnée par la proportion. Par conséquent, les affectations périodiques seront inégales en contenance, pour se trouver égales quant aux produits matériels qu'elles devront fournir.

Par ces affectations suffisamment égales en produits, on assure pour toute la révolution le rapport soutenu, sans néanmoins employer d'autres moyens que la simple appréciation du peuplement plus ou moins complet et de la fertilité relative du sol et du climat. Dégagé dès lors du soin de l'avenir, on n'a plus à s'occuper que des besoins actuels, et ce n'est que dans l'*affectation de la première période* que l'on cherche les éléments de la possibilité qu'il s'agit de déterminer.

426. Dans ce but, on évalue d'abord le volume actuel des bois de l'affectation ; en second lieu, leur

accroissement probable pendant la période. Si l'on ne veut consacrer à cette double évaluation que le moins de temps et le moins d'argent possible, elle peut se faire à l'aide de procédés purement empiriques, c'est-à-dire par de simples comptages d'arbres, dont on estime le volume au jugé, en y ajoutant quelque chose pour tenir compte de l'accroissement probable jusqu'au moment de l'abatage (1). Et, comme on ne peut savoir positivement dans quelle année de la période les différentes parties de son affectation viendront en tour d'exploitation, on calcule l'accroissement de tous les bois comme s'ils devaient être abattus pour le milieu de la période (2). Faisant

---

(1) Quand les bois approchent de l'époque de leur exploitabilité absolue, ou lorsqu'ils l'atteignent, ils ont ordinairement un accroissement annuel de  $2\frac{1}{2}$ , 2,  $1\frac{1}{2}$ , ou même 1 pour cent de leur volume, selon les circonstances sous lesquelles ils végètent.

Lors donc que l'on connaîtra le volume d'une affectation périodique, on pourra, par ce moyen, déterminer approximativement de combien il s'accroîtra jusqu'à l'abatage. Soit, par exemple, ce volume, 10,000 stères, et que l'on estime l'accroissement annuel à 2 pour cent, l'augmentation par an sera de 200 stères.

On peut encore se contenter de l'accroissement moyen, pour en conclure l'accroissement futur. Dans ce cas, il suffit, comme on le sait, de diviser le volume actuel par l'âge du bois. Ce moyen extrêmement simple et prompt, a l'avantage de donner généralement des résultats un peu au-dessous de la vérité et d'empêcher, par conséquent, que la possibilité ne soit dépassée.

(2) On conçoit que cette manière de procéder puisse donner un résultat, sinon exact, du moins suffisamment approché. Il est évident, en effet, qu'une moitié des bois composant l'affectation sera coupée dans

ensuite la somme et du volume existant et de l'accroissement probable, puis la divisant par le nombre d'années de la période, on obtient la possibilité cherchée.

Les procédés plus rigoureux que nous enseignent la dendrométrie (1), savoir, le cubage sur pied des arbres, et l'évaluation de leur accroissement futur basée sur leur accroissement actuel, présentent en général un résultat plus exact, et doivent être préférés quand l'exécution en est possible. Mais, à quelque mode d'estimation que l'on ait recours, il sera toujours facile de rectifier les résultats obtenus qui, naturellement, ne sont pas exempts d'une certaine erreur. Il suffira, pour cela, de s'assurer, après quelques années d'exploitation, si les bois restés debout dans l'affectation de la période, pourront continuer à fournir le même produit annuel jusqu'à la fin, et, dans le cas contraire, de faire les corrections nécessaires. En répétant cette opération plusieurs fois, si on le jugeait utile, dans le courant de la période, on finirait par approcher beaucoup de la vérité, la vé-

---

la première moitié de la période, et que l'autre moitié de ces bois ne sera coupée que dans la seconde moitié de la période. Donc en calculant l'accroissement de tous les bois pour l'année moyenne de la période, on compense l'accroissement des arbres qui ne seront coupés qu'après cette époque par l'accroissement des arbres qui seront coupés avant.

(1) *Dendron* arbre, *metron* mesure ; *dendrométrie*, art de mesurer les arbres.

rification devenant de plus en plus facile et de plus en plus exacte, au fur et à mesure qu'il reste moins de bois sur pied.

427. La première période expirée, on procédera de même pour fixer la possibilité de la seconde, et l'on examinera, en même temps, s'il n'y a pas lieu d'apporter quelques changements aux affectations périodiques, par suite de circonstances survenues dans le cours de la période écoulée, et qui influeraient notablement sur la production; et ainsi de suite de période en période, jusqu'à la fin de la révolution.

Chaque nouvelle possibilité différera sans doute, dans la plupart des cas, de la précédente, mais jamais au point de compromettre le rapport soutenu. Or, c'est là le degré d'approximation qu'il s'agit d'atteindre.

428. Le mode de fixation de la possibilité par volume, tel qu'il vient d'être développé, doit, selon l'état des forêts que l'on rencontre, éprouver des modifications. Nous les discuterons en parlant de chacun de ces états en particulier.

---

---

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### DE L'ASSIETTE DES COUPES.

---

#### ARTICLE PREMIER.

De l'assiette des coupes en général.

429. Lorsqu'il s'agit d'établir une marche rationnelle dans les exploitations d'une forêt, l'assiette des coupes est aussi importante et souvent aussi difficile que la fixation de la possibilité. Elle exerce l'influence la plus directe sur la prospérité et sur la conservation des bois, et mérite, par conséquent, l'attention toute spéciale du forestier.

Les règles sur lesquelles elle s'appuie sont au nombre de cinq; mais il n'est pas toujours possible de se conformer à toutes à la fois, parce que souvent l'application de l'une contrarie l'application de l'autre. Quand une pareille opposition se présente, c'est au forestier à savoir, d'après les circonstances locales, à laquelle de ces règles il doit donner la préférence.



## ARTICLE II.

## Première règle.

*430. Dans une même série d'exploitation, les coupes doivent être assises de manière à se succéder de proche en proche, et recevoir la forme la plus régulière possible.*

Quand l'assiette des coupes se fait sans ordre ni suite, le jeune bois qui se trouve sur les limites de ces coupes, souffre toujours plus ou moins du couvert des arbres voisins, et, lorsque ceux-ci viennent à être exploités, ils lui causent encore un dommage notable par l'abatage, le façonnage et surtout par la vidange. Si les limites sont irrégulières et forment des sinuosités profondes, ce dommage est d'autant plus grand. Enfin, lorsque les exploitations ne se suivent point, il devient plus difficile d'exercer sur les jeunes coupes toute la surveillance qu'elles réclament, en raison des nombreux dégâts que peuvent y commettre les hommes et les animaux.

En observant la règle que nous venons d'énoncer, on évite tous ces inconvénients, et l'on se procure de plus l'avantage bien réel de réunir toujours des bois peu différents d'âge, qui se prêtent un mutuel appui contre les vents, la neige, le givre, etc., se poussent réciproquement dans leur croissance en hauteur, et sont sous tous les rapports plus faciles à administrer.

Mais dans l'état souvent fort irrégulier où se trouvent nos forêts actuelles, on ne peut pas établir, dès à présent, une suite non interrompue de coupes ; il faudrait pour cela consentir à exploiter certaines parties bien avant, et d'autres bien après le terme de la révolution, ce qui entraînerait nécessairement une perte plus ou moins considérable de produits. On doit donc (du moins pour la première révolution) se contenter d'approcher de l'ordre désirable, en disséminant les coupes le moins possible, et, dans ce but, ne pas hésiter à faire quelques légers sacrifices, si la trop grande inégalité d'âge des bois les rendait nécessaires.

## ARTICLE III.

## Seconde règle.

*431. Les coupes doivent être disposées de manière que les bois d'une coupe en exploitation ne soient pas dans le cas d'être transportés à travers d'autres coupes précédemment exploitées.*

Cette règle a pour but de faciliter les transports, et particulièrement d'éviter les dommages des vidanges qui, ne pouvant s'exécuter la plupart du temps qu'à l'aide de nombreux charrois, sont surtout ruineuses dans les jeunes coupes. Pour s'y conformer, il suffit que chaque coupe soit indépendante des autres, et qu'elle aboutisse directement, soit sur une route ou un chemin, soit sur un ruisseau où le bois

puisse se flotter, soit enfin sur les terres ou sur les prés.

## ARTICLE IV

## Troisième règle.

*432. Dans toute forêt ou série d'exploitation, les coupes doivent être assises de manière que celles qui sont à exploiter au commencement de la révolution, se trouvent placées du côté du Nord ou de l'Est, et les dernières du côté du Sud ou de l'Ouest.*

Ce sont les vents soufflant de ces deux dernières directions, qui, en général, exercent le plus de dégâts dans les forêts, parce que, étant d'ordinaire accompagnés de pluies et très-souvent d'orages, ils détremperont la terre et déracinent ainsi plus facilement les arbres. Les vents du Nord et de l'Est au contraire, outre qu'ils sont ordinairement moins violents, amènent presque toujours la gelée ou la sécheresse, et, dans ce cas, les racines offrent plus de résistance.

Il est donc très-essentiel que les arbres réservés en plus ou moins grand nombre dans les coupes, selon le mode d'exploitation adopté, soient garantis le plus possible des vents dangereux par la masse de la forêt.

Cette direction des coupes présente un avantage de plus dans les forêts d'essences à semences légères, parce que ces semences, qui se disséminent en grande

partie par les vents chauds du Sud et de l'Ouest, sont dès lors portées, des portions demeurées intactes, dans celles que l'on exploite et dont elles augmentent ainsi les chances de régénération.

Quoi qu'il soit à conseiller d'appliquer la troisième règle à toutes les essences, même au chêne qui est la plus fortement enracinée, il faut observer, cependant, qu'elle est surtout d'une haute importance dans les forêts de bois résineux qui, en général, ont une tige plus élevée et moins de racines que les bois feuillus.

La situation des forêts peut seule amener des cas d'exception. On sait, par exemple, que vers les bords de la Méditerranée, ce sont très-fréquemment les vents d'Est qui apportent les pluies, et il est également notoire que, dans les pays de montagnes, la configuration du terrain peut être telle, que les vents, quoique soufflant du Sud et de l'Ouest, viennent cependant s'engouffrer dans les vallées, de manière à frapper sous des directions toutes différentes. Dans de pareilles circonstances, la règle qui nous occupe doit nécessairement subir les modifications indiquées par la localité.

433. On ajoute aux avantages de la règle que nous venons d'examiner, en laissant subsister sur les lisières Ouest et Sud, lorsque les exploitations y parviennent, un rideau d'arbres en massif, d'une profondeur plus ou moins grande (de 15 à 30 mètres), selon que la situation est découverte ou

abritée, l'essence traçante ou pivotante, etc. On sait que, vers les lisières, les arbres sont en général plus branchus, moins élancés et plus enracinés que dans l'intérieur de la forêt, et que, s'étant développés sous l'action continuelle des vents, ils résistent mieux, par suite, à leur violence.

En n'exploitant ce rideau que 10 ou 20 ans après que la régénération des parties contiguës sera complètement assurée, on n'aura plus, alors, à se préoccuper que du faible espace sur lequel il s'étend et que, au besoin, on repeuplerait artificiellement (1).

#### ARTICLE V.

##### Quatrième règle.

434. *En montagne, il faut couper d'abord les parties inférieures, et conserver les supérieures pour les dernières exploitations.*

Ce sont les sommités qui sont le plus exposées aux ravages des vents, et, lorsqu'elles sont boisées, elles en diminuent la violence. En commençant donc l'exploitation par les plateaux, on doit craindre que

---

(1) Le maintien d'un rideau peut être utile encore pour garantir certaines essences contre les vents desséchants ou froids, qui souvent nuisent considérablement aux jeunes plants dans les premières années de leur existence. Dans ce cas, ce n'est pas au Midi et à l'Ouest, mais au contraire, au Nord ou à l'Est que l'abri doit être établi.

les parties des pentes, immédiatement contiguës, ne soient plus suffisamment garanties et que, n'étant pas habituées à subir l'action entière et directe des ouragans, elles ne se trouvent compromises dans leur existence et dans leur régénération. En outre, les semences tombant naturellement du haut vers le bas des montagnes, il est utile que les élévations restent garnies le plus longtemps possible, pour contribuer au réensemencement des parties inférieures.

Tels sont les motifs qui ont dicté cette règle. Mais, en s'y conformant, il est évident que si l'on ne pouvait assurer à chaque coupe quelque moyen direct de vidange, on retomberait dans l'inconvénient de faire traverser aux bois de la coupe en exploitation les coupes précédemment exploitées.

On remédie à cet inconvénient en pratiquant un chemin de voiture qui sillonne la montagne du haut en bas, de manière à la diviser en plusieurs zones et à permettre que toutes les coupes viennent y aboutir. Parfois on établit aussi des *chemins à traîneaux* (1)

---

(1) Pour établir ces chemins, on creuse dans la côte un sentier, dans une direction sinueuse et convenablement en pente, et on le garnit de rondins ou de bois de quartier, placés parallèlement en travers du sentier, et à la distance de 45 à 60 centimètres les uns des autres; chaque bûche est maintenue par un ou plusieurs piquets enfoncés à fleur de terre. Des deux côtés de ces bûches on adapte parfois des perches, afin d'empêcher le traîneau de sortir de la voie, et l'on a soin de graisser avec du

et des *lançoirs* (1). Dans certains cas, cependant, aucun de ces moyens ne peut être employé, soit

---

lard, du suif ou du savon les endroits des bûches sur lesquels les membrures du traîneau doivent frotter, pour rendre la descente d'autant plus facile quand le traîneau est fortement chargé. A côté de ce chemin à traîneau on pratique un autre sentier, ou du moins on établit un nombre suffisant de places sur les côtés, pour que les traîneaux vides puissent être remontés sans rencontrer en chemin les traîneaux chargés.

(*Dictionnaire des forêts* de Baudrillart.)

(1) Le *lançoir* ou *glissoir artificiel* consiste dans un canal de 66 centimètres à 1 mètre d'ouverture, sur 50 centimètres de profondeur; il se compose de six à huit parches ou jeunes tiges d'arbres, longues, droites et unies, assemblées de manière à former un demi cylindre creux, que l'on dispose pour que le bois qu'on y jette glisse de lui-même et se rende au bas de la montagne.

Les glissoirs qui ne sont destinés qu'au bois de chauffage ou de travail et même aux billes de sciage, peuvent être dirigés en ligne droite, du haut en bas de la montagne; mais quand il s'agit d'en construire pour faire glisser des pièces de longueur, on doit les diriger de manière qu'ils forment une longue courbe, afin que les pièces ne tombent pas avec trop de vitesse et n'éprouvent aucun dommage. On doit aussi diminuer la rapidité de la chute, vers l'extrémité du lançoir, en le rendant horizontal à cette extrémité, et l'on y pratique, lorsque cela est possible, un étang ou réservoir d'eau d'une profondeur suffisante pour amortir la violence de la chute et empêcher que les pièces ne se rompent.

Ordinairement, la surface du sol, dans les pentes de montagne, n'est pas telle que le lançoir puisse reposer immédiatement sur la terre dans tous ses points. On remédie à cet inconvénient par des cales ou baudets, qui donnent au glissoir le talus nécessaire.

Le lançoir est encore susceptible d'une amélioration importante, si, par un temps de gelée, on y répand de l'eau dont la congélation le revêt d'une croûte de glace, ou s'il tombe un peu de neige ou de verglas, ce qui lui procure également une surface polie, et diminue le frottement des

à cause de la pente trop escarpée de la montagne, soit parce qu'elle se trouve traversée par des bancs de rochers trop considérables. Dans de telles circonstances, il vaudrait mieux se décider à commencer les coupes par le haut, sauf à maintenir sur les plateaux un rideau d'une épaisseur suffisante [433] pour protéger les versants. Le même expédient devrait encore être employé si, à cause de l'âge des bois, il était indispensable de régénérer en premier lieu les parties supérieures.

Quant au rideau lui-même, mis ainsi, par destination, en dehors de toute régénération régulière, il serait traité d'après le mode *jardinatoire* [438] afin

---

bois que l'on fait glisser. Aussi dans les pays où l'on emploie ce moyen de vider les bois le pratique-t-on ordinairement pendant l'hiver.

La plupart des lançoirs ou glissoirs sont en bois ; cependant, on en a fait en fer dans quelques pays où l'usage de transporter ainsi le bois est permanent. Dans le Wurtemberg, dit M. Hartig, il y en a un qui, n'ayant que 45 centimètres de largeur sur 27 centimètres de profondeur, est surmonté d'un toit pour que le bois ne puisse sauter en dehors.

(*Dictionnaire de Baudrillart.*)

Ces lançoirs sont un des moyens de vidange les mieux entendus, et l'établissement en est bien moins coûteux et plus facile que celui d'un chemin à traîneaux. En y jetant les bois, on ne risque pas d'endommager les arbres voisins ni de détériorer le sol au point de causer à la longue des ravines dangereuses, ainsi que cela arrive lorsque, comme autrefois dans les Vosges par exemple, on lance immédiatement sur la terre. En outre, on ménage singulièrement le jeune bois et, lorsque l'opération est terminée et l'appareil enlevé, on aperçoit à peine la trace du passage des produits de la coupe.

(*Note de l'Auteur.*)



de remplir son office le mieux et le plus longtemps possible.

ARTICLE VI.

Cinquième règle.

*435. Dans tous les cas, les coupes en montagne, autant que les localités le permettront, devront être longues et étroites et présenter leur moindre profondeur aux vents dangereux.*

Cette règle s'explique d'elle-même.

---

## LIVRE TROISIÈME.



---

---

## LIVRE TROISIÈME.

---

### DE L'EXPLOITATION DES FUTAIRES.

---

#### DÉFINITIONS.

436. On nomme *futaie* la forêt destinée à produire plus particulièrement des bois de fortes dimensions et à se régénérer par la semence. En général, cette régénération doit s'opérer par les graines tombant naturellement des arbres, et ce n'est que par exception qu'elle a lieu artificiellement.

437. Une futaie est appelée *régulière* lorsqu'elle présente, dans toutes ses parties, un peuplement uniforme et complet, des âges convenablement gradués, et qu'elle renferme en elle-même tous les éléments propres à assurer la régénération naturelle. Le plus sûr moyen d'arriver à cette régularité est

l'emploi de la méthode d'exploitation connue sous le nom de *méthode du réensemencement naturel et des éclaircies*, méthode qui sera développée dans le chapitre suivant.

438. On nomme *irrégulière*, au contraire, la futaie dont le peuplement est inégal et incomplet, où les âges sont mal gradués, et dans laquelle ne se trouvent pas les conditions qui constituent la futaie régulière. Cet état est ordinairement dû à des exploitations routinières, vicieuses, ou bien au hasard, plutôt qu'à un système arrêté et suivi avec connaissance de cause. Ainsi l'on trouve communément à l'état de futaie irrégulière, les forêts soumises au mode appelé *jardinage* et celles qui sont traitées à *tire et aire*, modes dont il sera question plus tard.

439. On exprime par *clairière* un lieu dégarni de bois et qui ne peut se repeupler naturellement, en raison du petit nombre d'arbres qui s'y trouvent.

440. Les *places vides* sont des espaces entièrement dégarnis de bois, ou tout au plus couverts de quelques petits arbrisseaux et arbustes.

441. On n'applique les noms de *clairières* et de *places vides* qu'à de faibles contenances ; lorsqu'elles sont considérables, elles prennent le nom de *terres vaines et vagues*.

442. Une partie de bois est en *massif* lorsque les branches de la cime des arbres se touchent sans être agitées par le vent.

443. Le massif est *serré*, quand les branches s'en-

trelacent; *incomplet* ou *clairié*, s'il existe de nombreuses clairières; *entrecoupé*, quand il est parsemé de vides.

444. Un massif de bois tout jeunes, dont les tiges sont encore garnies de leurs branches dès la base, se nomme *fourré*; quand, par suite de l'état très-serré de ces tiges, les branches inférieures sèchent et tombent, nous l'appelons *gaulis* (1); enfin, lorsque les perches atteignent à peu près la grosseur de 10 centimètres et plus de diamètre au pied, nous qualifions le bois de *perchis*. Parmi les perchis, on distingue encore les *hauts-perchis* et les *bas-perchis*. Ceux-ci se composent de tiges ayant au plus le diamètre que nous venons d'indiquer, tandis que les premiers peuvent atteindre jusqu'à une grosseur double. Les *hauts-perchis* reçoivent aussi, dans certaines localités, le nom de *demi-futaies*.

445. La dénomination de *bois blanc*, impropre, mais consacrée par l'usage, indique, parmi les essences feuillues, les bois de qualité médiocre et d'une contexture molle, quelle que soit d'ailleurs leur couleur : tels sont les *aunes*, les *tilleuls*, les *peupliers* et les *saules*. On les eût mieux appelés *bois tendres*. Par

---

(1) Dans plusieurs départements, la dénomination de *gaulis* indique la qualité de bois que nous appelons *perchis*. Nous avons pensé que ce dernier terme convient mieux pour des bois déjà d'une certaine force, tandis que *gaulis*, qui dérive de *gaule*, nous a paru s'appliquer mieux à des bois de faible dimension.

opposition avec cette désignation de *bois blancs* ou *bois tendres*, on comprend les autres bois feuillus sous la dénomination générale de *bois durs*.

446. On désigne par *morts-bois* la plupart des arbrisseaux dont la présence indique ordinairement le mauvais état des forêts : tels sont le *sureau*, le *coudrier*, le *cornouiller mâle*, le *cornouiller sanguin*, le *troëne*, les *viornes*, le *fusain*, la *bourdaine*, le *houx*, les *épinés*, le *genévrier*, etc., etc.

447. Par *bois abroutis*, on entend les jeunes bois broutés par les bestiaux ou par le gibier, et l'état de ces bois se nomme *abroutissement*. Lorsque les essences sont de nature à bien repousser de souche, on remédie à cet état de détérioration par le recépage.

448. *Recéper*, c'est couper à fleur de terre les jeunes tiges, dans le but de les faire rejeter de souche. Cette opération se pratique pour régénérer non-seulement les bois abroutis, mais encore ceux qui ont été dégradés par l'effet des grandes gelées, des incendies, et même par la dent des mulots, qui souvent en pèlent presque entièrement l'écorce; on *recépe* dans le même but les bois qui ont languï pendant trop longtemps sous le couvert de grands arbres.

449. Mettre une forêt *en défends*, c'est en interdire l'entrée aux bestiaux, parce que les bois ne sont pas assez élevés pour échapper à l'abroutissement.

450. On appelle *bois défensable* celui qu'on peut ouvrir au pâturage, parce qu'il n'a plus rien à craindre de la dent du bétail.

451. Lorsque, dans une coupe on laisse subsister un certain nombre d'arbres, pour un temps et dans un but quelconques, ces arbres reçoivent le nom de *réserves* et, pris dans leur ensemble, ils forment ce qu'on appelle la *réserve de la coupe*.

452. Les jeunes bois qui s'élèvent sous les réserves s'appellent le *sous-bois*.

453. Une coupe, exploitée sans aucune réserve, est une coupe à *blanc-étoc*.

---



## CHAPITRE PREMIER.

---

### MÉTHODE

DU RÉENSEMENCEMENT NATUREL ET DES ÉCLAIRCIES,

OU

EXPLOITATION DES FUTAIES RÉGULIÈRES.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Généralités.

454. La méthode du réensemencement naturel et des éclaircies consiste à exploiter les futaies de manière à en assurer le repeuplement naturel et complet, et à favoriser le plus possible leur croissance, depuis la première jeunesse jusqu'au terme de l'exploitation.

Cette théorie repose sur des faits simples et peu nombreux observés dans la nature et, pour la plupart, établis par la physiologie végétale, science que l'on doit prendre pour guide dans toute méthode de culture.

455. La graine ne germe que sous l'influence simultanée de l'humidité, de l'oxigène (1) et d'un certain degré de chaleur. Quoique le sol ne soit point pour la germination un milieu indispensable, son action, quand la semence s'y trouve placée, n'en est pas moins très-essentielle. En effet, c'est par son intermédiaire qu'elle doit recevoir, dans les proportions convenables, l'influence des trois agents que nous venons de nommer; il importe donc qu'il ne soit ni trop léger ni trop compacte [43]. Il importe encore qu'il soit *substantiel*; car dès que la radicule est développée, elle a besoin d'y trouver des sucres nourriciers qu'elle puisse s'assimiler facilement.

456. *La lumière n'est point nécessaire* à la germination, et lorsqu'elle est très-vive elle devient souvent nuisible; aussi la nature nous montre-t-elle la plupart des graines germant à l'ombre. Mais aussitôt que la jeune plantule a percé la terre, elle réclame l'influence de la lumière qui, pour être bienfaisante, ne doit néanmoins lui être dispensée qu'avec mesure (2). L'action trop intense des rayons solaires tue bientôt les plantes naissantes, et plusieurs essences forestières surtout, montrent, sous ce rapport, une grande susceptibilité [126 et 279].

Ce n'est qu'après avoir acquis un certain degré

---

(1) L'un des gaz composant l'air atmosphérique.

(2) Voyez de Candolle, *Physiologie végétale*, Chap. vi.

de force sous un abri protecteur, que le jeune plant peut, sans inconvénient, et même avec avantage, recevoir les influences atmosphériques. Cette époque varie selon le tempérament plus ou moins robuste des essences.

457. A partir du moment où le plant a acquis assez de vigueur pour croître librement sous l'action des météores, il présente, lorsqu'il est serré en massif (ainsi que cela a lieu dans les forêts), une nouvelle série de phénomènes végétatifs.

Toute plante, pour croître, exige un certain espace, aussi bien dans le sol pour y étendre ses racines, que dans l'atmosphère pour y étaler ses branches; et, à mesure de l'accroissement de la plante, l'espace qu'elle occupe devient nécessairement plus grand. Or, il est évident que, dans une jeune forêt, qui dès les premières années s'élève en massif serré, tous les plants composant ce massif ne pourront plus trouver place lorsque, par exemple, ils auront acquis un volume double. De là, la nécessité matérielle d'une diminution dans leur nombre, au fur et à mesure de leur accroissement. On remarque, en effet, dans un tel massif, qu'il s'engage une lutte entre les jeunes plants, qui tous cherchent à s'emparer, dans l'atmosphère, de l'espace qui leur est indispensable pour étendre leurs branches et pour participer aux influences de la lumière. Dans cette lutte les brins les plus faibles, privés de cet espace, surmontés et dominés, ne tardent pas, ainsi

que les branches inférieures des autres, à sécher et à tomber en pourriture; et c'est ainsi que, d'année en année, le nombre des tiges diminue, et que celles qui persistent, comme étant les plus élevées et les plus vigoureuses, se débarrassent de plus en plus de leurs branches basses, et prennent un fût d'une plus grande longueur.

Pendant la première jeunesse de la forêt, cet état de choses ne présente pas d'inconvénients; il est certain même qu'il offre des avantages, les jeunes brins se prêtant un mutuel appui contre les intempéries et se poussant à croître en hauteur. Mais plus ils avancent en âge, plus la lutte devient opiniâtre, parce que les tiges dominées, quoique privées de l'action de la lumière, sont d'autant plus longtemps à succomber qu'elles sont plus fortes, ce qui dès lors produit un ralentissement marqué dans l'accroissement de tous les bois. Néanmoins, le nombre des arbres diminue toujours insensiblement d'après la même loi.

Dans une forêt abandonnée à elle-même, cette opération naturelle continue de la sorte, jusqu'à ce qu'il arrive un point où les bois s'éclaircissent assez pour offrir les conditions favorables à la réussite des plants produits par leur semence. Alors une nouvelle génération se présente pour remplacer celle qui est parvenue à maturité.

458. Tel est le travail de la nature. Il faut chercher à l'imiter, non servilement, mais de manière

à maintenir, et à faire naître au besoin, toutes les circonstances propres d'une part, à *assurer la régénération des bois*, de l'autre, à hâter et *améliorer leur croissance* (voir l'Introduction).

Les divers genres de coupes qui constituent la méthode d'exploitation qui nous occupe, doivent toujours aboutir à l'un de ces deux résultats.

#### ARTICLE II.

##### Coupes de régénération.

459. D'après ce que nous venons de voir, les conditions de la régénération d'un massif de futaie parvenu à son exploitabilité peuvent se résumer ainsi :

- 1° Sol meuble et substantiel ;
- 2° Ensemencement complet du terrain ;
- 3° Abri aux jeunes plants au commencement de leur existence ;
- 4° Participation des jeunes plants aux influences atmosphériques, selon leur tempérament plus ou moins robuste.

Ces conditions, le forestier les réalise par trois coupes successives.

460. Dans la première, appelée *coupe d'ensemencement*, il laisse sur pied le nombre d'arbres nécessaire pour garnir de graines tout le terrain de la partie en exploitation, et pour abriter, tant contre les ardeurs du soleil que contre les gelées, les jeunes plants qui lèvent après la chute des semences.

Si la graine est lourde et le jeune plant délicat, comme cela arrive pour le hêtre, par exemple, les arbres devront être assez nombreux pour que les extrémités de leurs branches se touchent lorsqu'un léger vent les agite et, dans ce cas, la coupe sera dite *sombre*. Mais si, au contraire, les graines sont légères et les jeunes plants robustes, les arbres pourront être écartés davantage. Il est essentiel que la réserve se compose, autant que possible, d'arbres sains et vigoureux, susceptibles de fournir abondamment de bonnes semences.

La coupe d'ensemencement satisfait évidemment aux trois premières conditions que nous venons d'énoncer. En effet, elle conserve, par son couvert, *le sol meuble* (1) et *substantiel* (terreau) qui s'est formé sous le massif et qui, joint au lit de feuilles, facilite la germination et le développement du jeune plant; elle assure *l'ensemencement complet*; enfin elle procure à la jeune plante *l'abri* qui convient à son tempérament.

461. Aussitôt que les jeunes bois ont acquis un

---

(1) Rien ne s'oppose à ce que, dans les coupes d'ensemencement, on déracine les souches des arbres abattus. Cette extraction augmentera les produits en matière et pourra, là où le terrain n'est pas suffisamment *meuble*, le préparer à recevoir utilement la semence des arbres de réserve. Il n'y a d'exception à cet égard que pour les pentes un peu raides, dans lesquelles cette opération pourrait avoir pour suite l'éboulement des terres.

certain degré de force, ce dont on s'assure surtout par la forme de leur cime et par l'aspect de leur feuillage dans la saison de la végétation, il devient nécessaire de les faire participer davantage aux bienfaits de la lumière et de l'air. La coupe qui doit remplir ce but, et qui consiste à éclaircir la réserve, c'est-à-dire à en abattre une partie, se nomme *coupe claire* ou *secondaire*. Dans cette opération, on enlève de préférence les arbres qui surmontent les plants les plus vigoureux et les plus élevés, en ayant soin cependant d'en laisser quelques-uns afin de conserver l'ombrage encore utile. On n'en coupe aucun dans les places où l'ensemencement n'est pas complet, et où les jeunes brins sont encore trop faibles.

Lorsque le tempérament du jeune plant est très-délicat, et que l'exposition et le climat rendent les chaleurs ou les gelées redoutables, on fera bien d'effectuer la coupe secondaire en plusieurs fois, c'est-à-dire, d'éclaircir la réserve insensiblement, de manière à acclimater plus sûrement le sous-bois.

492. Enfin, lorsqu'on est assuré que le sous-bois est assez fort pour se passer de tout abri, on procède à la *coupe définitive* en abattant le restant de la réserve. N'étant plus dominés d'aucune manière, les jeunes bois s'élancent dès lors et prennent une croissance rapide (1).

---

(1) C'est à tort que certains forestiers persistent, même après

Dans certaines circonstances, on conserve dans les coupes définitives quelques arbres que l'on destine à parcourir une seconde révolution, afin d'obtenir des bois de dimensions très-fortes. Ces réserves doivent être placées sur le bord des chemins et sur les lisières de la forêt. Dans de tels emplacements, elles porteront moins de préjudice au sous-bois, et elles pourront d'ailleurs être extraites sans difficulté, si le dépérissement ou des besoins extraordinaires forçaient à les abattre.

463. Comme on le voit, la coupe secondaire et la coupe définitive sont destinées à accomplir la quatrième et dernière condition de la réussite du repeuplement naturel. Il est presque inutile d'ajouter que, pour assurer le succès de ses travaux, le forestier doit prendre les mesures de police et de surveillance nécessaires, afin de garantir les jeunes semis de tout dommage extérieur, causé soit par les hommes, soit par le bétail ou le gibier.

---

la coupe définitive, à maintenir des réserves sur les petites clairières qui peuvent exister, çà et là dans la coupe, par suite de causes diverses. Cette précaution est vaine. D'abord ces arbres isolés sont la plupart du temps renversés ou brisés par les vents; en second lieu, le sol, dans ces endroits, est ordinairement ou couvert de plantes nuisibles ou durci au point qu'aucune graine ne saurait y prospérer. Le meilleur moyen est donc d'abattre tous les arbres en même temps et de régénérer artificiellement les places dont il s'agit. La plantation, dans ce cas, sera préférable au semis, en ce qu'elle établira plus d'égalité dans l'âge des jeunes tiges.



464. L'exposition et la nature du sol doivent modifier les quantités d'arbres dont il convient de composer tant la coupe d'ensemencement que la coupe secondaire, et influencer en même temps sur l'époque de celle-ci. Ainsi, dans les terrains qui ont une disposition prononcée à se gazonner et à se couvrir de plantes nuisibles, de même que dans les pentes méridionales, où le soleil frappe vivement et où la terre est sèche et légère, il est indispensable de serrer la réserve des coupes d'ensemencement et de modérer, en les retardant, les extractions dans les coupes secondaires. Par là, on ombragera plus efficacement le sol et les jeunes plants, et l'on arrêtera la crue des mauvaises herbes (1). Les mêmes précautions devront être prises en approchant de la lisière des bois et sur les sommets où le vent disperse facilement le lit de feuilles.

---

(1) Plusieurs auteurs allemands estimés, entre autres M. de Berg, enseignent que, dans les sols secs et aux expositions méridionales, les coupes secondaires doivent être entreprises plus tôt et éclaircies plus fortement que dans les terrains frais et abrités, afin, disent-ils, de faire profiter les jeunes plants de l'influence bienfaisante des pluies douces et des rosées. Mais s'il est incontestable que ces météores sont favorables au sous-bois, il est évident aussi, d'un autre côté, qu'en le découvrant, comme on le conseille, on l'expose à être saisi par les fortes chaleurs ou par les gelées printanières. Nous pensons que mieux vaut encore risquer de retarder un peu la végétation des jeunes plants par trop de couvert, que s'exposer à les perdre par l'excès contraire; car, la réserve une fois amoindrie, il deviendrait difficile, sinon impossible, d'obtenir une nouvelle et complète régénération naturelle des arbres restants.

En partant de ce principe, on peut laisser moins d'arbres sur pied, à mesure que les coupes s'éloignent de l'exposition du Midi ou qu'elles sont moins sujettes à se gazonner. Toutefois, on ne devra jamais perdre de vue l'ensemencement complet de la coupe sombre, ainsi que l'abri nécessaire de la coupe secondaire.

## ARTICLE III.

## Coupes d'amélioration.

465. Pour que la jeune forêt produite par les trois coupes successives, puisse désormais prendre tout le développement dont elle est susceptible, il importe que l'art, toujours attentif aux indications de la nature, continue à seconder celle-ci et à hâter l'accomplissement de son œuvre. Dans la plupart des cas, le besoin de cette intervention ne tarde pas à se faire sentir. En effet, quelle que soit l'attention que l'on mette à bien espacer la coupe d'ensemencement, et à amener la reproduction des meilleures essences, il ne s'y introduit pas moins des bois tendres, dont les graines légères sont apportées de loin par les vents et lèvent avec une grande facilité. Ces essences, auxquelles se joignent les morts-bois, étant d'une végétation très-prompte, ne tardent pas à dominer les plants des essences plus précieuses et à les gêner dans leur croissance. Dès qu'on s'aperçoit de cet état de choses, on doit se hâter de procéder à

l'extraction des bois tendres et des morts-bois. Cette opération se nomme *coupe de nettoitement*. Ce serait une grande faute de la retarder dans la vue de donner plus de valeur aux bois tendres; le dommage qui en résulterait pour les bonnes essences, serait bien loin d'être compensé par l'augmentation de prix que produirait la vente des autres.

L'époque à laquelle *les coupes de nettoitement* doivent se faire ne peut être précisée; c'est l'inspection des lieux qui seule doit en décider. Dès que les essences parasites gênent, il faut les faire disparaître; si elles se reproduisent et gênent encore, le nettoitement doit se répéter; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin l'essence que l'on veut propager ait entièrement pris le dessus (1).

466. Lorsque la jeune forêt se trouve débarrassée des bois tendres, et que, par suite de la lutte d'accroissement dans laquelle les jeunes plants sont en-

---

(1) Il n'est pas toujours bon de supprimer à la fois tous les bois blancs qui se sont logés parmi les bonnes essences. Quand le repeuplement n'a pas également bien réussi dans toutes les parties de la coupe, il devient nécessaire, dans les places incomplètement garnies, d'appuyer les tiges d'élite qui, seules, ne sauraient se soutenir et couvrir le sol. Mais, comme il importe en même temps que ces tiges ne puissent pas être dominées par les voisins qu'on leur aura conservés, on fera étêter, parmi ces derniers, ceux qui pourraient devenir nuisibles, de manière à les réduire sûrement au rôle d'auxiliaires qu'on leur destine. Aussitôt que les bonnes essences seront suffisamment fortifiées pour former massif, les bois blancs devront être extraits.

gagés, elle passe de l'état de fourré à celui de gaulis, le moment est venu d'aider la nature dans la suppression des bois dominés. Les coupes à faire dans ce but ont été nommées *éclaircies périodiques*, parce qu'on les renouvelle à des époques fixes. Pour en comprendre l'économie, il est nécessaire d'établir les trois points suivants :

1° Règles d'après lesquelles doivent être exécutées les éclaircies ;

2° Age auquel on doit entreprendre la première ;

3° Epoque auxquelles il convient de les répéter.

467. L'opération des éclaircies consiste à couper les tiges les plus faibles et les plus mal-venantes, celles qui sont surmontées ou près de l'être et dont la végétation est languissante, enfin, les rejets des bois tendres qui se seraient reproduits après les nettoie-ments. On peut en même temps couper quelques tiges bien-venantes dans les parties où le bois est trop épais, mais en y mettant une grande prudence. La principale règle à observer dans ce genre de coupe, c'est de laisser le bois dans un état convenablement serré, en un mot de ne jamais *interrompre le massif*. Dans un jeune bois qui jusqu'alors a crû dans un état très-serré les brins sont grêles et élancés, et ont le plus grand besoin d'appui. Une éclaircie imprudente les rendrait victimes des orages, les ferait courber sous la pression de la neige ou du givre, et même sous le poids de leur propre cime. L'état de massif est tellement indispensable, qu'il faudrait, s'il

en était besoin, conserver même des perches malvenantes et des bois tendres qui, dans ce cas, feraient office de tuteurs, et subsisteraient jusqu'à la prochaine éclaircie. Il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs, que les jeunes arbres doivent s'élancer et atteindre la hauteur dont ils sont susceptibles, ce qui ne saurait avoir lieu s'ils ne croissent en massif. Dans un bois plus âgé, les inconvénients d'une éclaircie trop forte ne seraient pas moins graves. Il en résulterait, en effet, que le sol se desséchait et se durcirait à la surface, ce qui est défavorable à la végétation ; ou qu'il se couvrirait de gazon et de plantes huisibles, qui absorberaient en pure perte les richesses d'humus que la futaie y a déposées ; ou bien, enfin, s'il se présentait une année de semence, on verrait naître un jeune repeuplement qui, dans certains cas, ne serait pas moins gênant, la forêt n'ayant point encore atteint son exploitabilité.

L'éclaircie, telle qu'elle vient d'être expliquée, est l'*éclaircie normale ou moyenne*, c'est-à-dire, celle qui, dans la plupart des cas, satisfait au but que l'on se propose, tout en évitant les inconvénients qu'elle pourrait entraîner. Toutefois, de même que dans les coupes de régénération [464], le nombre des tiges à conserver dans les éclaircies périodiques doit varier suivant l'exposition, le sol, et aussi suivant l'essence. Ainsi, dans un terrain de bonne qualité, exposé au Nord ou à l'Est, ou situé en plaine, une jeune forêt, dont l'essence fournit un couvert épais, peut être

éclaircie avec avantage jusqu'au point de *desserrer son massif sans l'interrompre*, pourvu toutefois que, dans la localité, les dégâts météoriques ne soient point à redouter. Ce résultat s'obtient par l'extraction d'abord de tous les sujets dominés et, en outre, parmi les dominants, des brins les plus grêles, ayant la cime étriquée, et qui empêchent les tiges d'élite de développer leurs têtes circulairement. Une telle éclaircie est dite *forte* ; elle favorise nécessairement au plus haut degré l'accroissement des bois, en leur procurant le plus d'espace possible pour étendre à la fois leurs racines et leurs branches. Mais, lorsque, au contraire, les conditions de sol, d'exposition et de situation sont défavorables, l'éclaircie doit être *faible*, c'est-à-dire qu'elle doit se borner à supprimer les tiges mortes en cime ou tout à fait dépérissantes, conservant de la sorte non-seulement toutes les dominantes sans exception, mais encore une partie de celles qui sont surmontées. Cette opération, on le conçoit, a surtout en vue d'assurer au sol une formation abondante de terreau, de le garantir des ardeurs du soleil et de mettre les bois en état de résister aux météores nuisibles (vents, neige, givre, etc.). Elle sera d'une application générale en approchant de la lisière de la forêt, ou de tout autre partie très-exposée aux vents, afin de prévenir la dispersion du lit de feuilles si essentiel à la végétation, surtout des jeunes bois.

468. L'âge auquel il convient d'entreprendre la

première éclaircie ne peut être fixé d'une manière absolue ; il dépend de la rapidité de l'accroissement sur lequel influent l'essence, le sol et le climat.

Le principe que l'éclaircie devient utile aussitôt que le bois passe à l'état de *gaulis*, est incontestable. Seulement, lorsque des accidents météoriques sont à redouter, il ne faut la faire que *faible*. Dans les forêts soumises au régime forestier (1), on hésitait autrefois à entreprendre des éclaircies dans les *gaulis*, parce que le personnel administratif auquel elles pouvaient être confiées n'était ni assez nombreux ni assez généralement instruit pour les diriger avec tout le soin et l'intelligence nécessaires. On conseillait, par suite, de n'entreprendre la première éclaircie que quand le bois a atteint la qualité de *perchis*, les tiges à enlever étant alors plus faciles à distinguer, les produits qu'on en retire plus avantageux, et les fautes que l'on pourrait commettre moins dangereuses. Mais, désormais, ces circonstances ont cessé d'exister dans presque tous les services forestiers. De saines notions de sylviculture sont aujourd'hui répandues parmi les fonctionnaires des forêts, à tous les degrés de la hiérarchie ; le nombre de ces fonctionnaires a été successivement augmenté et, dans son zèle éclairé pour l'amélioration de la production forestière, l'Administration supérieure a su donner,

---

(1) Ce sont celles que régit l'Administration publique.

en peu d'années, à ces importantes opérations une impulsion qui l'honore à un haut degré (1). On peut donc affirmer que, dès à présent, il n'existe plus d'obstacles sérieux, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels, à ce que les règles de la science forestière reçoivent leur entière application, en ce qui concerne les éclaircies périodiques, dans les forêts administrées par l'Etat.

469. Quant aux époques auxquelles les éclaircies doivent se répéter, elles dépendent également des conditions de la végétation. Lorsque les bois croissent très-promptement, il peut être utile de les éclaircir tous les cinq ans, du moins dans leur jeunesse, sauf plus tard à laisser s'écouler un intervalle plus considérable. Quand la croissance est moins active, une éclaircie faite de dix en dix ans dans la jeunesse, et tous les vingt ans à un âge plus avancé, sera suffisante. Entre la dernière éclaircie et la coupe d'ensemencement qui doit lui succéder, il convient de laisser un intervalle de vingt ou au moins de quinze

---

(1) C'est surtout en autorisant et encourageant les exploitations dites *par économie* que l'Administration a assuré l'application en grand des éclaircies périodiques dans les forêts qui lui sont confiées. Ce mode, comme on sait, consiste à faire abattre et façonner les bois, non plus par des adjudicataires qui les ont achetés sur pied après désignation préalable, mais par des ouvriers employés, soit à la journée, soit à la tâche, sous la direction spéciale des agents et préposés forestiers, après quoi seulement les produits de l'exploitation sont livrés à la consommation.



années, afin que les bois puissent profiter du bienfait de cette opération avant d'être abattus.

470. Les avantages qui résultent des éclaircies sont de la plus grande importance. Elles procurent une augmentation considérable dans les produits, car tous ces pieds d'arbres, qui naturellement auraient péri en forêt, tournent entièrement au profit de la consommation et au bénéfice du propriétaire. Les brins, faibles à la vérité, que l'on coupe dès la première éclaircie donnent du chauffage, du charbon, et peuvent même servir à différents autres usages, ce qui les rend toujours précieux dans les pays où le bois a de la valeur. Dans les éclaircies subséquentes, à mesure qu'elles sont assises dans des parties plus âgées, on obtient des bois de travail et de service d'un très-grand intérêt. Tous ces produits, malgré leur importance, ne sont cependant qu'accessoires, et loin de diminuer le produit principal (celui des coupes de régénération), ils tendent à l'augmenter. En effet, lorsque les arbres sont trop serrés entre eux, lorsque leurs cimes se pressent et que leurs racines sont entrelacées, ils ne s'assimilent qu'une faible portion des substances qui leur sont nécessaires, et faute d'espace pour développer leurs organes de nutrition (racines et feuilles), ils s'étioient et contractent des tares souvent cachées, qui d'abord ralentissent leur croissance, et plus tard, entraînent prématurément le dépérissement et même la mort. Mais, quand, en temps utile, on a diminué leur

nombre, les pieds restants prospèrent, s'élancent et grossissent, pour ainsi dire, à vue d'œil.

Les éclaircies favorisent l'accès du soleil, et permettent à l'air de circuler plus librement dans les massifs de forêts, ce qui contribue à donner aux fibres du bois la force et la souplesse exigées pour les différents emplois. On a reproché autrefois aux futaies de fournir un bois tendre, bien inférieur à celui des arbres crus isolément; ce défaut disparaît par suite des éclaircies périodiques qui font participer les arbres aux influences de l'atmosphère et leur procure le degré de solidité convenable.

Enfin, les éclaircies débarrassent les forêts d'une quantité de bois qui, par leur pourriture, auraient favorisé la multiplication de plusieurs insectes, particulièrement de quelques *coléoptères* qui se logent entre l'écorce et l'aubier, ainsi que dans l'intérieur du bois, et qui, dans les forêts résineuses surtout, étendent souvent leurs ravages de la manière la plus désastreuse.

#### ARTICLE IV.

Fixation de l'exploitabilité et de la possibilité dans les futaies.

471. L'exploitabilité d'une futaie ne peut être fixée ni avant le temps où les arbres commencent à porter abondamment de bonnes semences, ni après celui où ils cesseraient d'être propres à la production

d'un repeuplement complet. Du reste, cet objet doit se régler conformément aux principes que nous avons développés dans le second Livre [406, 411 et 414.].

472. Quant à la possibilité, elle doit être basée sur le volume, attendu que la diversité des coupes dont il peut être utile de la composer, ne saurait admettre des exploitations à contenances égales, ainsi qu'on le verra dans l'article suivant.

#### ARTICLE V.

Marche des exploitations dans une futaie régulière.

473. Pour prendre une idée complète de la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies, il convient de considérer la marche des exploitations dans une futaie régulière où cette méthode reçoit son application. Cet examen sera surtout utile en ce qu'il montrera, dans son ensemble, la futaie à l'état *normal*, état auquel l'art du forestier doit chercher à les ramener toutes.

Soit une telle forêt soumise à une révolution de cent ans, divisée en cinq périodes de vingt ans, à chacune desquelles soit affectée une étendue déterminée [425]; on aura dans les bois de chaque affectation, en se supposant placé au commencement de la révolution, les gradations d'âge suivantes :

Dans l'affect. de la 1<sup>re</sup> pér., les bois de 100 à 81 ans.

—	2°	—	80	61
—	3°	—	60	41
—	4°	—	40	21
—	5°	—	20	et au-dessous

Dans l'examen qui nous occupe, nous considérons les exploitations telles qu'elles devront avoir lieu pendant la première période : d'abord les coupes de régénération à asseoir dans l'affectation de cette période, et qui fourniront les *produits principaux*; puis les coupes d'amélioration qui doivent parcourir les autres affectations et dont les produits ne sont qu'*accessoires*. Ce que nous dirons de la marche de ces exploitations pendant la première période s'appliquera aussi aux périodes suivantes, la forêt demeurant dans les mêmes conditions.

474. Au début, les coupes de régénération à entreprendre ne consistent évidemment qu'en coupes d'ensemencement, qui peuvent se succéder de proche en proche dans un ordre parfait. Ce n'est que quand les jeunes repeuplements se présentent, que cette régularité devient impossible, parce qu'alors l'assiette et la nature des exploitations ne peuvent plus être déterminées que suivant les progrès des jeunes bois. Dès ce moment, c'est au forestier à apprécier chaque année, d'après l'état des sous-bois ou d'après les apparences de réussite des graines, quelles sont les coupes qu'il convient d'effectuer.

Que, par exemple, il constate sur un point l'urgence de la coupe définitive, et que, sur un autre, il trouve la coupe secondaire non moins nécessaire, il y aura lieu de les effectuer toutes deux immédiatement; et si les produits de ces deux coupes sont insuffisants pour parfaire la possibilité, il faudra asseoir encore une coupe d'ensemencement sur un troisième point.

Telle est la marche que doivent suivre les coupes de régénération; si on voulait leur en imprimer une plus régulière on s'exposerait à mal seconder la nature, et l'on pourrait dès lors se priver d'une grande partie des avantages que doit procurer la méthode du réensemencement naturel.

475. On a souvent tenté d'établir la possibilité de ces exploitations par contenance; mais il est facile de prouver que, pour assurer au forestier la latitude dont il a besoin, la possibilité fondée sur le volume est seule convenable.

Supposons, en effet, que l'on veuille adopter la possibilité par étendue, on pourra bien, à la vérité, ne point rencontrer d'obstacle pendant les premières années de la période, attendu que, n'ayant à faire alors que des coupes d'ensemencement dont les arbres doivent être espacés à peu près partout de même, il est dans les choses possibles que, sur d'égales surfaces, les produits matériels seront approximativement égaux. Mais, dès que les coupes secondaires et définitives deviendront nécessaires, il n'en

sera plus ainsi, parce que, dans ces coupes, le nombre des arbres à abattre varie selon les sols, les situations, les expositions, et surtout selon l'état des jeunes bois, ce qui fait varier, par conséquent, les produits qu'elles fournissent sur une étendue déterminée (1).

Si, au contraire, on base la possibilité sur le volume, on sera parfaitement libre d'effectuer et d'asseoir les coupes selon les indications de la nature, et d'en resserrer ou d'en étendre la contenance, tout en leur assignant cependant une limite commune, invariable et parfaitement rationnelle.

476. Les considérations d'après lesquelles doit se régler la marche des coupes d'amélioration étant différentes, la base de la possibilité relative à ces coupes ne doit plus être la même.

Ces coupes, en effet, n'ont point pour objet principal de procurer des produits, comme les coupes de régénération; elles sont entreprises surtout dans la vue d'accélérer la croissance des arbres destinés à parvenir au terme de la révolution, et de leur assurer les plus belles dimensions et les qualités les plus précieuses. L'égalité des produits dans ces opérations n'est donc que secondaire; pour qu'elles répondent complètement à leur but, il importe que les coupes de nettoyage et les éclaircies du premier âge puis-

---

(1) Voir l'appendice.

sent s'exécuter dès l'instant où elles sont jugées nécessaires ; et, quant aux éclaircies suivantes, il est plutôt à désirer qu'elles se renouvellent à des époques fixes. Il serait donc convenable d'imprimer à celles-ci la marche la plus régulière possible, et, au contraire, pour les autres, de laisser le forestier entièrement libre de les faire quand et comme il le jugera à propos.

Or, pour établir dans une exploitation une marche parfaitement régulière, le meilleur moyen, incontestablement, est de prendre pour base la possibilité par contenance, et c'est, par conséquent, celle qu'il convient d'adopter pour les éclaircies périodiques, d'autant plus que rien ne s'y oppose dans la nature de ces opérations.

477. En admettant ces règles, on aura à faire annuellement, dans la futaie normale proposée pour exemple, trois genres distincts de coupes, savoir :

1° *Dans l'affectation de la première période*, coupes de régénération, basées sur la possibilité par volume ;

2° *Dans les affectations de la 2°, de la 3° et de la 4° période*, éclaircies périodiques par contenances égales ;

3° *Dans l'affectation de la 5° période*, nettoyage de bois blancs et premières éclaircies à exécuter ou à négliger, selon l'état du bois, et sans s'astreindre à aucune possibilité.

## ARTICLE VI.

Abatage, façonnage et vidange dans les futaies.

478. La saison la plus favorable pour l'abatage des bois dans les futaies paraît être la fin de l'automne et l'hiver ; toutefois on devra suspendre les travaux pendant le moment des grands froids, où les bois éclatent et se rompent facilement dans leur chute. Dans les climats tempérés, c'est ordinairement au 15 octobre que l'on fixe le commencement de l'abatage ; dans les climats plus froids, on peut commencer dès la mi-septembre, parce que la végétation s'arrête plus tôt ; et dans les pays chauds, la raison contraire pourra faire différer la coupe.

Pour les essences feuillues, il est à peu près généralement reconnu que les bois coupés dans la saison morte sont d'une plus longue durée lorsqu'ils sont mis en œuvre, et il semble certain aussi qu'employés au chauffage, ils brûlent plus facilement et donnent même plus de chaleur que ceux qui ont été abattus dans le temps de la végétation.

Quant aux essences résineuses, elles ne paraissent pas éprouver les mêmes inconvénients de la coupe en temps de sève. Il est au contraire assez habituel, dans les contrées que ces essences habitent, de les exploiter en été, et beaucoup de praticiens estimés sont d'avis qu'en prenant la précaution de les écor-



cer aussitôt après l'abatage, les bois gagnent même en dureté et en solidité, outre qu'ils deviennent plus légers, et par suite, d'un transport plus facile (1).

Mais eu égard à la vidange des bois, l'abatage en hiver est préférable, parce qu'il donne la facilité de transporter les bois avant le retour de la sève, ce qui est de la plus grande importance dans les coupes secondaires et dans les coupes définitives; attendu que dans le moment de l'ascension de la sève, comme par les grands froids, les jeunes bois sont plus cassants qu'aux autres époques de l'année.

479. Une mesure non moins essentielle à prendre dans l'exploitation des coupes secondaires et des coupes définitives, surtout lorsque le sous-bois a déjà quelque élévation, c'est de faire ébrancher les arbres jusqu'à la cime, avant l'abatage (2). En outre, on doit veiller à ce que les branchages soient immédiatement relevés, façonnés et sortis de la coupe; et ensuite à ce que l'arbre soit dirigé, dans sa chute, de manière à tomber du côté où il causera le moins de dommage.

Dans les pentes, c'est, en général, vers le sommet

---

(1) Voyez *Annales forestières*, 1<sup>er</sup> volume, page 50.

(2) Cet ébranchement doit, autant que possible, se faire en commençant par en bas; lorsqu'on procède en sens inverse, ce qui est plus facile pour l'ouvrier, les branches supérieures s'amoncellent souvent sur les inférieures, et quand ensuite on coupe celles-ci, leur chute cause des dégâts assez considérables.

de la montagne qu'il faudra chercher à faire tomber les bois.

Autant qu'on le peut, on doit interdire aux voitures l'entrée des coupes, et faire enlever à dos d'homme, ou par d'autres moyens peu nuisibles, les bois de chauffage et de travail. En montagne, les chemins à traîneaux et les lançoirs doivent, le plus possible, être pratiqués ; mais, dans les localités où ces appareils ne peuvent être employés, l'époque la plus propice pour la vidange est celle où la terre est couverte de neige, hors cependant le moment des trop grands froids.

Toutefois, les mesures de précaution que nous venons d'énumérer ne doivent pas être poussées trop loin ; leur exagération pourrait diminuer la valeur des bois, en augmentant plus que de raison le prix du façonnage et de la vidange. Ces mesures indiquent ce qu'il y a de mieux à faire pour ménager le sous-bois ; c'est à l'intelligence du forestier à les modifier selon les circonstances. Ainsi, dans les forêts situées en plaine, et peuplées d'essences feuillues, les coupes, lorsqu'elles ont lieu sur des repeuplements complets, n'exigent pas l'enlèvement à dos d'homme des bois coupés. Les jeunes brins peuvent bien être endommagés momentanément par le passage des voitures, mais ils se relèvent bienlôt, et le dommage, après un laps de temps assez court, ne s'aperçoit plus, si l'on a soin surtout de recéper immédiatement les tiges qui ont été brisées. Il n'en

est pas entièrement de même des essences résineuses ; elles demandent plus de soins, car, écrasé, le jeune brin se relève rarement ; cassé plus bas que le dernier verticille, il ne réussit presque jamais à former une nouvelle cime ; et les blessures de l'écorce, si elles pénètrent jusqu'à l'aubier, donnent lieu à des plaies chancreuses que l'arbre conserve en général pendant toute son existence.

## ARTICLE VII.

Essences propres à la futaie.

480. Toutes les essences peuvent être exploitées en futaie, en ce sens qu'elles possèdent toutes la propriété de se régénérer par la semence. Mais il n'y en a qu'un certain nombre auxquelles ce traitement puisse être appliqué avec avantage. Ce sont d'abord les essences résineuses, auxquelles, comme on le sait, tout autre mode de reproduction est refusé, et, parmi les feuillues, le *chêne*, le *hêtre*, le *châtaignier*, l'*orme*, le *frêne*, les *grands érables* (1), et exceptionnellement le *charme*, le *bouleau* et le *robinier*.

---

(1) Le sycomore et le plane.

---

## CHAPITRE DEUXIÈME.

---

### APPLICATION DE LA MÉTHODE

#### DU RÉENSEMENCEMENT NATUREL ET DES ÉCLAIRCIES.

---

##### ARTICLE PREMIER.

##### Exploitation du chêne en futaie.

481. **EXPLOITABILITÉ.** — Dans quelques forêts, les révolutions du chêne ont été portées jusqu'à 250 et même 300 ans. On ne saurait contester la possibilité d'une telle fixation dans un sol profond et substantiel, mais il est certain qu'en général on ne peut que perdre à reculer ainsi l'exploitation, et que les cas où de pareils termes doivent être admis, ne peuvent être considérés que comme des exceptions. En général, l'exploitabilité du chêne doit être fixée à l'époque où les bois ont acquis les dimensions et les qualités les plus convenables à tous les genres de construc-

tion et de travail. Le chêne, comme on sait, croît habituellement dans des terrains fertiles, substantiels, profonds et divisés, ou dans des sols assez compactes, argileux et froids. En lui laissant atteindre l'âge de 140 à 150 ans dans les sols fertiles et celui de 160 à 180 ans dans les terrains où sa croissance est plus lente, on obtiendra de cet arbre tout ce que l'on peut en attendre, sans avoir à redouter qu'un plus ou moins grand nombre de tiges soient atteintes par la pourriture, la cadranure, ou la grisette, défauts qui deviennent fréquents à un âge avancé. Que si enfin, on avait à élever une futaie de chêne dans un sol peu profond ou peu substantiel, il pourrait être convenable de réduire sa révolution même jusqu'à 120 ans.

482. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — La coupe d'ensemencement, dans une futaie de chêne, doit être *sombre*, afin d'assurer le repeuplement complet du terrain qui ne saurait avoir lieu si les arbres étaient trop espacés, attendu le poids du gland. Cet état sombre a encore pour but d'éviter qu'avant la chute des semences, le terrain se gazonne et se couvre de plantes nuisibles, et de conserver le lit de feuilles sèches qui, tout en ajoutant à la fertilité du sol, préserve les glands tombés de la gelée et favorise leur germination.

Malgré cette précaution, c'est chose fort ordinaire de voir, dans les coupes sombres, le terrain se gazonner ou se tasser au point de devenir impropre à

la reprise du gland, lorsqu'il se passe plusieurs années sans glandée; car les chênes, surtout quand ils ont crû en massif, ne donnent qu'un faible couvert. Dans ce cas, il convient, dès que la glandée a lieu, de faire remuer le terrain, soit à la houe, soit par l'introduction des porcs afin de le mettre en état d'assurer la germination des semences (1).

---

(1) Dans plusieurs parties de la France, notamment dans le Nord et dans l'Est, et aussi dans quelques régions montagneuses du Midi et du Centre, où les glandées ne se voient qu'à d'assez longs intervalles [71], les difficultés qu'éprouve la réussite du repeuplement naturel dans les coupes sombres ont rebulé certains forestiers au point de leur avoir suscité l'idée que le chêne ne pouvait se régénérer sûrement que par le semis artificiel ou la plantation, l'une ou l'autre succédant immédiatement à la coupe à blanc étoc des massifs de futaie. — C'est le retour à l'enfance de l'art — Sans nous autoriser des nombreux et magnifiques exemples de régénération naturelle que présentent les futaies de chêne de la France dans toutes les régions où les glandées sont tant soit peu fréquentes, et sans parler des dépenses considérables qu'exigerait l'emploi du mode dont il s'agit, s'il devait se pratiquer sur une grande échelle, il nous suffira de faire remarquer que dans beaucoup de localités, — par exemple dans les sols légers, siliceux ou calcaires, dans les versants un peu rapides ou aux expositions chaudes, — il y aurait la plupart du temps de sérieux inconvénients, parfois même du danger, à déboiser complètement le terrain et à le laisser, pendant quelques années au moins, exposé à l'influence directe des météores. Non-seulement tout le terreau qui s'était formé à la surface du sol sous le couvert salutaire de la futaie est dans ce cas desséché par le soleil et lavé par les eaux, mais souvent la terre végétale elle-même est entraînée des plateaux et des pentes dans le fond des vallées.

Heureusement rien, dans la culture des futaies de chêne, n'oblige à courir de pareils risques. — Tout en continuant à pratiquer la méthode

Le jeune plant du chêne ne demandant et ne supportant même que très-peu d'abri, il faut se hâter, une fois l'ensemencement produit, de procéder à la coupe secondaire. Elle doit se faire dans l'hiver qui succède à celui de la glandée, ou, au plus tard, vers la fin de l'année suivante. Si l'on attendait plusieurs années, on risquerait de voir périr les jeunes chênes sous le couvert de la coupe sombre (1).

---

du réensemencement naturel dans ce qu'elle a d'excellent et de supérieur, le forestier prudent saura en modifier l'application, en faisant intervenir le repeuplement artificiel partout où les circonstances locales l'exigeront, c'est-à-dire, toutes les fois que soit la trop grande rareté des années de glandée, soit l'état du sol à la surface, feront prévoir pour la réussite du repeuplement naturel, des retards qui seraient de nature à embarrasser la marche des exploitations et à préjudicier à la production.

Se souvenant que, pour élever le chêne à de fortes dimensions, il est très-avantageux de lui adjoindre en mélange certaines essences subordonnées [487], telles que le hêtre et le charme par exemple, il favorisera l'introduction spontanée de celles-ci, y aidera même artificiellement au besoin, et diminuera ainsi, à la fois, et les difficultés et les frais inhérents à la conservation de l'essence principale.

(1) Cet inconvénient est très-fréquent et contribue beaucoup à augmenter les difficultés que rencontre la régénération naturelle du chêne. En effet, si les glandées complètes sont rares, les tiers ou les quarts de glandées se voient assez souvent et produisent des jeunes plants en bon nombre, mais qui, cependant, ne se rencontrent qu'épars dans la coupe et ne sauraient former, plus tard, un fourré tel qu'on voudrait l'obtenir pour effectuer en toute sécurité la coupe secondaire et la coupe définitive. En présence d'un pareil repeuplement partiel on hésite donc, la plupart du temps à toucher à la réserve de la coupe sombre ; on espère que dans les années les plus prochaines le semis naturel se complètera ; — bref, on attend afin de ne rien compromettre, et — précisément on compro-

On doit, par le même motif, ne pas retarder la coupe définitive ; on y procédera, au plus tard, dans la quatrième année après celle de l'ensemencement.

Comme le chêne est un arbre extrêmement précieux, et qu'il faut, pour certaines constructions, surtout pour les constructions navales, des pièces de très-fortes dimensions, il est à conseiller de faire quelques réserves lors de la coupe définitive (1). En les plaçant, comme nous l'avons dit plus haut, sur les bords des chemins et sur les lisières de la forêt, leurs branches auront plus de latitude pour s'étendre, et pourront ainsi former les courbes recherchées pour la marine. Dans les terrains substantiels et profonds, la longévité de l'essence permettra faci-

---

met tout, car en même temps que les jeunes chêneaux périssent sous le couvert, celui-ci augmente d'intensité par l'extension graduelle des cimes des arbres et rend ainsi d'autant plus imminent le retour du même dommage.

Mieux eût valu, — neuf fois sur dix, — faire immédiatement coupe secondaire aussitôt après avoir obtenu les résultats de la glandée partielle. Ce qui peut arriver de pis d'une telle opération, — prématurée en principe nous le reconnaissons, — c'est de permettre l'envahissement de bois blancs qui étoufferaient les jeunes chênes. Mais rien n'est plus facile que de prévenir une telle conséquence. Quelques ouvriers soigneux placés à propos dans la coupe, la débarrasseront en peu de jours des essences parasites et la mettront en état de recevoir fructueusement les compléments naturels ou artificiels nécessaires au premier repeuplement en chêne pour tapisser entièrement le sol, et pour permettre ainsi de passer à la coupe définitive.

(1) De 5 à 10 par hectare, selon les besoins de la consommation.



lement aux réserves de cette nature de parcourir une seconde révolution, surtout si, comme on doit le supposer, elles ne sont choisies que parmi les tiges parfaitement bien-venantes.

Il arrive presque toujours que les chênes réservés et isolés après l'exploitation des coupes (les pédonculés surtout), se garnissent de menues branches au pied et le long de la tige. La cime dans ce cas, est moins bien nourrie, et lorsque le fonds de terre n'est pas d'une très-bonne qualité, cette cime se couronne, ce qui entraîne le dépérissement insensible de l'arbre.

Il est essentiel de débarrasser les chênes de ces branches gourmandes, et de renouveler cet émon-dage jusqu'à ce que la jeune forêt se soit assez élevée pour entourer l'arbre et empêcher les productions de sa tige et de son pied.

Ces branches, quand on les laisse subsister, nuisent considérablement à la croissance du sous-bois, diminuent la qualité des arbres pour la charpente et la fente, en les rendant noueux (1), et ralentissent même l'accroissement des grosses branches, qui seules peuvent former les courbes employées à la construction des vaisseaux.

En même temps qu'on s'occupera de supprimer les branches gourmandes des réserves, il sera très-

---

(1) Buffon a prouvé, par des expériences que les bois noueux sont d'un quart plus faibles que les autres, sous la charge.

utile d'explorer attentivement leur cime afin d'y découvrir les branches sèches qui, même sur les chênes bien venants, se forment assez souvent à l'intérieur de la ramure quand l'arbre passe de l'état de massif à l'isolement.

Le retranchement de ces parties mortes soigneusement exécuté, avec un instrument bien tranchant et en donnant à la section une inclinaison qui assure le prompt écoulement des eaux pluviales, prévient la formation des grisettes et des nœuds gâtés qui affectent trop souvent les plus belles pièces et les rendent impropres aux emplois d'élite pour lesquels, saines, elles eussent été infiniment précieuses soit par leur forme particulière, soit par leurs dimensions.

483. COUPES D'AMÉLIORATION. — La jeune forêt obtenue par le semis naturel devra être nettoyée des bois blancs et des morts-bois, et éclaircie périodiquement, conformément aux règles générales.

Comme il est très-essentiel que les chênes destinés aux constructions et aux divers ouvrages de fente, acquièrent une tige droite et bien effilée, on fera bien, dans les deux premières éclaircies, de serrer le massif un peu plus qu'à l'ordinaire. Cette précaution sera d'autant plus nécessaire, que les chênes ont, comme nous venons de le dire, une disposition marquée à se garnir de branches gourmandes le long du tronc, dès que cette partie se trouve frappée trop immédiatement par la lumière. Ce n'est que lorsque les arbres auront atteint à peu près la hauteur dont

ils sont susceptibles, qu'il devient utile de les espacer davantage, afin de favoriser leur grossissement et de procurer à leur bois, essentiellement employé à la charpente, une texture plus solide.

A la suite de ces éclaircies plus fortes, il arrive fréquemment, attendu le couvert léger du chêne, que le sol se tapisse d'essences étrangères, telles que charmes, bouleaux, alisiers, bois blancs, etc., qui continuent, quoique rabougris, à végéter sous la jeune futaie. Cette végétation traînante n'offre point d'inconvénients, au contraire. Elle s'oppose à l'enlèvement du lit de feuilles par les vents, empêche le sol de se durcir et de se gazonner, le maintient frais par conséquent, et produit par ses propres détritiques plus de substance nutritive qu'elle n'en absorbe. Aussi, loin de la supprimer, comme on croyait devoir le faire autrefois, faut-il la laisser subsister jusqu'au moment d'entreprendre la coupe d'ensemencement (Voir la note page 248).

#### ARTICLE II.

##### Exploitation du hêtre en futaie.

**484. EXPLOITABILITÉ.** — L'époque la plus convenable pour l'exploitation d'une futaie de hêtre tombe entre 80 et 140 ans. Le plus ordinairement, on choisit l'âge de 120 ans, à moins que la forêt ne soit située dans un terrain très-riche et dans un climat

très-doux. Dans ce cas, les bois acquièrent plus tôt les dimensions utiles, et comme, d'un autre côté, ils sont aussi plus exposés à se carier intérieurement (1), il est prudent de réduire la révolution à 100 et même 90 ans.

Un sol maigre et superficiel qui abrège la vie végétative, doit nécessairement aussi faire abréger la révolution.

485. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — La coupe d'ensemencement doit présenter une réserve nombreuse, composée des arbres les plus forts et les plus sains. L'état sombre de cette coupe est doublement nécessaire dans une futaie de hêtre : d'abord à cause de la semence qui, comme le gland, est lourde, et en second lieu, parce que le jeune plant est très-délicat et a besoin d'être protégé par un couvert épais.

Il ne faudrait pas, toutefois, conclure de là que sous un massif complet le repeuplement réussirait. La faine à la vérité y germerait et les jeunes plants lèveraient, mais pour disparaître dès la 2<sup>e</sup> ou la 3<sup>e</sup> année au plus tard, faute de lumière [456]. Aussi lorsque, après la coupe sombre, la fainée se fait trop longtemps attendre et que le massif s'est reformé par

---

(1) Les essences les plus exposées à la carie intérieure, dans les sols substantiels, paraissent être celles dont le couvert très-épais maintient une grande fraîcheur et fournit un terreau abondant.

suite du développement des cimes des réserves, il devient nécessaire de remédier à cet état de choses par quelques nouvelles extractions d'arbres, auxquelles il est bon néanmoins de ne procéder que peu avant l'époque présumée de la prochaine fâinée.

La coupe d'ensemencement doit rester intacte jusqu'à ce qu'elle soit complètement ensemencée, et jusqu'à ce que l'on juge que les plants ont acquis un peu de force. Il faut, à cet effet, leur laisser atteindre de 22 à 33 centimètres de hauteur, à peu près ; c'est alors seulement qu'il est temps de procéder à la coupe secondaire. Cette opération doit être faite avec beaucoup de précaution. Dans les sols et aux expositions favorables, elle pourra supprimer à peu près la moitié du couvert ; mais si le terrain était sec et l'exposition chaude, il faudrait n'enlever que très-peu d'arbres dans une même année, et revenir ainsi à plusieurs reprises, afin d'habituer insensiblement le jeune hêtre aux influences atmosphériques [464].

Lorsque, à l'aide d'une ou de plusieurs coupes secondaires, le sous-bois est parvenu à une hauteur moyenne de 50 à 66 centimètres, et même jusqu'à un mètre, le moment est arrivé de faire la coupe définitive. En général, il n'est d'aucune utilité, lors de cette coupe, de réserver quelques arbres pour parcourir une seconde révolution, le hêtre n'étant point employé à la charpente, et pouvant à l'âge de 90, 100 et 120 ans, convenir à tous les usages auxquels il est propre.

**486. COUPES D'AMÉLIORATION.** — Les nettoiemens de bois blancs, ainsi que les éclaircies périodiques, devront s'exécuter entièrement d'après les règles générales données à cet égard, en observant toutefois que le hêtre supporte, plus que le chêne, de croître en massif serré et qu'un sol riche en humus lui convient particulièrement.

### ARTICLE III.

Exploitation d'une futaie mélangée de chêne et de hêtre.

**487.** Les racines du hêtre sont traçantes, celles du chêne, au contraire, s'enfoncent profondément. Le premier pompe les sucs de la terre plus près de la surface, le second va les puiser dans le fond du sol. Il en résulte que l'un et l'autre, lorsqu'ils croissent en mélange, trouvent, sans se gêner réciproquement, une nourriture abondante ; et l'on remarque généralement, dans ces sortes de forêts, un accroissement plus prompt que lorsque le chêne en est l'essence unique. Une autre cause du meilleur accroissement d'un pareil mélange, c'est que le hêtre, par son feuillage épais, conserve au sol plus de fraîcheur, et l'enrichit d'une couche plus abondante de terreau que ne ferait le chêne seul. Cette salutaire influence se fait surtout remarquer dans les sols légers, siliceux ou calcaires, médiocrement profonds, et elle devient

particulièrement précieuse lorsqu'il s'agit d'élever des pièces de chêne de forte dimension (1).

488. EXPLOITABILITÉ. — Comme le chêne est des deux essences la plus précieuse, il convient, s'il est dominant ou s'il forme seulement moitié ou les deux cinquièmes du peuplement, d'adopter la révolution qui lui est propre, et d'y subordonner celle du hêtre. Celui-ci, comme on le sait, peut sans inconvénient rester sur pied jusqu'à 150 et 160 ans, lorsque le sol lui est favorable.

Ce n'est que dans le cas où le mélange du chêne serait très-faible, que l'on fixerait la révolution à 120 ou à 140 ans, sauf à réserver dans les coupes définitives un certain nombre de chênes pour croître jusqu'à la prochaine exploitation.

489. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — Les règles données, dans les deux articles précédents, pour espacer la coupe d'ensemencement, devront être suivies en observant néanmoins que, comme le chêne est l'essence la plus précieuse, il importe, avant tout, d'assurer sa reproduction par une nombreuse ré-

---

(1) La vaste forêt du Spessart (Bavière-Rhénane) offre un exemple remarquable des avantages que présente le mélange dont il s'agit. Située dans un climat assez rude, sur le grès bigarré, elle produit des chênes de la plus belle venue et d'un âge très-avancé, au moyen d'un mode particulier de traitement qui consiste principalement à éclaircir très-fortement les massifs de chêne dès qu'ils sont parvenus à la moitié de l'âge qu'ils doivent atteindre (200 ans en moyenne), et à y introduire artificiellement le hêtre, qui croît ainsi, *en second étage*, sous le couvert léger des chênes, et s'y maintient en bon état jusqu'à l'exploitabilité de ceux-ci.

serve. Par la même raison, on devra se hâter de procéder à la coupe secondaire aussitôt après l'ensemencement, quel que puisse d'ailleurs en être l'inconvénient pour le jeune hêtre. De fait, cet inconvénient est bien souvent moins grand qu'on ne pourrait le craindre, parce qu'en raison du poids des graines, les repeuplements de chaque essence existent, par taches, autour des arbres qui les ont produits; on trouve donc moyen de donner du jour aux jeunes chênes tout en conservant le couvert aux hêtres. D'un autre côté, les jeunes chênes eux-mêmes qui, dans les premières années, ont ordinairement une croissance plus rapide que les jeunes hêtres, peuvent quelquefois offrir à ceux-ci un utile abri (1).

La coupe définitive devra aussi se faire à l'époque qui paraîtra la plus convenable, pour assurer la bonne végétation du chêne.

Souvent, malgré les précautions avec lesquelles on conduit les coupes de régénération, il arrive que le hêtre empiète sur le chêne dans les repeuplements et qu'il s'empare du terrain. Ordinairement cette circonstance se présente à la suite d'une année qui, dans la localité, a été favorable à la réussite de la faine, alors que le gland y a manqué entièrement ou en grande partie; elle tient encore à ce que les

---

(1) Dans certains terrains, notamment dans les grès, les deux essences croissent souvent en rapport inverse. Dans ce cas, il faut rabattre le hêtre, sans hésiter, afin de protéger la végétation du chêne. (Note de M. Parade.)



faînées partielles donnent lieu à des semis naturels qui persistent sous le couvert et envahissent ainsi peu à peu le terrain, tandis qu'il n'en n'est pas de même du chêne qui périt sous la futaie au bout de quelques années [72]. Pour remédier à cet inconvénient, et rétablir le mélange, il faut recourir à des moyens artificiels. Ces moyens consistent à se procurer, dans d'autres parties de la forêt où les chênes peuvent avoir été plus fertiles (1), les glands nécessaires pour repiquer les petites places non garnies, et à en répandre, en général, dans toute la coupe. Si cette opération ne pouvait se faire l'année même de la faînée à cause d'un manque absolu de glands, elle pourrait se remettre à l'année suivante; mais s'il fallait laisser passer ainsi plusieurs années, on ferait mieux alors de se procurer de jeunes chênes de 3 à 4 ans, que l'on planterait parmi les hêtres, en les recépant au moment de la plantation, afin d'activer leur croissance et de les élever par là tout de suite au niveau des jeunes hêtres.

490. COUPES D'AMÉLIORATION. — Les nettoiemens et les éclaircies périodiques doivent se faire comme dans les forêts où le chêne est l'essence unique. On peut, au moyen des éclaircies, augmenter facilement le nombre relatif des chênes, en prenant toujours de préférence les pieds à supprimer parmi les hêtres;

---

(1) Les arbres placés sur les lisières des forêts ou sur le bord des routes, sont plus fertiles que ceux qui ont été dans l'intérieur des massifs.

mais, outre qu'il faut se garder de détruire le mélange, il est essentiel d'observer que, pour se servir de ce moyen, il faut que l'époque de l'éclaircie soit choisie très-à-propos, et l'opération même exécutée avec beaucoup d'intelligence, afin de ne pas faire couper des hêtres vigoureux pour favoriser peut-être des chênes d'une organisation déjà malade et incapables d'acquérir des dimensions et des qualités utiles.

## ARTICLE VI.

## Exploitation du châtaignier en futaie (1).

491. EXPLOITABILITÉ. — Les révolutions de 90, de 100 et de 120 ans, selon les sols et les climats, paraissent convenir au châtaignier. A cet âge, on obtiendra, en raison de la prompte végétation de l'essence, tous les bois nécessaires à la consommation, et l'on ne risquera pas de voir les arbres se creuser, ce qui arrive très-fréquemment au châtaignier lorsqu'il devient un peu vieux.

492. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — Sous ce rapport, le châtaignier pourra être entièrement traité comme le chêne; jeune, il est aussi robuste, et la châtaigne a plus de poids encore que le gland. Quelques arbres

---

(1) Le châtaignier ne se voit guère en futaie qu'associé au chêne et au hêtre. Il est notoire cependant qu'il croît très-bien sans mélange, et dès lors on doit admettre que les perfectionnements de la sylviculture amèneront la création de futaies de cette précieuse essence.

vent avoir une assiette bien solide, et que, sur les point les plus exposés, il serait peu prudent de leur donner tout à coup un espacement trop considérable. On pourrait craindre aussi que l'état trop clair de la coupe d'ensemencement ne provoquât le gazonnement du terrain et la crue d'autres plantes nuisibles. Toutefois cet inconvénient se présentera rarement, attendu que l'orme produit des graines en abondance, presque tous les ans, ou au moins de deux années l'une; on peut donc espérer le repeuplement immédiat de la coupe. Mais si, par extraordinaire, la crue des mauvaises herbes avait prévenu l'ensemencement, on ouvrirait dans la coupe des sillons, qui auraient le double avantage de préparer la terre à recevoir la semence et de faire naître une multitude de drageons.

Quant à la coupe secondaire, on devra y procéder, au plus tard, à la fin de la deuxième année qui suivra celle de l'ensemencement, et deux ans après on fera la coupe définitive. On pourrait même, dans un terrain frais, ou si l'exposition n'est pas chaude, supprimer entièrement la coupe secondaire, à cause du tempérament robuste du jeune plant, et, deux ou trois ans après l'ensemencement, passer immédiatement à la coupe définitive.

496. COUPES D'AMÉLIORATION. — Les nettoiemens et les éclaircies périodiques devront être dirigés d'après les règles générales; il y aura lieu de rapprocher les éclaircies, d'autant plus que l'orme a une

végétation très-rapide, et que, traçant et pivotant à la fois, il a besoin de plus d'espace pour prendre tout l'accroissement dont il est susceptible.

## ARTICLE VI.

Exploitation en futaie du frêne et des grands érables.

497. Les frênes et les grands érables peuvent, avec beaucoup d'avantage, être élevés en futaie, attendu que lorsqu'ils acquièrent de fortes dimensions et qu'ils sont de bonne fente, ils deviennent d'un très-grand prix pour la menuiserie, l'ébénisterie, la boissellerie, etc. D'ordinaire, ces essences se trouvent mélangées au hêtre avec lequel elles végètent parfaitement et dont elles supportent très-bien le régime, surtout lorsque la révolution ne dépasse pas 90 ou 100 ans. Il est nécessaire aussi, dans les coupes secondaires, de découvrir plus tôt les jeunes plants, moins délicats que ceux du hêtre, quoiqu'ils supportent et exigent même quelque ombrage dans les premières années.

## ARTICLE VII.

Exploitation du charme en futaie.

498. Le charme n'est point un bois qui, en raison des usages auxquels il est propre [193], mérite d'être élevé en futaie, mais on le considère comme pouvant

y être utilement mélangé à d'autres essences plus précieuses. C'est ainsi qu'on le trouve associé au hêtre, au chêne et au châtaignier; et quoiqu'il soit en général un peu dépassé par eux, il vient cependant assez bien pour pouvoir leur servir d'appui tant que cela est nécessaire, et jusqu'au moment où il devient possible de le faire disparaître successivement par les éclaircies périodiques. Mêlé au chêne, il produit des effets analogues à ceux du hêtre, en procurant au sol une couche de terreau plus abondante, et en y maintenant la fraîcheur par son couvert épais. Aussi le charme pourrait-il être très-utilement introduit, *en second étage* (voir la note page 256), dans les massifs de chêne pur, situés en fonds compacte, où il se plaît et réussit mieux que le hêtre.

## ARTICLE VIII.

## Exploitation du bouleau en futaie.

499. Le bouleau n'acquiert les qualités recherchées par les différents métiers qui l'emploient que vers l'âge de 50 à 60 ans, et il est d'ailleurs bien plus disposé à se reproduire de semence que de souche. On peut donc avec avantage l'élever en futaie, en fixant son exploitabilité à l'âge que nous venons d'indiquer.

Quant aux coupes de régénération, l'expérience prouve qu'en les mettant à blanc étoc, ou en laissant

seulement quelques réserves éparses, on obtient des repeuplements très-complets par les semences venant de la partie boisée voisine. La seule précaution à prendre, c'est d'entretenir le sol dans un état convenablement meuble, en lui donnant une légère culture à la houe, lorsqu'on s'aperçoit que l'année sera fertile en semences. Cette opération est indispensable ; car sous des bouleaux, même en massif, le sol se gazonne et se couvre d'arbustes et de morts-bois, à cause du feuillage trop léger de cet arbre.

Les éclaircies périodiques devront être très-rapprochées, le bouleau demandant assez d'espace pour croître.

## ARTICLE IX.

## Exploitation du robinier en futaie.

500. Le robinier, recherché comme bois de travail, est, de plus, employé avec avantage dans les constructions civiles et navales ; il existe, par conséquent, des motifs fondés pour le traiter en futaie. Il est à observer d'ailleurs que, quand cet arbre est isolé, sa cime est très-exposée à être brisée par les vents, et que souvent la rupture des branches principales fait éclater le tronc ; sa culture en massif de futaie, en donnant le moyen d'obvier à cet inconvénient si grave, offrirait donc un avantage de plus.

Quoique la végétation extrêmement rapide du

robinier ait fait penser qu'à 40 ans il pourrait être assez fort pour satisfaire à tous les besoins de la consommation, il est à conseiller cependant de ne fixer son exploitabilité qu'à 60 ou 70 ans. De cette manière, on obtiendra très-probablement des produits meilleurs et plus considérables ; et d'ailleurs il est à croire que sa végétation ne sera plus aussi rapide, venant en massif, que lorsqu'il se trouvait isolé.

Plus que l'orme encore, le robinier est disposé à drageonner, et sa semence, quoique non ailée, se dissémine au loin ; son jeune plant résiste aux chaleurs, il croît très-rapidement et ses racines exigent beaucoup d'espace ; le mode d'exploitation prescrit pour l'orme pourra donc lui être applicable.

#### ARTICLE X.

##### Exploitation d'une futaie de sapin.

501. EXPLOITABILITÉ. — L'exploitabilité du sapin tombe entre 100 et 140 ans ; 120 ans est le terme le plus ordinaire et celui qui, en général, procure les produits les plus utiles et les plus considérables. Dans les sols très-substantiels cependant, où la végétation est rapide et vigoureuse, la révolution de 100 ans peut être préférable, afin d'éviter la carie intérieure à laquelle, dans ces sortes de terrains, les sapins sont plus exposés encore que les hêtres [484]. Sur les grandes hauteurs, où la rigueur du climat ralentit la

croissance, le terme de l'exploitabilité peut être reculé jusqu'à 140 ans et au delà.

502. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — Ainsi que nous l'avons dit dans le second livre [432], il est très-important que les exploitations d'une sapinière soient dirigées du Nord et de l'Est vers le Sud et l'Ouest. Les coupes, d'ailleurs, doivent se faire à l'instar de celles des forêts de hêtre. Ces deux essences, qui semblent avoir peu d'analogie, se rencontrent néanmoins sur un point essentiel, celui du tempérament des jeunes plants.

Dans les deux premières années de son existence, le sapin reste très-petit et faible, et sa tige, de même que sa racine, s'allonge sans se ramifier. Pendant cette période, il réclame un couvert au moins aussi épais que celui qui convient au jeune hêtre; mais, après la troisième année, lorsqu'il a formé une et parfois deux branches latérales, il devient nécessaire de lui donner plus de lumière. Dès cette époque, donc, il y a lieu de supprimer quelques arbres dans la réserve (un quart environ) et de continuer ainsi, de deux en deux ou de trois en trois ans, jusqu'à la coupe définitive qui ne devra être faite que quand les brins auront atteint la hauteur de 66 centimètres à 1 mètre.

On rencontre assez souvent, dans les massifs de sapin que l'on soumet à la régénération, des reensemencements partiels qui remontent déjà à un assez grand nombre d'années, et végètent, languissants



et rabougris, sous la vieille futaie. C'est à tort que certains forestiers les considèrent comme impropres à reprendre de la vigueur. Aucune essence, si ce n'est le hêtre, ne résiste autant que le sapin sous un couvert prolongé, et n'a plus que lui la propriété de se raviver dès qu'on lui donne du jour. On commet donc une faute en supprimant ces bouquets au moment de la coupe d'ensemencement; il faut, au contraire, les conserver et, lors de cette coupe, éclaircir fortement la futaie qui les surmonte.

Il n'est pas sans intérêt de réserver, dans la coupe définitive, quelques beaux sapins pour parcourir une seconde révolution. Cet arbre peut parvenir à un âge très-avancé, et comme il sert beaucoup aux constructions, on obtiendra par ce moyen les pièces de forte dimension qui pourraient être nécessaires dans certains cas. Il est entendu que de pareilles réserves ne peuvent être faites que dans les parties les plus abritées contre la violence des vents.

503. COUPES D'AMÉLIORATION. — On se conformera sous ce rapport à ce qui a été recommandé dans les règles générales, en observant que le sapin demande à croître en massif très-serré, surtout dans sa jeunesse. Dans les climats tempérés, l'éclaircie *moyenne* pourra lui être appliquée, mais dans les localités où l'on aura à craindre les dégâts de la neige et du givre, auxquels les bois résineux sont plus exposés que les feuillus, on devra se contenter d'une éclaircie *faible*, afin que certaines tiges dominantes venant à être

écrasées, puissent, au besoin, être remplacées par celles qu'elles surmontent. Il n'est pas rare, en effet, de voir ces dernières, lorsqu'elles sont mises à découvert, se former une nouvelle cime et croître avec une vigueur remarquable.

## ARTICLE XI.

Exploitation d'une futaie mélangée de sapin et de hêtre.

504. Le mélange du sapin avec le hêtre est aussi favorable à la végétation que celui de cette dernière essence avec le chêne. La nature nous en montre de fréquents exemples, et c'est une erreur bien funeste qui a porté certains forestiers à détruire, dans ces sortes de forêts, l'essence feuillue pour ne laisser subsister que le bois résineux, alors que tout, au contraire, semble commander et faciliter la conservation de ce mélange. En effet, on observe que, dans ces bois mélangés, le sapin a une croissance remarquablement belle, et l'on reconnaît, en outre, que les dégâts des vents et des insectes y sont moins à redouter que dans les forêts purement résineuses. Quant à leur exploitation, la même révolution convient aux deux essences; les jeunes plants de l'une et de l'autre ont le même tempérament, et, par conséquent, les coupes de régénération peuvent être établies sans difficulté; dans les différentes phases de leur croissance, les deux essences marchent à peu

près du même pas, ce qui facilite l'opération des éclaircies périodiques; et enfin, elles recherchent toutes deux, pour prospérer, même terrain, même climat, même situation et même exposition. Elles ne diffèrent essentiellement que dans leur emploi, ce qui est un avantage évident pour la consommation et pour le propriétaire, d'autant plus qu'il est toujours facile de faire dominer le sapin, lorsque sa qualité de bois de construction doit lui mériter la préférence.

## ARTICLE XII.

## Exploitation d'une futaie d'épicéa.

505. EXPLOITABILITÉ. — Comme la croissance de l'épicéa est un peu plus prompte que celle du sapin, sa révolution peut, dans certains cas, être plus courte. C'est entre 90 et 140 ans que l'on fixe son exploitabilité; ordinairement le terme de 100 à 120 ans est considéré comme le plus convenable pour en obtenir les produits les plus abondants et les plus utiles. Dans les localités où il importe d'élever un certain nombre de pièces propres aux grandes constructions, on préfère le dernier terme, parce qu'il est impossible de réserver des arbres de cette essence pour parcourir une seconde révolution, attendu le peu de résistance que leurs racines opposent aux vents. Sur les grandes hauteurs, que souvent on le voit habiter, on peut laisser atteindre à

l'épicéa l'âge de 140 ans et au delà, tandis que, dans une localité très-fertile, où cet arbre est, comme le sapin et le hêtre, exposé à la carie intérieure, ce serait le cas de réduire la révolution.

**506. Coupes de régénération.** — Comme l'épicéa redoute, plus que toute autre essence, les ravages des vents, et qu'il est d'ailleurs dans sa première jeunesse, bien plus robuste et ne demande pas les mêmes soins que le sapin, tous les efforts des sylviculteurs, dans l'exploitation des forêts de cette essence, ont constamment tendu à préserver celles-ci du danger principal. Non-seulement on recommande comme extrêmement importante la stricte observance de la troisième règle sur l'assiette des coupes [432], mais on a encore imaginé, toujours dans le même but, divers modes particuliers d'exploitation, savoir : 1° le mode *par bandes alternées* ; 2° le mode *par bouquets* ; 3° celui *par bandes de proche en proche*. Enfin, on a aussi appliqué le mode ordinaire des trois coupes de régénération.

**507. Premier mode.** — Le premier mode est un de ceux qui ont été le plus mis en pratique ; il consiste à établir les coupes par bandes alternées de bois à abattre à blanc étoc, et de bois à laisser en massif, les unes et les autres de 50 à 60 mètres de large. L'ensemencement des bandes exploitées doit venir des bandes voisines où tous les bois sont conservés, et, pour mieux préparer le terrain des premières à recevoir la semence, on conseille d'en faire extraire

les souches. Quelques années après l'ensemencement, on revient abattre les bandes qui étaient demeurées intactes. Ce retour, en effet, est indispensable, car si l'on continuait à alterner ainsi d'un bout à l'autre de la forêt, il est évident que l'on ne tarderait pas à tomber dans les bois fort au-dessous de l'âge de l'exploitabilité, tandis qu'au point de départ, on en laisserait sur pied qui auraient dépassé cet âge.

Quoique, au premier abord, ce mode paraisse très-avantageux, il présente cependant des inconvénients assez graves pour que nous n'hésitions pas à le déconseiller, comme tout à fait impropre à conduire au but que l'on se propose :

1° L'expérience a prouvé que les bandes laissées en massif, loin de résister toujours au vent, sont souvent renversées avec une grande facilité ;

2° L'ensemencement naturel des bandes mises à blanc étoc, est presque toujours incomplet, les plantes nuisibles s'y jettent et rendent nécessaire un repeuplement artificiel ;

3° L'orsqu'on arrive à exploiter les bandes primitivement réservées en massif que le vent a pu épargner, il est impossible d'y faire aucune réserve, et les parties voisines étant beaucoup trop jeunes pour porter graine, on n'a plus d'autre ensemencement à attendre que celui qu'on opère soi-même. D'où il résulte que la moitié de la forêt, au moins, est à repeupler artificiellement ;

4° Enfin, on établit dans toute la forêt une grande

inégalité d'âge entre des parties contiguës, ce qui donne lieu aux inconvénients énumérés au sujet de la première règle sur l'assiette des coupes [430] et donne plus de prise aux vents.

508. *Deuxième mode.* — Dans le second mode dit par bouquets, au lieu de bandes alternées, on laisse çà et là, à portée de parties qu'on exploite à blanc étoc, de petits bouquets ou massifs de bois, qui doivent fournir les graines nécessaires au repeuplement des premières. Ce mode participe de tous les inconvénients du précédent, et établit en outre une plus grande irrégularité dans les exploitations et dans l'âge des bois; on ne peut donc que le rejeter.

509. *Troisième mode.* — Le troisième mode, donné par Hartig, paraît plus praticable. Voici comment cet auteur conseille de procéder.

On doit asseoir, en commençant du côté du Nord ou du Nord-Est, une coupe longue et étroite (1), et l'exploiter à blanc étoc. Quand on s'apercevra que la partie voisine porte des cônes et qu'on peut en espérer des semences abondantes, on extraira toutes les souches de la coupe, et l'on comblera au moins en partie, les excavations. Dans cet état, le terrain se trouvera bien préparé à recevoir les graines pous-

---

(1) Cotta conseille de ne donner à ces coupes qu'une largeur égale à la longueur des arbres, afin de ne pas compromettre le réensemencement naturel.

sées par les vents du Sud et d'Ouest. Par précaution, on fera bien de répandre, sur ce terrain fraîchement remué, 4 à 5 kilogrammes de semences d'épicéa, par hectare; ce qui équivaut, à peu près, au tiers de la quantité nécessaire pour unensemencement complet.

Sur ce point, il faudra naturellement suspendre les exploitations, jusqu'à ce que la coupe soit suffisamment garnie de jeunes plants. Ce n'est qu'après le repeuplement assuré qu'on pourra asseoir, dans la partie attenante, une nouvelle coupe de même longueur et de même largeur que la première; et ainsi de suite.

Cette nécessité d'attendre l'ensemencement de la coupe exploitée, avant de pouvoir mettre la hache dans la partie voisine, force d'entamer la forêt sur un autre point exploitable et même sur trois ou quatre points différents, sur lesquels on se porte successivement, afin de laisser, dans la partie où l'on a commencé à exploiter, un intervalle de trois ou quatre années au moins entre deux coupes consécutives, et d'assurer ainsi le repeuplement. Si, cependant, il arrivait que ces trois ou quatre années ne fussent pas suffisantes pour amener ce repeuplement, et qu'il fût d'ailleurs impossible de suspendre les exploitations, il ne resterait plus d'autre moyen que de régénérer les coupes par un semis artificiel ou par une plantation.

510. *Quatrième mode.* — L'application de la mé-

thode du réensemencement naturel, forme un quatrième mode, et c'est, sans contredit, dans la plupart des cas, le plus recommandable.

Eu égard au tempérament du jeune plant de l'épicéa, la coupe d'ensemencement pourrait être plus espacée que celle du sapin, et même que celle du hêtre; ce n'est qu'à cause des faibles racines des épicéas, qu'il est à conseiller de multiplier les réserves autant que dans les forêts de hêtre, afin qu'elles puissent se soutenir réciproquement. Quand le repeuplement de cette coupe sera complet et aura atteint la hauteur de 16 à 22 centimètres, on pourra faire la coupe secondaire; et lorsque les plants seront hauts de 32 à 40 centimètres, il sera temps de faire la coupe définitive.

Dans les localités très-exposées au vent, où l'on reconnaît que la réserve de la coupe secondaire ne pourrait pas résister, il est préférable de laisser la coupe sombre, sans y toucher, jusqu'à ce que le sous-bois soit parvenu à l'âge de 5 ou 6 ans, et de faire alors la coupe définitive. La coupe secondaire cependant, dont l'utilité est incontestable, ne doit être négligée que dans le cas d'urgente nécessité.

Ce mode, ainsi que nous venons de le dire plus haut, nous paraît le meilleur. En l'employant, on ne peut au pis aller, (en cas de dégâts causés par le vent), qu'être obligé de recourir sur quelques points au repeuplement artificiel; mais cet inconvénient est inévitable en suivant les trois autres modes et



surtout les deux premiers. Toutefois, on peut, en le combinant avec le troisième, lui faire subir quelques modifications utiles. Ainsi, il est à conseiller de donner aux coupes une forme longue et étroite, et d'entamer la forêt au moins sur deux points différents, de manière à pouvoir alterner les exploitations; afin que si la semence manque pendant quelques années sur l'un, on ne soit pas obligé d'y continuer les coupes sombres, dont la trop grande extension finirait par donner prise aux vents.

511. Des quatre modes que nous venons d'examiner, les deux premiers doivent être rejetés, ainsi que nous l'avons démontré. Le troisième a sans doute l'avantage de parer, dans beaucoup de cas, aux ravages du vent. Mais, aux expositions fraîches, l'herbe et divers arbustes envahissent le terrain dès qu'il est mis à nu et étouffent les épicéas naissants; dans les pentes chaudes et escarpées, une lumière trop vive et trop de chaleur les empêchent de réussir, et en général, la régénération naturelle s'opère mal, *dès qu'elle n'a pas lieu l'année même de l'exploitation*. Enfin, le quatrième mode, qui mérite incontestablement la préférence, présente cependant l'inconvénient de donner lieu à de nombreux chablis qui, dans leur chute, se rompent fréquemment ou brisent d'autres arbres restés sur pied, ce qui constitue souvent une perte considérable pour le propriétaire.

Dans les montagnes du Harz, en Saxe, et en général dans les pays où l'épicéa est très-répandu, les

difficultés d'exploitation, que présentent les forêts de cette essence, ont fait adopter, dans ces derniers temps, les coupes à blanc étoc. Mais au lieu de compter, comme autrefois, sur les parties voisines pour réensemencer le terrain, on a immédiatement recours à la plantation, à laquelle l'épicéa est particulièrement propre. Cette opération, dont il sera question dans le VI<sup>e</sup> livre de ce Cours, réussit parfaitement et n'occasionne qu'une faible dépense, eu égard surtout aux années qu'elle fait gagner à la végétation de la jeune forêt. Aussi peut-on considérer les coupes de régénération comme presque abandonnées aujourd'hui dans les forêts d'épicéa d'outre-Rhin.

Tout en reconnaissant l'importance des faits que nous venons de rapporter et en admettant les conclusions pratiques que nos voisins en ont tirées, nous pensons que, en France, dans les localités peu nombreuses d'ailleurs et toujours montagneuses, où l'épicéa se rencontre comme essence dominante, on fera bien de commencer par tenter le troisième mode, si les années de semences sont fréquentes, ou, sinon, le quatrième, et de ne recourir au repeuplement artificiel qu'après avoir constaté l'impuissance ou les inconvénients des coupes de régénération. Découvrir et remuer le sol en montagne, surtout dans les pentes rapides, nous paraît toujours une opération qui peut avoir les plus funestes conséquences. — Nous nous arrêtons d'autant plus volontiers à cet avis, qu'il est à notre connaissance que

dans différentes forêts d'épicéa du Jura, des Vosges et des Alpes, l'application de la méthode du réensemencement naturel a produit jusqu'à ce jour des résultats satisfaisants.

512. COUPES D'AMÉLIORATION. — Ce qui a été dit sous ce rapport, au sujet des forêts de sapin [503], est entièrement applicable à celles d'épicéa.

#### ARTICLE XIII.

Exploitation d'une futaie mélangée de sapin et d'épicéa.

513. Le mélange du sapin et de l'épicéa, comme celui du chêne et du hêtre, et par les mêmes raisons, produit les meilleurs effets sur la végétation des deux essences. L'épicéa, à la vérité, a une croissance un peu plus prompte que le sapin, mais lorsqu'ils sont réunis dans un même massif, cette différence est bien peu sensible et, en tous cas, ne se fait point sentir défavorablement. Cependant, on remarque assez fréquemment, dans les forêts ainsi mélangées, que l'épicéa tend peu à peu à empiéter sur le sapin et à le déposséder du terrain, ce qui est fâcheux en général, et surtout dans certaines localités où, pour divers motifs, le sapin est l'essence préférée. Selon toutes les apparences, cet inconvénient tient principalement à ce que, dans les coupes de régénération, on n'accorde pas une

attention assez grande au repeuplement du sapin, qui réussit bien plus difficilement que celui de l'épicéa; c'est-à-dire que, de prime abord, on ne conserve pas dans la coupe sombre un couvert assez épais, et qu'ensuite on éclaircit trop fortement la coupe secondaire.

La précaution essentielle, pour conserver le mélange si utile des deux essences, est donc de faire les coupes d'ensemencement surtout dans les années où la graine de sapin est abondante, de composer la réserve dans ces coupes du plus grand nombre possible de sapins, et enfin de régler les coupes secondaires principalement en vue des exigences de cette essence.

Il pourra bien arriver ainsi que la croissance des jeunes sapineaux gagne quelque avance sur celle des épicéas, qui exigent plus de lumière dès les premières années; mais, quoique entravés momentanément, ces derniers ne tarderont pas à reprendre leur vigueur habituelle, sitôt que le couvert sera suffisamment éclairci.

#### ARTICLE XIV.

. Exploitation d'une futaie de pin sylvestre.

514. **EXPLOITABILITÉ.** — Dans les pays où le pin sylvestre est très-commun, on ne lui laisse pas atteindre le siècle. Effectivement, l'accroissement des massifs de cette essence atteint son maximum vers

60, 70 ou 80 ans; puis, après s'être maintenu pendant une vingtaine d'années, il diminue en raison de l'augmentation de l'âge. Si donc, l'intérêt principal était de fournir du chauffage, on ferait bien de fixer la révolution du pin sylvestre à 80 ou 90 ans. Cet intérêt peut exister dans les pays où ce pin est dominant; encore devrait-on y réserver des parties de forêt, et les soumettre à une révolution plus longue pour obtenir des arbres de service de bonne qualité.

En France, où les bois de construction sont plus rares que ceux de chauffage, l'Etat ne peut que gagner à reculer l'exploitation du pin sylvestre. Dans le moment de sa plus forte croissance, son bois n'a pas les meilleures qualités. Ce n'est que plus tard que son grain devient serré, qu'il se charge de résine concrète et acquiert ainsi l'élasticité et la durée qui le rendent précieux pour les grandes constructions, pour la marine surtout [301]. D'après ces motifs, on fera bien de soumettre le pin sylvestre à une révolution de 120 ans dans les terrains où sa croissance est active, et de ne l'exploiter qu'à 140 ou 160 ans (1)

---

(1) Les longues révolutions ont l'inconvénient de compromettre la fertilité du sol, parce que la futaie de pin sylvestre, une fois la période d'allongement passée, ne se constitue plus en massif clos et, parvenue à un âge avancé, devient tout à fait clairière. Il s'ensuit que, de bonne heure, le sol se gazonne ou se couvre d'arbustes nuisibles (myrtilles, bruyères, etc.), que le vent disperse le lit de feuilles mortes et que, à la fin de la révolution, le terrain se trouve tassé, desséché, appauvri, et

dans les sols secs et suffisamment profonds, tels que les sables siliceux où cette essence se plaît et acquiert surtout les qualités qui la rendent propre aux grands emplois.

515. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. — Le traitement du pin sylvestre, en ce qui concerne le réensemencement naturel, diffère sous quelques rapports de celui qu'on prescrit pour l'épicéa et le sapin; son jeune plant, comme on le sait, est plus robuste que celui des deux autres, et le couvert des arbres de réserve lui est absolument contraire dès les premières années de son existence. Aussi n'est-il pas nécessaire que la coupe d'ensemencement soit *sombre*, et l'on peut sans inconvénient écarter les arbres de manière que leurs branches soient distantes les unes des autres de 5 à 6 mètres (1).

---

dans les conditions les plus favorables à la multiplication de certains lépidoptères fort nuisibles, dont les chenilles, pour hiverner, ne se terrent que dans les sols très-secs.

Lors donc qu'on se décidera pour une révolution de 120 ans et au-dessus, on devra non-seulement conserver soigneusement tous les bois feuillus qui lèvent naturellement sous les pins, mais on pourra même recourir avec avantage à l'expédient qui a été indiqué pour le chêne (voir la note page 256), c'est-à-dire, introduire, vers le milieu de la révolution, une essence subsidiaire destinée à protéger et à améliorer le sol. Parmi les bois feuillus, le charme, le hêtre; parmi les résineux, le sapin, seront très-propres à remplir ce rôle. Ce dernier surtout, placé en second étage, donne à la végétation du pin un casor magnifique.

(1) En faisant le choix des arbres de réserve, il ne faut pas préférer les pieds élancés et très-élevés; il vaut mieux conserver ceux de hauteur

Cependant, en espaçant ainsi la réserve, on pourrait craindre les dégâts des vents, ou l'envahissement des herbes ou des plantes nuisibles. Le premier inconvénient existe beaucoup moins pour le pin sylvestre que pour l'épicéa et même pour le sapin, attendu que le pin sylvestre pivote et s'enracine plus fortement. Néanmoins, dans les parties très-exposées au vent, et où l'expérience a appris que cet arbre lui résiste difficilement, on fera bien de laisser une réserve plus serrée. Le second inconvénient est fréquent dans les pineraies et, dans certains terrains, à peu près inévitable. Il peut être atténué cependant en ne faisant de coupe d'ensemencement que quand on sera assuré d'une prochaine et abondante fructification qui, dans les pins, est assez fréquente, et peut être prévue dix-huit mois à l'avance. De plus, dans l'automne ou l'hiver qui précède la dissémination de la graine, on procèdera à l'extraction des souches et l'on donnera au terrain une culture par rayons ou sillons étroits, au fond desquels les semences viendront s'arrêter et trouveront une terre meuble et fraîche, favorable à leur germination et à la réussite du jeune plant.

---

moyenne, qui sont branchus, ordinairement plus fertiles en semences, et qui d'ailleurs résistent mieux aux vents. Dans l'état actuel de nos forêts de pin, ce choix peut avoir lieu ; mais, plus tard, lorsqu'elles auront été traitées régulièrement, on ne trouvera plus que sur les lisières, des arbres peu élevés et chargés de branches.

Dans la plupart des cas, ces travaux ne seront pas onéreux, car les souches du pin, par la résine qu'on en extrait, sont d'un produit plus lucratif que celles des autres bois.

Après la coupe d'ensemencement, dès que le repeuplement est complet, et que les jeunes plants ont atteint à peu près la hauteur de 16 à 24 centimètres, il faut procéder à la coupe définitive. On conçoit facilement que la nature vigoureuse du jeune plant rende inutile la coupe secondaire, et qu'il faut se hâter surtout de le débarrasser du couvert qui lui est tout à fait contraire.

516. Malgré les précautions prises pour régénérer le pin sylvestre par la voie naturelle, on est forcé de reconnaître qu'il est extrêmement rare de rencontrer des repeuplements complets et bienvenants dans les forêts de cette essence. Aussi beaucoup de bons forestiers sont-ils d'avis de renoncer aux coupes d'ensemencement dans les pineraies, de couper à blanc étoc et de recourir aux semis artificiels qui réussissent facilement et très-bien. A considérer la généralité des faits, cette opinion est fondée, il faut le dire. Que la réserve de la coupe d'ensemencement soit nombreuse ou non, que l'on hâte la coupe définitive ou qu'on la retarde, on voit fréquemment les réensemencements naturels les plus complets et les mieux venants périliter au bout de quelques années, s'amoindrir et même disparaître par places au point de donner accès aux morts-bois et aux bois



blancs. La cause du phénomène est assez difficile à indiquer. Certains auteurs l'attribuent à quelques insectes tels que le ver du hanneton, le pissode noté et l'hylobe, qui attaquent, les uns les tiges, les autres les racines des jeunes pins. M. de Berg pense, avec raison, selon nous, qu'il faut la chercher le plus souvent dans la position superficielle des racines des vieux pins, dont le chevelu très-abondant garnit et pénètre le sol en tous sens, et absorbe ainsi en totalité les sucs nourriciers, étant évidemment beaucoup plus vigoureux que les faibles radicules des jeunes plants.

En admettant cette opinion, on doit en conclure que les repeuplements naturels n'auront chance de réussir que dans les terrains assez riches et assez profonds pour que le pin, en avançant en âge, y enfonce ses racines plus bas que la couche dans laquelle les jeunes plants étendent les leurs pendant les premières années. Mais on sait que les pineraies occupent en général les sols les moins fertiles ; on s'explique donc aisément comment il est si rare d'y rencontrer des repeuplements naturels bien venants et complets.

N'était la considération importante de la dépense qu'occasionne le repeuplement artificiel par l'achat de la graine qui est assez chère, et par les frais de labour ; n'était, de plus, la chance que l'on court de ne pas obtenir toujours de bonnes graines quand on est obligé de se les procurer par le commerce, on serait conduit, d'après ce que nous venons de dire,

à poser en principe que la régénération du pin sylvestre doit s'opérer par coupes à blanc étoç suivies immédiatement de semis artificiels, et que les coupes d'ensemencement ne doivent être pratiquées qu'exceptionnellement, dans les terrains en pente, par exemple. En un mot, la raison culturale conseille le premier mode, mais la raison financière oblige la plupart du temps à employer le second (1).

517. **COUPES D'AMÉLIORATION.** Les pins sont, plus que les deux précédents conifères, exposés à se ployer ou à se rompre sous le poids de la neige et du givre, à cause de leurs branches plus étalées et de leurs feuilles plus longues ; (2) il semblerait donc, au premier abord, qu'on ne devrait y pratiquer que l'éclaircie *faible*. Mais cette essence, dès qu'elle passe à l'état de gaulis, supporte mal le massif serré. Les branches qui s'entrelacent perdent leurs feuilles et ne tardent pas à périr ; la tête des arbres, au lieu de se développer circulairement, devient grêle, étriquée ; et quand cet état de souffrance se prolonge, la généralité des cimes se déforme, les tiges elles-mêmes contractent des maladies et le peuplement tout entier devient parfois impropre à atteindre un âge avancé et de belles dimensions. — Pour prévenir ce

---

(1) Voir l'appendice.

(2) Cela peut tenir aussi à ce que la neige tombe en flocons plus gros et plus lourds dans les climats habités par le pin sylvestre.

dernier et grave inconvénient, sans cependant exposer la jeune pineraie aux bris de neige, le moyen le plus sûr, dont l'efficacité est aujourd'hui démontrée par l'expérience, consiste : 1° à entreprendre la première éclaircie (contrairement à la théorie générale), lorsque le bois est encore à l'état de fourré, au moment où les branches les plus inférieures commencent à sécher ; 2° à faire cette éclaircie *forte*. A la vérité, il pourra arriver ainsi que la production de terreau, si abondante surtout dans la première jeunesse des pineraies, se trouve entravée ou au moins diminuée. Mais cet inconvénient ne sera que momentané, attendu que les brins restants, ayant plus d'espace pour étendre leurs branches, ne tarderont pas à rendre au sol son épais couvert, tandis que d'un autre côté, ils se formeront une tête bien conique, propre à assurer leur bonne croissance ultérieure, et en même temps une tige plus trapue et assez forte pour résister au poids de la neige.

Les éclaircies suivantes devront être plus rapprochées que dans les sapins et les épicéas, ce qui, sans doute, rendra chacune d'elles moins productive ; mais, prises ensemble, elles le seront davantage et exerceront sur la végétation des tiges destinées à croître jusqu'à la fin de la révolution l'influence salutaire qui est le but principal de ce genre d'opération.

## ARTICLE XV.

## Exploitation d'une futaie de pin à crochets (1).

518. Les forêts de pin à crochets qui se trouvent dans les Alpes françaises n'ont pas été soumises, jusqu'alors, à une exploitation régulière et raisonnée. Ainsi que nous l'avons dit ailleurs (page 135), ce n'est que depuis peu d'années qu'elles ont été l'objet de quelques études intelligentes qui nous ont mis à même d'apprécier cette essence. On n'a donc pas, sur les particularités du mode de traitement à leur appliquer, de renseignements bien certains et qui soient le fruit d'une longue expérience. — Voici, toutefois, ce que l'exploration attentive des lieux, jointe aux notions acquises sur les propriétés et les exigences de l'arbre, permet d'établir à cet égard.

519. **EXPLOITABILITÉ.** L'extrême lenteur de la végétation et les retards qu'éprouve généralement le réensemencement naturel dans les hautes régions habitées par le pin à crochets, exigent qu'il ne soit exploité qu'à un âge avancé, surtout s'il était reconnu qu'il est propre à la maturité. En vue de cette dernière éventualité, les révolutions qu'il semblerait

---

(1) Cet article est tiré, en grande partie, d'un mémoire de M. du Guiny sur les futaies résineuses des Hautes-Alpes.

convenable de lui appliquer seraient, selon l'altitude à laquelle se trouve la forêt, les suivantes :

de 1500 à 1800<sup>m</sup> — 160 à 180 ans,  
de 1800 à 2000<sup>m</sup> — 200 ans.

520. COUPES DE RÉGÉNÉRATION. L'abondance de la graine du pin à crochets dans les années où elle réussit, et sa légèreté, ainsi que le tempérament robuste du jeune plant, permettront de tenir assez espacées les réserves de la coupe d'ensemencement, qu'on devra d'ailleurs choisir parmi les pieds les plus vivaces et les mieux enracinés. Toutefois, dans les parties exposées aux ouragans, il est à conseiller de les disposer par petits groupes ou bouquets, qui auront plus de chances de résister à l'effort du vent que des arbres isolés.

La coupe secondaire pourra se faire en une seule fois; elle sera suivie de près par la coupe définitive.

Afin de diminuer les retards de la régénération naturelle, il sera bon, partout où l'on n'aura pas à redouter les coulées de neige et l'éboulement des terres, de procéder à l'extraction des souches et même au dégazonnement partiel du sol, d'après le mode que nous avons indiqué plus haut [492 et 495].

Aux indications qui précèdent, il est nécessaire d'ajouter quelques recommandations particulières relatives, surtout, à l'assiette des coupes dans les localités exceptionnelles où croît le pin à crochets.

1° La 4<sup>e</sup> règle d'assiette [434] ne pouvant que

rarement être appliquée dans ces hautes montagnes, faute de voies de vidange qui permettent d'éviter les inconvénients que signale la 2<sup>e</sup> règle [431], il est d'autant plus important d'établir, dans la partie supérieure de presque tous les massifs situés en pente rapide, un rideau tel qu'il est prescrit dans les développements de cette 4<sup>e</sup> règle, mais beaucoup plus profond (150 à 200<sup>m</sup>), attendu l'extrême violence des coups de vent.

De plus, la prudence exige, dans un grand nombre de cas, que l'on mette en réserve la lisière inférieure des forêts qui dominant les villages et les cultures, afin de garantir les unes et les autres contre les avalanches et contre le ravinement des pentes.

2<sup>o</sup> Eu égard aux dangers qui viennent d'être signalés, il sera essentiel de ne point asseoir les coupes d'ensemencement d'un seul tenant, mais bien par coupons séparés, et d'assurer ensuite le prompt repeuplement de ces différents coupons. — Cette manière d'opérer entraînera incontestablement quelques-uns des inconvénients reprochés au mode d'exploitation appelé *jardinage* [438]. Toutefois, ces inconvénients seront très-atténués si, au lieu de jeter ces coupons au hasard, on les maintient dans un même canton de forêt, en leur faisant suivre un certain ordre. Dès lors, les repeuplements, tout en différant d'âge, par places, ne se gêneront pas trop entre eux, et, considérés dans leur ensemble, les divers cantons composant la forêt présenteront en-

core une succession assez régulièrement graduée. Or, il est permis de penser que, dans les hautes régions qu'habite le pin à crochets, il serait difficile, sinon impossible, d'atteindre un résultat plus satisfaisant.

521. COUPES D'AMÉLIORATION. L'essence qui nous occupe croît, ainsi que nous l'avons dit, avec une extrême lenteur, particulièrement dans sa jeunesse, et se maintient en massif très-serré. Cette double circonstance doit faire différer le commencement des éclaircies au moins jusqu'à l'âge de 40 ans; de plus, ces opérations devront être *très-faibles* [467], afin que le massif continue sûrement à résister aux avalanches et aux éboulements, et qu'il procure au sol une couche abondante de terreau qui, souvent, forme sa seule richesse.

En raison, précisément, de ces éclaircies toujours *faibles*, leur périodicité semble pouvoir être fixée à 15 ou 20 ans. — Lors de la dernière, seulement, il sera bon de desserrer le massif plus que dans les précédentes, afin de préparer, par avance, la reprise du semis naturel et d'assurer ainsi la prompte réussite des coupes de régénération. — Le tempérament du jeune plant qui résiste longtemps sous le couvert [306], permettra cet expédient.

## ART. XVI.

## Exploitation d'une futaie de pin maritime.

**522. EXPLOITABILITÉ.** — Pour savoir positivement ce que cet arbre peut devenir sous le rapport de son accroissement, et à quelle époque il conviendrait de fixer son exploitabilité, il faudrait le cultiver sans tourmenter sa végétation [319]. En attendant les lumières de l'expérience, on ne peut juger que par analogie.

Il est assez ordinaire que les arbres qui ont une végétation très-rapide, dans leur jeunesse, atteignent plus tôt que les autres leur maximum d'accroissement. Le pin maritime est particulièrement dans ce cas. Cependant dans les départements méridionaux où il trouve le climat qui le fait prospérer, il paraît hors de doute que la période ascendante de son accroissement y est assez longue, et à cet égard on fera bien de retarder son exploitation jusqu'à 100 ou 120 ans, suivant la nature du sol, afin que le bois puisse acquérir la solidité convenable aux constructions et aux autres emplois auxquels il est propre.

Bien entendu qu'en adoptant cette révolution, il faut se garder de permettre le gemmage.

**523. COUPES DE RÉGÉNÉRATION.** — Le pin maritime n'ayant point encore été soumis à un traitement régulier, on pourrait être incertain sur le mode à



suivre. Mais la nature de ses graines, le tempérament de son jeune plant et la disposition de ses racines, doivent faire conclure que cet arbre peut être exploité à l'instar du pin sylvestre. Ainsi, dans la coupe d'ensemencement, on pourra d'autant plus espacer les réserves, que le pin maritime résiste encore mieux aux coups de vent. Sa semence, à la vérité, est un peu plus grosse et un peu plus lourde que celle du pin sylvestre, mais la membrane qui lui sert d'aile est d'autant plus grande, ce qui doit favoriser sa dissémination au loin. La coupe secondaire deviendra inutile en raison du tempérament robuste du jeune plant ; et l'extrême rapidité avec laquelle il végète fait penser que la coupe définitive devra succéder à celle d'ensemencement le plus tôt possible, c'est-à-dire, dans l'année qui suivra la naissance du repeuplement ou au plus tard deux années après.

524. COUPES D'AMÉLIORATION. — Ce que nous avons dit à cet égard du pin sylvestre [517] s'applique aussi au pin maritime. La rapidité de sa croissance devra nécessairement faire avancer la première éclaircie et abréger la périodicité des éclaircies suivantes.

525. Les règles d'exploitation que nous venons d'exposer ne s'appliquent qu'aux forêts de pin maritime qui ne doivent pas être soumises au gemmage. Lorsqu'on se propose au contraire de gemmer, elles doivent se modifier : d'une part, ce procédé ralentit la croissance et abrège la vie de l'arbre ; de l'autre, ce n'est plus le bois, mais bien la résine qui

devient le produit principal de la forêt. La première circonstance emporte avec elle des révolutions de plus courte durée, la seconde exige un mode particulier d'éclaircies très-rapprochées que nous allons décrire, tel qu'il se pratique dans le midi de la France.

L'intérêt du propriétaire étant évidemment de hâter l'époque à laquelle il pourra commencer le gemmage, il importe de favoriser le développement des cimes et le grossissement des tiges le plus possible. A cet effet, on éclaircit les jeunes bois pour la première fois à l'âge de 7 ans, et ensuite de 6 en 6 années, jusqu'à 25 ans, époque à laquelle ils ont ordinairement atteint la grosseur convenable. Dans ces opérations, on amène par degrés l'espacement des pins entre eux : les deux premières doivent conserver encore le massif, quoique clair, afin d'activer la croissance en hauteur, mais dès la troisième on réduit le nombre des tiges à 700 ou 800 par hectare, et à la quatrième on n'en laisse plus subsister que 500 ; enfin, 5 ans plus tard, c'est-à-dire, à 30 ans, on réduit ce dernier nombre à 400. Les 100 arbres destinés à tomber, dans la cinquième éclaircie sont désignés dès la quatrième et gemmés *à mort* [319] ; les autres le sont *à vie* à partir de la même époque.

Ces 400 pins restent ensuite sur pied de 30 à 60 ans et sont soumis au gemmage de 5 en 5 années. A 60 ans on marque de nouveau 100 arbres pour

être gemmés à mort, puis abattus, et les 300 pieds restants demeurent debout jusqu'à la coupe finale qui a lieu tantôt à 70 ou 80 ans, tantôt seulement à 400 ans, selon l'état des bois et la qualité du sol<sup>(1)</sup>.

526. Nous avons indiqué plus haut comment les coupes de régénération devraient être pratiquées si l'on se proposait d'y recourir. Mais il est à croire que généralement on emploiera plutôt la coupe à blanc étoc suivie du semis artificiel. En effet, dans l'un comme dans l'autre système, un labour devient indispensable, car, par suite du grand espacement donné aux pins, le terrain ne peut manquer d'être couvert de toutes sortes d'arbustes et de plantes nuisibles; d'un autre côté, la graine du pin maritime coûte peu à récolter et à extraire, elle est presque toujours de très-bonne qualité, et les semis qu'on en fait réussissent parfaitement; tout se réunit donc pour faire donner la préférence à la voie artificielle.

#### ARTICLE XVII.

##### Exploitation d'une futaie de pin laricio.

527. Le laricio, comme le pin maritime, atteint assez vite son maximum d'accroissement. Ainsi, à

---

(1) Dans l'ouest et le centre de la France, où le pin maritime occupe aujourd'hui de vastes étendues, au grand avantage des propriétaires et des populations, sa végétation est beaucoup moins belle et sa durée moindre que dans le midi. Il en résulte la nécessité de le couper au plus tard à 60 ans, et par conséquent de le gemmer moins longtemps.

L'âge de 80 à 100 ans, il a déjà d'assez fortes dimensions ; mais pour qu'il devienne propre à la construction et aux différents emplois qui exigent des bois de qualité supérieure, il est essentiel de le laisser vieillir bien davantage. L'âge de 160 ans pourrait être fixé pour son exploitation, et l'on fera bien de reculer ce terme jusqu'à 200 ans au moins, sur les hautes montagnes.

Le laricio a tant d'analogie avec le pin sylvestre, qu'on peut affirmer que le même traitement lui convient, tant pour les coupes de régénération que pour celles d'amélioration.

## ARTICLE XVIII.

## Exploitation d'une futaie de pin noir.

528. Les auteurs forestiers qui ont écrit sur cette essence s'accordent tous pour assimiler le traitement à lui appliquer à celui du pin sylvestre. La 8<sup>e</sup> édition de la Culture des bois de Cotta, publiée en 1856, contient, à ce sujet, les renseignements suivants :

Pour que le pin noir atteigne les dimensions et les qualités qu'il est susceptible d'acquérir, il convient de le soumettre à une révolution de 120 à 150 ans, suivant qu'il occupe des régions plus ou moins élevées. — Dans la première jeunesse, il supporte, un peu mieux que le pin sylvestre, le couvert des

grands arbres [515], mais dès qu'il parvient à l'âge moyen, il ne se maintient pas plus que lui en massif serré, ce qui entraîne la plupart du temps le gazonnement du sol et l'invasion de divers arbustes et morts-bois. — Les coupes de régénération doivent se faire dans les forêts de pin noir comme dans celles de pin sylvestre ; 60 à 80 réserves suffiront, par hectare, pour composer la coupe d'ensemencement. — L'essouchement des morts-bois et une culture par sillons donnée au sol, seront en général très-utiles pour assurer la prompte réussite du semis naturel.

Les coupes d'amélioration, dont l'ouvrage cité ne parle pas, pourront probablement être effectuées d'après les règles que nous avons données plus haut [517] pour les forêts de pin sylvestre.

#### ARTICLE XIX.

##### Exploitation d'une futaie de pin d'Alep.

529. Le pin d'Alep, de même que le pin maritime, atteint son plus fort accroissement dès l'âge de 60 ou 70 ans. Mais, comme il est employé aux constructions, on doit croire qu'il serait préférable de le laisser arriver au moins à l'âge de 80 ans, afin que son bois pût acquérir plus de solidité.

Pour pouvoir donner des règles sur le mode d'exploitation qui lui convient, il faudrait que cet arbre eût été étudié en forêt, dans le climat qui lui est

propre. On sait cependant qu'il n'est pas fortement enraciné, et, selon toute probabilité, son jeune plant, sous le soleil brûlant où il végète, se trouverait bien de quelque abri dans les premières années. Il semble donc que l'on pourrait lui appliquer un traitement analogue à celui de l'épicéa.

## ARTICLE XX.

Exploitation du pin pinier, du pin cembro, et du pin du lord Weymouth.

530. Le pin pinier, en France du moins, n'est encore cultivé que comme fruitier. En attendant que la sylviculture s'en occupe d'une manière plus efficace, ce qui est fort à désirer, il n'y a donc pas lieu de rechercher les particularités du mode d'exploitation qui, un jour, pourra lui être applicable.

531. Quant au cembro dont il n'existe, dans notre pays, qu'une seule forêt, de faible étendue, à l'état pur [456], on pourrait presque émettre la même opinion. Toutefois, cette essence se trouve, dans les Alpes, fréquemment mélangée au mélèze, au pin à crochets et à l'épicéa, et son importance, surtout au point de vue des services qu'elle est appelée à rendre pour le reboisement des hautes sommités, est assez grande pour qu'on s'attache, non-seulement à la conserver là où elle existe, mais encore à la propager autant que possible. On y parviendra en réservant

les pieds de cembro partout où ils se rencontrent, dans les coupes d'ensemencement aussi bien que dans les éclaircies, et en donnant aux jeunes plants tous les soins et toute l'attention qu'ils réclament pour réussir. — D'après des observations, faites tant en Suisse que dans les Alpes françaises, il paraîtrait que le traitement indiqué plus haut pour les forêts d'épicéa [510 et 512] serait celui qui conviendrait le mieux au cembro.

Non-seulement les hommes, pour le commerce qu'ils en font, détournent une grande partie des graines de cembro de leur destination naturelle, mais les casse-noix (*macifraga caryocatactes*) qui, à l'arrière-saison, passent en troupes considérables sur les Alpes, les recherchent, dit-on, avidement et en consomment de fortes quantités (1). Il semble donc tout à fait à propos de ne point abandonner entièrement à la nature la propagation de cet arbre aussi utile qu'intéressant, mais bien de la favoriser artificiellement, par des semis et des repiquements dont il sera question dans le VI<sup>e</sup> livre de ce cours.

522. Le pin du lord Weymouth n'est point encore un arbre des forêts d'Europe, quoique très-susceptible de le devenir. A la vérité, il en existe des essais sur différents points ; mais ils sont généralement faits sur une trop petite échelle, et trop récents

---

(1) M. Broilliard.

d'ailleurs, pour qu'on puisse en déduire des règles d'exploitation. Toutefois, on connaît la légèreté de sa semence, le tempérament assez robuste du jeune plant, la nature pivotante de la racine, et la croissance rapide de l'arbre; on pourrait donc, si l'occasion l'exigeait, lui faire aisément l'application de la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies.

## ARTICLE XXI.

## Exploitation d'une futaie de mélèze.

533. Les règles données plus haut (article XV du présent chap.) sur l'exploitation des forêts de pin à crochets sont entièrement applicables à celles de mélèze, croissant dans les mêmes régions. On sait d'ailleurs que ces deux essences sont très-souvent associées et il est d'observation constante, tant dans les hautes montagnes que dans les situations moyennes où il a été introduit artificiellement, que le mélèze s'accommode parfaitement du mélange avec d'autres bois, résineux ou feuillus, et que cet état favorise à la fois son accroissement et la régularité de forme de sa tige. Il y a donc lieu de le maintenir partout où il se présente naturellement et même de chercher à le créer, lorsqu'on en aura les moyens.

Il est presque inutile de faire remarquer que, selon les essences avec lesquelles le mélèze se trouvera mélangé et selon le degré de ce mélange, il pourra



être à propos de modifier la révolution et le traitement, sur lesquels influenceront nécessairement aussi, dans une certaine mesure, la qualité du sol et le climat local.

## ARTICLE XXII.

## Exploitation du cèdre du Liban.

534. Il serait superflu de parler de l'exploitabilité et du mode d'exploitation d'un arbre à peine connu, et qui, en France, n'existe encore que dans les plantations d'agrément. Ce sont sans doute, les soins à donner aux jeunes plants [387] qui, jusqu'à présent, ont mis obstacle à ce que le cèdre prît place dans nos forêts. Mais si les plantations en grand présentent beaucoup de difficultés, les forestiers peuvent se borner à quelques essais dans des situations différentes. Ils prépareront ainsi à leurs successeurs le moyen de juger cet arbre remarquable, sur lequel l'opinion est encore incertaine.

---

---

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### EXPLOITATION DES FUTAIES IRRÉGULIÈRES, QUI ONT ÉTÉ SOUMISES AU MODE DU JARDINAGE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Des forêts jardinées en général.

535. Nous n'avons traité jusqu'à présent que des futaies dont l'état régulier permet l'application de la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies ; mais en France, il en existe un grand nombre, qui ne sont nullement dans ce cas. Telles sont entre autres les forêts jardinées.

Le *jardinage* consiste à enlever, çà et là, les arbres les plus vieux, les bois dépérissants, viciés ou secs, et d'autres en bon état de croissance, mais qui sont réclamés par le commerce ou la consommation locale. Dans ce mode d'exploitation, qui a été plus particulièrement appliqué aux bois résineux, notamment au sapin et à l'épicéa, on a pour principe de ne

jamais prendre que très-peu d'arbres à la fois sur le même point, trois à cinq au plus par hectare (1), et d'étendre autant que possible le jardinage sur toute la forêt (2). Il résulte de cette manière d'opérer que la forêt présente, sur tous les points, des bois de tout âge confusément mêlés, depuis le jeune brin jusqu'à la vieille écorce, et que les arbres qui ont le plus de grosseur et d'élévation gênent ceux qui se trouvent immédiatement sous leur couvert, et en ralentissent la végétation. De plus, les arbres n'étant pas serrés entre eux, s'étendent en branches, deviennent presque toujours noueux, et n'atteignent pas la hauteur que la nature leur a assignée. Il en résulte encore que, s'élevant pour ainsi dire par échelons, ils ne peuvent se soutenir réciproquement et ne présentent pas assez de résistance aux coups de vent et à la pression de la neige et du givre. Les bois les plus faibles, arrêtés dans leur végétation par ceux qui les surmontent, contractent des germes de maladie lorsque cet état de gêne se prolonge ; presque toujours ils languissent, rarement ils arrivent à un beau développement, et souvent ils meurent prématurément.

Tel est, en général, l'état des forêts jardinées. Cependant on rencontre fréquemment, dans certaines de ces forêts, de belles parties dont la prospérité est

---

(1) Dralet. Traité des bois résineux, page 151.

(2) *Id.*, Traité de l'aménagement, page 106.

due aux soins du forestier qui a su déroger à la routine, en enlevant de préférence les arbres étendus en branches, qui surmontaient le jeune sous-bois. Celui-ci, dès-lors, débarrassé du couvert qui l'étouffait, a pu participer aux influences atmosphériques, s'est élancé et a pris une belle croissance. Des effets analogues, et sur une plus grande étendue, ont souvent été opérés par des coups de vent qui ont enlevé les vieilles écorces et d'autres arbres qui dominaient de jeunes fourrés. Ainsi, l'on voit quelquefois, dans les forêts jardinées, des résultats semblables à ceux que l'on obtient dans les futaies régulières, mais sur quelques points seulement.

536. Le jardinage, en disséminant les exploitations sur de très-grandes surfaces, rend la surveillance fort difficile, et augmente considérablement les dégâts de l'abatage et des vidanges. Mais le reproche le plus grave auquel donne lieu ce mode, c'est de ne faire rendre aux forêts, dans un temps donné, que des produits matériels très-inférieurs, en quantité et en qualité, à ceux que l'on obtient par la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies. Il suffit de comparer l'influence de ces deux modes sur la végétation, pour être convaincu de cette vérité.

En effet, dans les forêts jardinées, nous voyons les bois de toute catégorie entravés dans leur développement, pendant un temps plus ou moins long, et souvent jusqu'à la fin de leur existence; dans la

futaie régulière, au contraire, la croissance est favorisée dès la première jeunesse, et activée, jusqu'au terme de la maturité, par des exploitations périodiques entreprises dans ce but. Or, il est évident que, de deux forêts, celle qui fournira le plus de matière dans un temps donné, est celle où la généralité des arbres aura l'accroissement le plus fort et le plus soutenu, toutes circonstances égales d'ailleurs. Ajoutons que dans la futaie jardinée, il n'est pas question d'enlever, comme dans la futaie régulière, les jeunes bois dominés qui, par conséquent, sont perdus pour la consommation.

Quant à la qualité des bois, la facilité qu'ils ont, dans la forêt jardinée, de s'étendre en branches, les rend inférieurs, pour les constructions et la fente, à ceux qui ont crû en massif; et il est à remarquer en outre, que les dégâts considérables causés par l'abatage et la vidange dans une telle forêt, y multiplient les arbres viciés, tandis que l'on n'en rencontre que peu dans les futaies régulières.

#### ARTICLE II.

##### Des coupes de transformation.

537. L'infériorité des futaies jardinées, comparativement aux futaies régulières, étant démontrée, on est nécessairement amené à conclure que la méthode

du jardinage doit être supprimée et remplacée par un mode de coupes de transformation qui établisse dans ces forêts plus d'uniformité sous le rapport de l'âge et de la croissance des bois, et qui rende possible, par la suite, l'application de la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies. Mais, pour que, dans l'exécution de ces coupes de transformation, on atteigne entièrement le but que l'on se propose, il est essentiel d'examiner attentivement les divers états de peuplement qui existent dans les forêts jardinées. On en rencontre ordinairement trois principaux dont chacun demande un traitement particulier.

1<sup>o</sup> *Quand les vieux arbres ne sont pas très-nombreux, et que le terrain est suffisamment garni de jeunes bois en bon état de croissance, on doit se hâter de faire abattre tous ces vieux arbres, et même d'autres moins âgés, si, par une tête trop rameuse, ils gênent évidemment l'ensemble du sous-bois.*

Lors même que ce sous-bois serait déjà élevé, eût-il 25 à 30 ans, il ne faudrait pas craindre de faire l'extraction dont nous venons de parler ; sauf, toutefois, à prendre soigneusement toutes les précautions d'abatage et de vidange, prescrites plus haut pour les futaies régulières [478 et 479]. Le dommage qu'une pareille exploitation peut occasionner, sera, dans tous les cas, bien inférieur à celui que cause-

raient, par la suite, des arbres branchus s'étalant de plus en plus au-dessus de la jeune forêt.

2° *Quand la quantité des arbres est considérable, et qu'ils dominent un sous-bois jeune qui offre tous les signes d'une bonne végétation, sans cependant être assez vigoureux pour pouvoir être exposé tout de suite à l'air et au soleil, il convient d'effectuer d'abord une exploitation semblable à la coupe secondaire, puis de la faire suivre plus tard de la coupe définitive, lorsque les jeunes plants seront suffisamment acclimatés.*

3° Enfin, si, sous de nombreux arbres, il existe un sous-bois entièrement rabougri par suite du couvert épais qui l'a étouffé trop longtemps, il faut se garder de vouloir élever une futaie avec de pareils sujets, qui ne parviendraient jamais à un beau développement; il est préférable de sacrifier ce mauvais repeuplement et de disposer le terrain à la reprise d'un nouveau semis naturel. Dans les bois résineux, les arbres existants suffiront en général pour l'ensemencement; néanmoins il pourrait arriver que, sur quelques points, ils ne fussent pas assez nombreux pour procurer l'abri nécessaire à des plants délicats, tels que ceux du sapin, par exemple; dans ce cas, il conviendra de suppléer à ce manque d'abri au moyen du sous-bois rabougri lui-même, qu'on ne coupera point, ou qu'on ne coupera qu'en partie, selon le tempérament de l'essence, afin de laisser aux nouveaux brins le temps de se fortifier assez pour ré-

sister aux influences atmosphériques. Plus tard, on extraira le sous-bois rabougri par forme de nettoyage (1).

Dans les bois feuillus, le moyen de régénération sera plus prompt et plus facile, toutes les fois que les brins mal venants garniront entièrement le terrain ; en effet, il suffira d'avoir recours à un recépage (2) en faisant abattre en même temps tous les vieux ar-

---

(1) Lorsque le sapin est l'essence dominante, bon nombre de ces sous-bois rabougris, une fois débarrassés d'un couvert trop épais, se ravivent très-souvent et s'élancent avec une vigueur qui semble d'autant plus grande que leur végétation a été plus longtemps comprimée. Aussi, est-ce le cas de les conserver, toutes les fois qu'ils forment des bouquets ou petits massifs pouvant se relier avec les parties nouvellement réensemencées [302], à moins qu'ils ne soient entièrement dépérissants. Les épicéas résistent moins longtemps sous le couvert que les sapins, et une fois rabougris se récupèrent plus difficilement ; toutefois, en bon fonds, ils se rétablissent entièrement, pourvu qu'on ait soin de ne pas les faire passer trop brusquement de l'état couvert à l'extrême opposé. Quant au pin, que l'on voit rarement, au surplus, à l'état de forêt jardinée, on sait qu'il ne supporte pas d'être surmonté, et une fois rabougri sous cette influence, il ne se rétablit plus. C'est ainsi que l'on trouve dans certaines pineraies irrégulières (forêt de Haguenau) des gaulis et des perchis incomplets et chétifs qui, découverts trop tard, quoique depuis assez longtemps, demeurent languissants et stationnaires. Evidemment c'est le pire des états, et mieux vaudrait la perte entière, car de tels peuplements resteront toujours misérables et tiennent la place d'autres qui eussent été infiniment plus productifs.

(2) Il est essentiel que ce recépage se fasse tout à fait à fleur de terre, afin de donner aux rejets une assiette solide, et d'éviter qu'il ne s'en présente un trop grand nombre sur la même souche.



brès. Ce recépage effectué sur des brins d'un faible diamètre, fera naître de beaux rejets qui, dans peu d'années, auront pris une assiette et une végétation presque entièrement semblables à celles de brins de semence. Mais si les sujets rabougris étaient moins nombreux et déjà forts, il vaudrait mieux prendre de parti de les déraciner, afin d'obtenir un repeuplement nouveau et complet, et d'empêcher que les rejets qui résulteraient du recépage ne vinssent à gêner ou à étouffer les jeunes brins de semence.

Lorsque l'essence sera le hêtre, on fera mieux, en général, de viser à une régénération par la graine, cet arbre étant peu disposé à se reproduire de souche. Les différents sols, ainsi que le climat, exercent à cet égard une grande influence. C'est au forestier à juger ces causes locales et à s'assurer, par des expériences faites en petit, de la faculté reproductive des souches. S'il existe le moindre doute sous ce rapport, il ne tentera pas le recépage, et cherchera, au contraire, à amener un nouvelensemencement. Il pourra aussi, si le sous-bois n'est pas rabougri au dernier degré, se contenter de le débarrasser des arbres qui le dominent, et le laisser croître tel qu'il est. Cet expédient se fonde sur un fait bien constant : c'est que le hêtre possède, comme le sapin et plus que lui peut-être [502], la propriété de regagner de la vigueur, lors même qu'il a langué pendant fort longtemps sous le couvert; et il n'est pas rare de

lui voir prendre une belle croissance dès que les arbres qui l'offusquaient ont disparu (1).

538. Tels sont les principaux états de peuplement qu'on rencontre dans les forêts jardinées; elles en présentent sans doute encore un grand nombre d'autres, mais qui ne sont (soit sous le rapport de l'âge, soit sous le rapport de la consistance) que des nuances plus ou moins tranchées de ceux que nous venons de décrire, et dont le traitement doit, par conséquent, se rapprocher plus ou moins des règles que nous avons données.

Ce qui rend surtout difficiles les coupes de transformation, c'est que toutes ces différentes nuances de peuplement se rencontrent pêle-mêle sur une étendue souvent très-peu considérable, et qu'il faut alors changer de mode de traitement presque à chaque pas. Pour réussir dans ces opérations, l'essen-

---

(f) Nous pouvons citer un exemple à l'appui de cette assertion.

Un jeune bois de hêtre, dans une situation élevée des Vosges, en très-mauvais état de croissance par suite d'abrutissement, et surmonté d'un assez grand nombre de vieux arbres, paraissait réclamer le recépage. Incertain sur le succès de cette opération, et craignant le déboisement de cette partie de forêt, si les hêtres ne repoussaient pas, nous contentâmes de les mettre en défens et de les abandonner à eux-mêmes, après les avoir débarrassés des arbres qui les dominaient. Ils n'ont pas tardé à végéter avec assez de force et à gagner en hauteur; il y a trente-six ans maintenant que les bestiaux ont été éloignés de cette jeune forêt, et qu'on a fait disparaître les vieux arbres, et sa végétation continue à être des plus satisfaisante. Le bas des tiges seulement a une forme défectueuse, mais qui ne peut être d'aucun inconvénient pour le hêtre, puisqu'il n'est employé qu'au chauffage et au travail.

tiel est d'avoir toujours bien présent le but que l'on veut atteindre. Ce but est d'égaliser, autant que possible, la croissance des bois, *de manière qu'ils puissent, bien que différents d'âge par places, s'élever ensemble sans trop s'entraver, et parvenir en même temps à une exploitabilité moyenne.*

Cette règle, qui est fondamentale du traitement des forêts jardinées, exige qu'on se défende constamment, dans l'application, contre la tendance bien naturelle à tout forestier de chercher à élever des peuplements parfaitement réguliers. Souvent, par exemple, on serait tenté de faire disparaître certains bouquets de perchis assez âgés déjà, parce qu'ils sont environnés de fourrés et qu'il serait possible de provoquer un nouveau repeuplement qui se raccorderait mieux avec ceux-ci. Une telle suppression serait cependant une faute, car, souvent répétée, elle entraînerait des pertes considérables d'accroissement, et dans les situations où les semis naturels ou artificiels réussissent difficilement, elle peut même offrir des dangers. Il est donc très-important de se bien consulter avant que d'abattre, dans les coupes de transformation, d'autres bois que ceux qui, par leur âge, leurs dimensions ou leur position isolée, ne peuvent évidemment faire partie du massif *quasi-régulier* qu'il s'agit de constituer. C'est ce massif qui procurera un jour le peuplement normal que l'on a en vue; mais il faut savoir attendre ce résultat et ne pas lui faire plus de sacrifices que de raison.

## ARTICLE III.

## Marche des coupes de transformation.

539. Lorsqu'une forêt jardinée doit, par des coupes de transformation, être ramenée à l'état régulier, la marche de ces coupes peut être réglée d'une manière analogue à celle que nous avons appris à connaître pour les futaies régulières [473]. Il est à observer toutefois, que le jardinage ne saurait être supprimé dans une telle forêt, en raison de l'état assez uniforme qu'elle présente dans son irrégularité. En effet, le plus souvent, il existe, sur tous les points, des arbres exploitables entremêlés avec d'autres de l'âge moyen et du premier âge; or, si l'on se contentait d'établir une suite de coupes de transformation qui se succéderaient de proche en proche, il est évident qu'un grand nombre des arbres, qui dès à présent sont mûrs ou sur le retour, périraient avant que les coupes vinssent les atteindre. Il faut donc, de toute nécessité, que dans le nouveau mode d'exploitation, ces arbres soient enlevés à temps, et c'est dans ce but que le jardinage doit être continué.

Ainsi, pour ramener une forêt jardinée à l'état régulier, on doit établir deux exploitations distinctes : d'une part les coupes de transformation, de l'autre, les jardinages d'arbres mûrs et dépérissants. Nous verrons dans ce qui va suivre, comment ces deux exploitations se combinent et convergent vers le but proposé.

540. La révolution à employer pour opérer la transition de l'état jardiné à l'état régulier, révolution que nous nommerons *transitoire*, doit être abrégée autant que possible; toutefois, il faut qu'elle soit assez longue pour qu'à son expiration, la forêt présente des parties de bois parvenues à leur exploitabilité, ou du moins qui en approchent. Le terme de la révolution transitoire dépendra donc principalement de l'âge des jeunes massifs, créés par les coupes de transformation qui auront été faites les premières. Cette révolution, de même que celle d'une futaie régulière, devra être divisée en périodes, dont chacune aura son affectation sur le terrain.

Mais en déterminant ces affectations, on cherchera principalement à favoriser l'amélioration future de la forêt et à observer les règles d'assiette, afin d'établir pour l'avenir une succession aussi régulière que possible dans les coupes. De tels résultats, au cas particulier surtout, sont bien plus importants à obtenir qu'une grande égalité dans la production des périodes. Cette égalité est d'ailleurs d'autant plus difficile à atteindre en général, que l'irrégularité du peuplement est plus grande, que les arbres présentent moins de similitude sous le rapport de leurs formes et de leurs dimensions, et enfin que les influences sous lesquelles ils végètent sont plus diverses, toutes circonstances que la forêt jardinée réunit au plus haut degré. Pour parvenir à assurer le rapport soutenu dans une forêt jardinée qu'on veut

transformer, nous pensons que le meilleur moyen, peut-être, et en même temps le plus simple, est d'y multiplier les séries d'exploitation, de manière à bien trier les principales nuances de fertilité et de peuplement, puis, de régler les affectations des périodes, dans chacune de ces séries, par contenance égale (1).

Supposons que l'on adopte les principes qui viennent d'être posés, et que, par suite, la révolution transitoire d'une série d'exploitation ait été fixée à 75 ans, au lieu de 100 qui serait la durée ordinaire, puis partagée en périodes de 25 ans chacune; et examinons quelle sera la marche des exploitations, pendant toute cette révolution, de période en période.

---

(1) En effet, dans la forêt jardinée, il n'existe pas, comme dans la futaie régulière, des peuplements d'âges gradués; tous les âges au contraire s'y trouvent confusément mêlés. Sous ce rapport donc, les mêmes difficultés comme les mêmes facilités se rencontreront dans une même série, qu'elle soit grande ou petite. Il suit de là que, pour constituer chacune d'elles, il serait superflu de se préoccuper de la gradation des âges; la qualité et la configuration du sol devront seules être considérées, ce qui, le plus souvent, donnera la facilité de ne comprendre dans une même série que des parties ayant à peu près le même coefficient de fertilité. Quant à la formation des affectations périodiques, comme le coefficient de peuplements aussi complètement irréguliers que ceux de la forêt jardinée ne saurait évidemment se déterminer avec la précision nécessaire pour y avoir confiance, le mieux, dans la plupart des cas, sera de n'en pas tenir compte. Dès lors, il ne restera comme élément de cette opération que la fertilité qui, sensiblement la même partout, permettra d'attribuer aux affectations des contenance égales.

**541. EXPLOITATION DE LA 1<sup>re</sup> PÉRIODE.** — C'est dans l'affectation de cette période que commenceront les coupes de transformation; on les effectuera d'après les règles données dans l'article précédent, et l'on fera bien, en outre, afin d'aider autant que possible la végétation du sous-bois sur toute l'étendue de l'affectation, de les accompagner d'ébranchements de gros arbres, dans les parties qui ne viendront en tour d'exploitation que dans la dernière moitié de la période.

Parallèlement à ces coupes de transformation, marcheront dans les affectations des périodes 2 et 3, les exploitations jardinatoires dont nous avons parlé plus haut. Ces exploitations, comme nous l'avons dit, sont plus particulièrement destinées à faire disparaître les bois que l'on ne pourrait laisser sur pied jusqu'à ce que les coupes de transformation vinssent les atteindre. On peut joindre encore à ce but, celui de préparer insensiblement la forêt à l'état plus régulier auquel elle doit, plus tard, être amenée définitivement, et, dans cette vue, faire porter le jardinage, autant que possible, sur les arbres dont la présence nuit à de nombreux sous-bois, en même temps qu'on enlèvera, par forme d'éclaircie, les tiges dominées dans les perchis. Dans l'affectation de la seconde période, ces jardinages devront se borner aux arbres entièrement dépérissants; mais dans celle de la troisième, ils devront porter aussi sur les arbres en retour.

Par ce moyen, les produits, pendant la première période, pourront atteindre le taux où ils étaient avant que la transformation commençât, et dans certains cas même le dépasser.

542. DÉTERMINATION DE LA POSSIBILITÉ. — La possibilité des coupes de transformation doit être basée sur le volume et se déterminer à l'entrée de chaque période [426 et 427], comme celle des coupes de régénération dans une futaie régulière. Ces exploitations ne sont, en effet, que des coupes de régénération, modifiées en raison d'un état particulier de peuplement, et nous avons vu ailleurs [475] les motifs qui empêchent que celles-ci ne soient établies par contenances égales. L'irrégularité du peuplement seule, au surplus, serait un motif suffisant pour renoncer à la possibilité par contenance.

On doit s'attendre à ce que la possibilité dans la forêt jardinée soit affectée d'une erreur bien plus considérable que dans la futaie régulière; nous en avons donné plus haut les motifs. Aussi est-il tout à fait indispensable de vérifier le travail d'estimation plusieurs fois dans le cours de la période. Il est inutile de faire observer que, dans cette estimation, on ne devra comprendre que ceux des arbres que l'on jugera devoir tomber dans les coupes de transformation.

543. Le point le plus difficile à régler dans l'exploitation qui nous occupe, c'est la quotité des produits que doivent fournir annuellement les jardinages.



Dans l'affectation de la deuxième période, avons-nous dit, ces coupes devront se borner aux arbres dépérissants, et dans l'affectation de la troisième période, elles devront atteindre, en outre, des bois en retour. Si donc on voulait, procéder rationnellement, pour déterminer le volume à exploiter par an dans l'une et l'autre affectation, il faudrait avoir une évaluation des arbres dépérissants et de ceux qui pourront le devenir avant que les coupes de transformation parviennent dans les parties où ils se trouvent; et pour ce qui concerne l'affectation de la troisième période en particulier, il faudrait connaître encore la quantité d'arbres en retour qui devront tomber par les jardinages.

Mais, outre qu'un pareil inventaire exigerait de fort longs comptages d'arbres, il présenterait encore dans l'exécution une multitude de cas très-embarrassants, en ce qu'il serait souvent fort difficile de décider d'avance, si tel arbre devra être compris ou non dans les jardinages. Ensuite, il est évident que si, pour fixer la possibilité des coupes de transformation, on est sujet à commettre de graves erreurs, on l'est à plus forte raison pour déterminer celle des jardinages. Et cependant, ici, toute vérification dans le cours de la période est à peu près impossible, à moins d'imprimer aux arbres destinés aux jardinages un signe qui les distingue de leurs voisins, ce qui, en vérité, n'est guère proposable, et dans beaucoup de cas, ne serait pas même efficace.

Baser la possibilité des jardinages sur le volume nous semble donc tout à fait impraticable, parce que l'opération, longue et difficile à exécuter, ne peut aboutir qu'à des résultats extrêmement vagues, et susceptibles de donner naissance à des erreurs pires peut-être que celles qu'engendrerait un entier arbitraire.

Toutefois, il faut le reconnaître, une base quelconque est nécessaire pour ces exploitations. Peut-être la trouverait-on en se reportant à l'ancien jardinage, dont la possibilité, comme on sait, se fixait en déterminant le nombre d'arbres à couper annuellement par hectare [585]. Supposons, par exemple, que ce nombre ait été 5; on le réduirait à 1 ou à 2 dans l'affectation de la seconde période, où il ne s'agit d'atteindre que des bois dépérissants; et dans l'affectation de la 3<sup>e</sup> période où il faut faire tomber en outre des bois en retour, on porterait ce nombre à 3 ou à 4. Puis, si l'on croyait utile d'exprimer approximativement ce nombre d'arbres en mesure de solidité, il suffirait de déterminer, dans chaque affectation, par quelques expériences, le volume d'un arbre moyen de la catégorie que le jardinage doit atteindre; multipliant ensuite, par ce chiffre, le nombre des arbres à couper annuellement, on aurait la possibilité cherchée.

Cette manière de procéder est sans doute peu satisfaisante, en ce que, bien évidemment, elle ne conduit pas au degré d'approximation qu'il est per-

mis de désirer. Mais, du moins, elle a le mérite d'être expéditive et de n'occasionner ni frais ni perte de temps dans des recherches auxquelles l'état des choses interdit le succès. On peut d'ailleurs, chaque fois que l'on vérifiera la possibilité des coupes de transformation, soumettre aussi à un nouvel examen la base des jardinages et leurs résultats. Sans entrer dans des opérations de détail, le forestier entendu saura bien juger, autant qu'il en sera besoin, si la catégorie d'arbres qu'il veut atteindre par les coupes jardinatoires, augmente ou diminue plus qu'elle ne le doit, et s'il convient, par conséquent, d'abaisser ou d'élever le taux des produits que doivent fournir ces coupes (1).

544. En terminant cette discussion, nous rappellerons ce que nous avons dit plus haut :

Dans l'exploitation d'une forêt jardinée, la chose principale est la transformation, parce que d'elle doit résulter un état infiniment supérieur à ce qui existe, et dont la conséquence sera l'augmentation de la production. La possibilité n'est que secondaire, c'est en vain que l'on tenterait de la régler avec la même approximation que dans une futaie régulière; l'état du peuplement y met des obstacles insurmontables. Aussi les moyens les plus simples, les plus larges et les plus expéditifs pour la déterminer nous paraissent-ils les meilleurs.

---

(1) Voir l'appendice.

**545. EXPLOITATION DES PÉRIODES 2 ET 3. —** Dans l'affectation de la deuxième période, les coupes de transformation trouveront une plus grande quantité de bois à abattre que dans celle de la première, les jardinages y ayant été réduits, depuis vingt-cinq ans, aux arbres tout à fait dépérissants; la possibilité de ces coupes se trouvera donc augmentée. Quant aux produits que les jardinages fournissaient pendant la première période, ils seront compensés d'une part par les opérations semblables qui continueront dans l'affectation de la troisième période, et de l'autre par des éclaircies périodiques qu'il y aura lieu d'entreprendre dans l'affectation de la première.

Enfin, à la troisième période, les coupes de transformation trouveront la forêt peuplée, en très-grande partie, de bois mûrs et d'une exploitabilité moyenne, qui tous devront être coupés, et dont les produits seront renforcés encore par ceux des éclaircies périodiques à faire dans les affectations des deux périodes précédentes.

**546.** Les inconvénients du jardinage ayant été reconnus en France depuis une trentaine d'années, ce mode d'exploitation a presque généralement (du moins dans les forêts soumises au régime forestier), fait place à des coupes dans lesquelles on s'est appliqué à débarrasser d'un couvert nuisible les peuplements jeunes ou d'âge moyen, et à supprimer partout les bois morts ou dépérissants que beaucoup de forêts présentaient en abondance; en même temps on a

pratique des éclaircies périodiques dans les jeunes massifs suffisamment réguliers qui se rencontraient çà et là. C'était, on le voit, une véritable transformation que l'on opérait ainsi. Seulement on s'est borné, le plus souvent, à améliorer le traitement sans régler en même temps la marche des exploitations d'après les principes que nous venons de donner. On trouve donc aujourd'hui bon nombre de forêts qui, régularisées en partie, ne présentent plus l'état jardiné que dans quelques cantons, le surplus se composant de massifs plus ou moins réguliers, fourrés, penchis ou futaie exploitable ou à peu près.

Lorsque ces différents états de peuplement se trouveront convenablement groupés, on conçoit qu'il sera assez facile d'en composer une ou plusieurs séries d'exploitation dans lesquelles les parties jardinées deviendraient l'affectation de la première période, les massifs exploitables, celle de la seconde, et ainsi de suite. La révolution de 100 ou 120 ans, pourra, dans ce cas, être immédiatement admise, afin d'établir, pour les révolutions suivantes, une gradation d'âge aussi normale que possible; et, quant au rapport soutenu, si l'on ne réussit pas toujours à l'assurer pour une même série, on y parviendra, du moins dans les masses importantes, en considérant comme liées entre elles un certain nombre de séries dont les produits pourront se compenser à travers les différentes périodes de la révolution [420].

Mais le cas que nous venons de considérer est à la fois le plus simple et le plus rare. Le plus souvent, les peuplements qu'il s'agit de réunir en série présentent sous ce rapport de sérieuses difficultés : tantôt les parties jardinées ont trop d'étendue pour ne composer qu'une seule affectation, ou trop peu pour en fournir deux, et les massifs exploitables que l'on pourrait y rattacher à titre de complément font défaut; tantôt ce sont les bois d'âge moyen ou les jeunes bois qui ne sont pas représentés ou qui ne le sont pas suffisamment; tantôt enfin, les peuplements de chaque catégorie sont dispersés, ce qui met obstacle à ce qu'on en compose une même affectation.

Soumettre de telles forêts immédiatement à une révolution normale n'est évidemment pas possible. Ce que l'on doit chercher ici, c'est d'achever de régulariser les différents peuplements, surtout les parties jardinées, dans le cours d'une période transitoire dont la durée dépendra de deux circonstances : le plus ou le moins d'urgence qu'il y aura à extraire les bois destinés à disparaître, et l'âge actuel des massifs qui devront venir en tour d'exploitation après la transformation terminée, c'est-à-dire, devenir la première affectation de la révolution qui succèdera à la période transitoire. Il va sans dire d'ailleurs que, comme dans le premier cas, et bien plus encore, il sera souvent opportun et même nécessaire pour assurer le rapport soutenu, d'admettre la compensation de série à série pour une ou plusieurs périodes.

547. Malgré les longs développements dans lesquels nous sommes entrés au sujet des forêts jardinées, on trouvera toujours encore, dans la pratique, des cas nombreux qui n'auront point été prévus. Dans toutes les forêts irrégulières, et surtout dans les forêts jardinées, il est impossible de prévoir tous les états qui peuvent se présenter; la théorie doit donc se borner aux cas les plus généraux, et laisser le coup d'œil et l'expérience du forestier faire le reste.

C'est dans des bois de cette nature que l'instruction forestière est de la plus grande nécessité, non l'instruction qui prétend tout régler d'avance, mais celle qui, aidée de la réflexion et du jugement, établit des bases qu'elle sait appliquer et étendre à propos.

#### ARTICLE IV.

Des cas où le jardinage doit être conservé.

548. Quelque incontestable que soit l'infériorité du mode jardinatoire comparé à la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies, il est néanmoins quelques cas où il convient de faire usage de ce mode.

Ainsi, dans certaines situations très-élevées, où le climat extrêmement rude est souvent un obstacle à la réussite des repeuplements, le jardinage peut être avantageux, d'abord parce qu'il donne la facilité

de n'enlever les vieux arbres que lorsque déjà il en existe de jeunes autour d'eux pour les remplacer ; en second lieu, parce qu'il n'éclaircit jamais la forêt que par petites places, dans lesquelles les repeuplements résistent plutôt aux rigueurs du climat que sur des surfaces plus grandes.

Le jardinage trouve aussi son application dans les parties de bois que l'on conserve plus particulièrement pour abriter une localité, soit contre des vents dangereux, soit contre des avalanches ou des éboulements [404 et 434], et il en est de même dans certains versants abruptes, couverts de rochers entre lesquels les bois ne peuvent croître que, çà et là, par bouquets, et où le peu de terre végétale, qui a réussi à s'y former, a d'ailleurs le plus grand besoin de couvert pour se maintenir. En pareil cas, l'objet principal de la culture n'est plus la production du bois, mais bien de conserver l'abri reconnu nécessaire ; il faut donc, dans les exploitations, tendre à maintenir la forêt dans un état de boisement qui varie le moins possible, et s'appliquer par conséquent, à n'amener que des repeuplements partiels, au fur et à mesure de la coupe des arbres tout à fait dépérissants.

Enfin, ce mode peut encore convenir à quelques propriétaires, communes, établissements publics ou particuliers, qui, ne possédant que des bois d'une faible étendue, veulent cependant trouver à y exploiter chaque année des pièces de dimensions diverses.



549. Mais lorsque le jardinage devra être maintenu, au lieu de le pratiquer comme autrefois et tel que nous l'avons décrit plus haut [535], on s'appliquera à en atténuer les inconvénients et à le concilier avec un certain ordre dans la marche des exploitations. Il est difficile de tracer des règles pour un traitement aussi essentiellement irrégulier que le jardinage; toutefois, on peut poser quelques principes généraux qui devront se modifier suivant les exigences du propriétaire et d'après les circonstances particulières que présente chaque forêt.

Pour établir un jardinage rationnel, il convient d'abord de diviser la forêt en *parcelles*, circonscrites, autant que possible, dans les limites naturelles, crêtes de montagnes, fonds de vallées, ruisseaux, et surtout par des chemins pouvant, lors des exploitations, servir à vider les bois sans endommager les parties voisines. Ces parcelles devront être assez nombreuses pour que les jardinages annuels puissent se renfermer dans l'une d'elles ou tout au plus dans deux.

Le parcellaire établi, on déterminera l'ordre dans lequel les parcelles devront être parcourues par les jardinages, en ayant égard à leur peuplement tant en jeunes qu'en vieux bois et en tenant compte des règles d'assiette; puis enfin, on y fixera la périodicité des jardinages, c'est-à-dire, le nombre d'années à employer pour parcourir toutes les parcelles d'une série.

Pour régler ce dernier point, il sera nécessaire de déterminer : 1° Quel âge et quelle grosseur les bois devront avoir atteints pour être *réputés exploitables* ; 2° Quel sera le nombre d'années qui devra s'écouler pour que les bois de la catégorie immédiatement inférieure soient parvenus à la qualité de bois exploitables. Ce laps de temps, toutefois, ne pourra être qu'une moyenne qu'il sera prudent d'allonger plutôt que de trop raccourcir, afin de tenir compte de l'imprévu dans la végétation ; sa durée fera évidemment connaître la périodicité cherchée.

Quant à la possibilité, on conçoit qu'elle ne pourra être basée que sur le volume ; soit qu'on calcule celui-ci comme pour les coupes de transformation [542], en estimant le volume actuel et le volume futur de tous les bois réputés exploitables ; soit qu'on se contente de fixer le nombre de pieds d'arbre à exploiter annuellement, ce qui suppose toujours qu'on se sera rendu compte , avec plus ou moins de précision, de leur nombre total et du volume de l'arbre moyen.

Le jardinage lui-même se fait d'après les règles suivantes :

1° L'exploitation portera en première ligne sur les arbres branchus de forte dimension qui surmontent, soit des perchis, soit des fourrés ou des gaulis.

Si, sur ces derniers, il se trouve çà et là des perches isolées qui ne pourront jamais faire massif avec l'en-

semble, et entravent par conséquent sa croissance, elles devront également être extraites quel que soit leur âge.

2° Au lieu de n'enlever, à la fois, qu'un seul arbre exploitable sur une même place, ainsi que le voulait l'ancien jardinage, il faudra, au contraire, y en abattre plusieurs, de manière à favoriser l'accès de la lumière sur le sol autant qu'il sera nécessaire pour assurer la levée du jeune plan et son développement pendant un certain nombre d'années. On trouvera la juste mesure à cet égard, en se pénétrant bien de ce principe : que si l'ombrage des arbres est presque toujours avantageux aux sous-bois, leur couvert produit généralement l'effet contraire (1).

3° Outre les bois exploitables proprement dits qui formeront le produit principal de l'exploitation annuelle, les jardinages devront faire disparaître encore, dans la parcelle où ils seront assis, tous les bois rabougris et dominés sur lesquels porteront les éclaircies périodiques dans les futaies régulières.

4° Les chablis et bois morts seront exploités chaque année dans toute la série, et leur produit sera précompté sur la possibilité. Dans les parcelles qui ne seront pas prochainement atteintes par les coupes jardinatoires, les vieux bois qui causent un notable

---

(1) Voir, dans le IV<sup>e</sup> livre, les définitions de l'*ombrage* et du *couvert*.

dommage par leur couvert devront être élagués à une hauteur convenable.

5° Enfin, toutes les précautions recommandées pour l'abatage et la vidange des bois dans les futaies régulières [478], devront être observées avec le plus grand soin dans les forêts jardinées (1).

---

(1) Voir l'appendice.

---

---

## CHAPITRE QUATRIÈME.

---

### EXPLOITATION DES FUTAIES IRRÉGULIÈRES,

QUI ONT ÉTÉ SOUMISES

AU MODE DIT A TIRE ET AIRE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

De l'état de ces forêts en général.

550. Outre les forêts jardinées, il existe encore, en France, d'autres futaies irrégulières qui, le plus souvent, ont pour essences dominantes le chêne et le hêtre. Leur état est d'ordinaire peu satisfaisant, et provient, en général, du mode d'exploitation dit *à tire et aire*, auquel ces bois étaient soumis en vertu d'anciennes ordonnances.

Ce mode, qui semble avoir été conçu dans le but de remédier aux nombreux abus nés du jardinage [535], consistait surtout à asseoir les coupes *par contenances égales, de proche en proche et*

*sans rien laisser en arrière* (1). Quant aux arbres de réserve, ils étaient peu nombreux dans les coupes, et celles-ci une fois vidées, restaient abandonnées pendant tout le cours de la révolution, sans qu'on y fit aucune exploitation, ni pour assurer les conditions du repeuplement naturel [459], ni pour favoriser la croissance des jeunes bois [465]. L'ordonnance des eaux et forêts de 1669, par exemple, qui a généralisé l'application du mode à tire et aire et dont les dispositions sont demeurées en vigueur jusqu'à la promulgation du Code forestier (2), portait : que la réserve dans les coupes de futaie serait de dix arbres par arpent (20 par hectare) ; et du reste elle ne permettait point, ainsi que nous venons de le dire, que dans une même révolution, ces coupes fussent soumises à plusieurs exploitations.

Il résultait d'un tel mode, que les bois, jusqu'à leur maturité, croissaient en massif trop serré pour acquérir de belles proportions et une texture forte [470] ; puis, les arbres réservés dans les coupes, étant en trop petit nombre, devenaient insuffisants pour assurer le repeuplement du terrain. Ce dernier inconvénient était d'autant plus ordinaire, que beaucoup de réserves étaient la proie des vents ou séchaient après peu d'années, par suite de la transi-

---

(1) Voyez *Dictionnaire des Forêts* par Baudrillart, page 913.

(2) 1<sup>er</sup> août 1827.

tion trop brusque de l'état serré à l'entier isolement. Enfin, l'exploitation à tire et aire, en dénudant le sol, donnait accès aux herbes et aux ronces, aux arbustes, aux morts-bois et aux bois blancs, toutes plantes qui s'opposaient à la propagation et à la crûe des essences d'élite, et absorbaient les sucres nourriciers, sans rendre à la terre l'engrais que la futaie fournit en abondance.

551. Toutefois, quand l'année même de la coupe ou peu d'années auparavant, les graines avaient réussi, on voyait, sous ces essences, paraître un repeuplement considérable, mais qui, selon le tempérament des jeunes plants, souffrait plus ou moins dans cet état. Si c'étaient des chênes, ils ne tardaient pas à languir, et la plupart finissaient par succomber; si c'étaient des hêtres au contraire, ils résistaient mieux et souvent assez longtemps pour parvenir en définitive à lutter avec avantage contre les bois blancs et les morts-bois; surtout lorsque ceux-ci, par leur âge et après avoir dépensé une partie notable des substances nourricières du sol, commençaient à croître avec moins de force et même à périr partiellement (1). Cependant, leur influence nuisible se faisait

---

(1) C'est ainsi que l'on peut expliquer comment, dans nos futaies d'aujourd'hui, le chêne se perd presque généralement, tandis que le hêtre s'y est conservé assez bien, malgré les entraves que lui créait le mode d'exploitation dans les vingt ou trente premières années de son existence et le retard considérable qui en résultait pour son accroissement. (Voyez Dralet, *Traité du hêtre*, page 79.)

toujours sentir, et les arbres de réserve que l'on était forcé de laisser subsister jusqu'au retour de la coupe, s'étendant librement en branches, contribuaient encore à ralentir la végétation des bonnes essences.

Mais de tels résultats, évidemment les plus heureux que pût produire le mode à tire et aire, étaient bien plutôt l'exception que la règle. Le plus souvent ce mode avait des conséquences beaucoup plus fâcheuses, ainsi que nous l'avons dit d'abord; et que le prouvent d'ailleurs les vastes terrains couverts de bois tendres ou même entièrement dépeuplés, que l'on rencontre en si grand nombre dans nos futaies d'aujourd'hui.

552. Comme on le voit, les futaies traitées jusqu'alors à tire et aire offrent, en général, des repeuplements très-diversement irréguliers, presque tous incomplets et vicieux, et qui réclament un prompt remède pour ne pas le devenir davantage. Sauver les bonnes essences en faisant disparaître les causes qui entravent leur végétation, leur rendre la totalité du terrain et établir ainsi la production sur des bases meilleures, hâter enfin le moment qui rendra possible l'introduction complète de la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies, tel doit être le but du traitement actuel de ces forêts.



## ARTICLE II.

## Des coupes de transformation.

553. Pour réaliser la transformation qui vient d'être indiquée, il est nécessaire de se rendre compte des divers états de peuplement que présentent d'ordinaire les forêts dont il s'agit. On peut classer ces peuplements en quatre catégories principales :

- 1° Les restes de vieilles futaies;
- 2° Les perchis;
- 3° Les gaulis et les fourrés;
- 4° Les parties totalement ruinées.

554. Bien que les vieilles futaies soient fréquemment clair-plantées, le nombre d'arbres y est cependant, en général, suffisant pour procurer le repeuplement naturel, à l'aide des coupes de régénération, et souvent même on y trouve des parties qui sont dans un très-bel état de végétation et de massif. Leur traitement rentre donc dans l'application pure et simple de la méthode du réensemencement naturel et ne présente aucune difficulté.

555. Dans les perchis, on retrouve ordinairement les anciens arbres de réserve qui ont gêné et gênent encore la végétation des jeunes bois; on y trouve ensuite, en plus ou moins grande quantité, des bois blancs dont la présence est également nuisible.

Nous parlerons d'abord des anciennes réserves.

Lorsque les arbres sont en très-petit nombre, et que l'on croit pouvoir les extraire sans causer trop de dégâts, on doit le tenter, quel que soit l'âge du perchis, en apportant, dans l'abatage et dans la vidange, toutes les précautions possibles. Mais lorsque les réserves sont plus nombreuses ou qu'elles sont rassemblées par places, comme cela se voit dans certaines forêts où l'ordonnance n'a pas toujours été strictement observée, ce serait une faute de les abattre toutes. Dans ce cas, en effet, le perchis qui se trouve parmi les réserves a crû dans une gêne extrême, causée par les cimes volumineuses des arbres; les tiges qui le composent se sont élancées, mais ne recevant qu'incomplètement l'action de la lumière et manquant d'espace pour prendre du corps, elles ont un diamètre beaucoup trop faible, proportionnellement à leur hauteur, et ne se soutiennent contre les intempéries, que par l'appui que leur prêtent les branches des arbres entre lesquels elles se sont élevées. Si donc cet appui leur était enlevé subitement, elles périraient inévitablement victimes des vents, des neiges et du givre. De là, la nécessité de chercher à améliorer cet état de choses sans courir le danger que nous signalons.

On y parviendra, en se bornant à couper les réserves entièrement dépérissantes, et en faisant élaguer (1) périodiquement les autres, de manière à

---

(1) Dans cet élagage, les branches servant d'appui au perchis ne de-

donner insensiblement plus d'air au perchis et à favoriser sa croissance en grosseur, sans cependant le priver de l'appui qui lui est indispensable. Par ce moyen, les jeunes tiges finiront par prendre de la consistance, et le repeuplement, dans son ensemble, pourra être conduit, dans un état convenable, jusqu'au terme de son exploitation.

Cependant, si sur un point on trouvait de nombreuses réserves, et qu'elles fussent toutes déperissantes, il faudrait se décider, malgré la perte momentanée qu'on en éprouverait, à laisser sur pied celles que l'on jugerait indispensables pour soutenir le perchis, dût-on courir la chance de les voir périr entièrement. Il est évident, en effet, que mieux vaudrait, dans ce cas, sacrifier une partie des produits actuels, que de risquer l'existence du peuplement entier.

Quant aux bois blancs que l'on rencontre dans les perchis, en plus ou moins grand nombre, il convient de les extraire en même temps que les anciennes réserves. Mais, comme pour celles-ci, il faut avoir égard à l'effet que cette extraction pourra produire, et la modifier selon qu'il en sera besoin.

Ainsi, lorsque les bois blancs seront mélangés aux bonnes essences dans un faible rapport, ils de-

---

vront pas être coupées entièrement; il convient, au contraire, de se borner à les racourcir, afin que, tout en donnant aux perches plus d'espace, elles continuent cependant encore à les appuyer.

vront être coupés sans exception ; au contraire, quand ils formeront une partie assez notable du peuplement pour qu'on ne puisse les enlever sans détruire le massif, il faudra en réserver le nombre indispensable à la conservation des tiges de bonnes essences. Plus tard, il y aura lieu de faire disparaître ces bois blancs par un second nettoisement, si les ~~bonnes essences~~ sont assez nombreuses pour pouvoir, à une époque donnée, former le massif à elles seules ; dans le cas contraire, on devra les laisser sur pied, même jusqu'à leur entier dépérissement, sauf seulement à en enlever de temps à autre quelques-uns, afin d'aider au développement des perchis de bonne essence.

Il est sans doute inutile de dire que, quand l'état du perchis indiquera la nécessité d'une éclaircie périodique, soit partielle, soit générale, elle devra s'exécuter en même temps que les deux opérations dont il vient d'être parlé.

556. Dans les gaulis et dans les fourrés on retrouve, de même que dans les perchis, les anciennes réserves et les bois blancs.

Ces derniers, associés aux morts-bois et à divers autres arbustes nuisibles, sont ordinairement en très-grand nombre, dans les fourrés surtout ; leur extraction immédiate, qui doit être accompagnée de celle des vieux arbres, est de la plus grande importance. En effet, le tort qu'ils occasionnent n'est point encore consommé, et en se hâtant de les enlever, on par-

vient souvent à sauver des semis naturels de hêtre et même de chêne d'une grande beauté et à restaurer ainsi tout de suite le repeuplement.

Ces coupes de nettoisement devront se répéter autant de fois qu'on le jugera nécessaire pour assurer l'état prospère des bonnes essences ; en outre, il sera convenable, dans les places où ces essences manqueront ou seront rares, de compléter le massif par quelques plantations.

557. Les parties entièrement ruinées, où les plantes parasites ont envahi la totalité du terrain, ne peuvent évidemment être remises en état qu'à l'aide de repeuplements artificiels. Nous renvoyons donc pour la manière de cultiver ces terrains, au sixième livre de ce Cours ; nous ferons observer seulement que, selon le tempérament des essences qu'on veut introduire, on devra ou détruire tout de suite les bois blancs, les morts-bois, etc. , ou les conserver encore pendant quelque temps. Dans le premier cas, il ne suffira pas de les couper, il faudra les essoucher et extirper leurs racines le mieux possible, afin d'empêcher leur reproduction ; dans le second cas, on les enlèvera par forme de nettoisement dès que leur couvert ne sera plus d'aucune utilité au jeune repeuplement artificiel.

Les vieux arbres devront être abattus avant de commencer les semis ou les plantations.

## ARTICLE III.

## Marche des coupes de transformation.

558. Dans les futaies de l'espèce qui nous occupe, les anciennes exploitations, bien que faites sans principes, ont cependant été assises avec un certain ordre et de manière à établir, dans les forêts de quelque étendue, un nombre déterminé de séries. Toutes les fois que ce cas se présentera, et ce sera le plus général, on fera bien de conserver ces anciennes séries pour régler la marche des coupes de transformation ; et, dans les forêts où cette disposition n'existera pas, on devra commencer par l'introduire en groupant dans une même série, autant que possible, des vieilles futaies, des perchis, des gaulis et des fourrés.

559. Cette distribution opérée, la marche des coupes de transformation pourrait être réglée à peu près comme celle des exploitations dans la futaie régulière [477]. Supposons que la révolution jugée convenable pour une série soit de 120 ans, on pourrait la partager en quatre périodes de 30 ans, affecter à la première les vieilles futaies, à la seconde et à la troisième les perchis, enfin à la quatrième les gaulis et les fourrés. Cela fait, on aurait pendant la première période les exploitations suivantes :

1° Dans la première affectation : coupes de régénération réglées par volume.

2° Dans les trois autres affectations : extractions

de vieilles réserves, de bois blancs, et, s'il y a lieu, de tiges dominées, réglées par contenance.

Quant aux parties entièrement ruinées, il serait convenable d'en prescrire le repeuplement artificiel, de manière que les bois à y élever pussent, par leur âge, être rattachés, autant que possible aux parties environnantes, et soumis aux mêmes exploitations (1).

Cette marche des coupes de transformation semble, au premier abord, la plus simple et la meilleure, puisqu'elle a pour résultat de régulariser l'état de la forêt dès la première période. Cependant, selon nous, elle présente un inconvénient grave, celui de ne pas maintenir le rapport soutenu. Il est clair, en effet, que, pendant la première période, les produits seront bien plus élevés qu'ils ne l'étaient jusqu'alors et qu'ils ne le seront dans les périodes suivantes; car ils se composeront non-seulement de coupes de régénération dans la vieille futaie, mais

---

(1) Lorsque les vides dont il s'agit ici peuvent, par leur situation, se rattacher à l'affectation des gaulis et fourrés, il y a lieu de les repeupler immédiatement en chêne et hêtre. Ceux, au contraire, qui se trouveront enclavés dans les perchis pourront, immédiatement aussi, être cultivés en pin sylvestre ou en pin maritime qui, après avoir restauré le sol et l'avoir rendu à la production, serait coupé en même temps que les perchis parvenus au terme de leur exploitabilité. — Dans ce sol ainsi restauré, on introduira facilement ensuite, et avec avantage, les essences feuillues d'élite qui se confondront dès lors entièrement avec les parties voisines régénérées.

encore d'une quantité considérable d'anciennes réserves répandues dans toute la forêt, sans compter les bois blancs et les perches dominées qui, sur beaucoup de points, seront très-productifs.

Adopter une telle marche, ce serait évidemment transgresser un des principes fondamentaux de l'exploitation des bois; ce serait, en outre, dans beaucoup de localités, jeter dans la consommation plus de matière qu'il n'en est besoin, et, par conséquent, en faire tomber le prix au-dessous de la valeur réelle.

560. En général, il sera facile d'obvier à ce double inconvénient, à moins qu'une circonstance, telle que le dépérissement total des restes de vieille futaie n'y mette obstacle.

Les parties de vieille futaie, en effet, quoique parvenues à maturité, sont cependant, d'ordinaire, loin de dépérir, et peuvent, sans difficulté, demeurer sur pied 20 ou 30 ans de plus. On peut donc, au lieu de procéder immédiatement à leur régénération, les mettre au contraire en réserve, pour ne les exploiter que lorsque le peuplement du surplus de la série aura été régularisé par les coupes de transformation.

Or, dès que l'on aura pris un tel parti, la marche de ces coupes pourra être réglée d'une manière très-simple. Car ici, de même que dans les transformations de forêts jardinées, il faut éviter toute recherche dans la fixation de la possibilité, qui n'est qu'un objet secondaire; le principal est d'assurer l'amé-



lioration de la forêt par des moyens prompts, faciles et sûrs.

On s'occupera donc d'abord d'établir une période transitoire, qui se bornera au nombre d'années nécessaires pour assurer au bois des débouchés convenables (10, 20, 30 ans par exemple); cela fait, on séparera, sur le terrain, la vieille futaie à mettre en réserve d'avec les perchis, et ceux-ci d'avec les gaulis et les fourrés; enfin on considérera ces deux derniers d'une part, et les perchis de l'autre, comme des séries ou sous-séries provisoires, dans chacune desquelles les coupes de transformation s'effectueront annuellement par contenances égales et d'après les règles qui ont été posées plus haut. Quant aux parties ruinées, on les repeuplera, comme nous l'avons dit, de manière à pouvoir les rattacher par la suite aux massifs environnants (1).

Il est à peu près certain que ces coupes, tout en ne portant point sur la vieille futaie, satisferont cependant largement aux besoins ordinaires de la consommation. D'une part, les anciennes réserves fourniront en assez grand nombre des bois de service

---

(1) Lorsqu'on établit des règlements de coupes dans des forêts comme celles dont il s'agit, il est nécessaire de se réserver le moyen d'entreprendre, dans le cours de la période transitoire, outre les exploitations régulières, toutes celles qui seraient jugées indispensables pour atteindre entièrement le but cultural, telles que nettoiemens répétés dans les gaulis et fourrés, ébranchemens périodiques des anciennes réserves maintenues dans les perchis, etc.

et de travail ; de l'autre, les perches dominées, et surtout les bois blancs, alimenteront le chauffage, tout en donnant encore quelques pièces d'industrie.

La période transitoire terminée, le peuplement de la forêt sera suffisamment régulier pour que nos successeurs soient mis à même de conduire la futaie de plus en plus vers l'état normal. C'est à eux qu'il appartiendra de fixer la durée de la révolution définitive, la périodicité des éclaircies, etc., parce que, mieux que nous, ils jugeront de ce qu'il sera convenable de faire sous ces divers rapports (1).

561. Dans les forêts irrégulières dont traite le présent chapitre, de même que dans celles qui ont été jardinées, on rencontrera des cas nombreux que nous n'avons point prévus. C'est au forestier à les apprécier et à modifier les généralités du traitement que nous avons tracé, selon le degré d'importance qu'il accordera à l'exception (2).

---

(1) Voir l'appendice.

(2) Voici, par exemple, une exception qui se présente très-fréquemment, surtout dans les forêts de chêne. On trouve dans ces forêts des parties de futaie qui, bien qu'à peine exploitables quant à leur âge, et quoique assises sur un bon sol, sont néanmoins sur le retour ou même dépérissantes, parce que les arbres proviennent de souches déjà fort vieilles. Dans ce cas, il est évident qu'il faut, avant tout, hâter la régénération du peuplement existant, et dès lors la marche des coupes de transformation, telle que nous l'avons proposée, ne peut plus être adoptée.



## LIVRE QUATRIÈME.



---

## LIVRE QUATRIÈME.

---

### DE L'EXPLOITATION DES TAILLIS.

---

#### DÉFINITIONS.

562. On appelle *taillis*, les forêts destinées à se reproduire principalement par les rejets des souches et des racines.

Ce mode de régénération prend son principe dans la propriété que possèdent toutes les essences feuillues, à un degré plus ou moins élevé, de donner naissance à des rejets et à des drageons, lorsque l'arbre est coupé à fleur de terre ou à une certaine élévation au-dessus du sol [23].

Les rejets sont, en général, d'autant plus abondants, que l'arbre a été coupé plus près de terre et que son écorce est plus spongieuse. Les mêmes causes assurent aussi la production des drageons, qui est, en outre, favorisée par la disposition traçante des racines.

563. Lorsque, dans l'exploitation des taillis, on réserve un certain nombre d'arbres pour rester sur pied pendant trois révolutions et plus, le bois ainsi traité, est appelé *futaie sur taillis*, et mieux *taillis sous futaie* ou *taillis composé*.

Le taillis est *simple*, lorsque les arbres réservés ne sont pas maintenus au delà de deux révolutions, ou lorsque les coupes s'exploitent sans réserve.

564. Les bois de réserve dans les taillis se nomment *baliveaux*. On les distingue en *baliveaux de l'âge*, *baliveaux modernes* et *baliveaux anciens*.

Au moment de la coupe, les premiers sont âgés d'une révolution; les seconds de deux, et les autres de trois et au delà.

C'est ainsi que le Code forestier désigne les arbres de réserve. Mais, dans l'usage général, le mot *baliveaux* seul exprime ceux de l'âge, la dénomination de *modernes*, ceux de deux révolutions, et celle d'*anciens*, les autres. On a aussi adopté une distinction entre les anciens : ceux qui ont beaucoup au delà de trois révolutions, ont reçu le nom de *vieilles écorces*.

Ces deux dénominations d'*anciens* et de *vieilles écorces*, laissent à désirer en ce qu'elles désignent des arbres d'un nombre indéterminé de révolutions.

Or, pour la classification des réserves d'un taillis sous futaie, il importe d'indiquer l'âge des bois; il serait donc convenable que chaque désignation eût un sens précis.

Voici comment nous avons cru pouvoir régler cet objet :

Baliveaux. . . . .	1 révolution.
Modernes. . . . .	2 révolutions.
Anciens de 2 <sup>e</sup> classe. . . . .	3 révolutions.
Anciens de 1 <sup>re</sup> classe. . . . .	4 révolutions.
Vieilles écorces. . . . .	5 révolutions.

On pourrait même diviser les vieilles écorces, comme les anciens, en plusieurs classes.

565. Les arbres de réserve influent sur le taillis, de deux manières distinctes : par le *couvert* et par l'*ombrage*.

Il importe de ne pas confondre ces deux choses.

Le *couvert* exerce son action sur l'espace de terrain que la cime et les branches de l'arbre surmontent et recouvrent immédiatement ; il est constant et nuit à la végétation en affaiblissant les effets de la lumière et de la pluie, et en empêchant la formation de la rosée.

L'*ombrage*, au contraire, promène son influence sur une certaine étendue, suivant les différentes positions du soleil pendant le jour. Il est presque toujours salulaire à la croissance des bois, en ce qu'il tend à conserver la fraîcheur au sol et aux plantes, sans priver celles-ci de l'action bienfaisante de l'atmosphère et de la lumière.

Ces deux mots de *couvert* et d'*ombrage*, indiquent aussi la surface même qui est couverte ou ombragée. C'est ainsi qu'on évalue le *couvert* des réserves en



mètres carrés, pour établir le rapport qui doit exister entre elles et le taillis.

566. *Ravaler*, c'est couper à fleur de terre des souches qui, dans les exploitations précédentes, avaient été laissées trop élevées.

567. *Couper en pivot*, c'est couper de manière à former un creux dans le milieu de la souche; *couper en talus*, c'est, au contraire, donner à la souche une inclinaison qui favorise l'écoulement des eaux pluviales.

568. On appelle *cépée* ou *trochée* l'ensemble des rejets provenant d'une même souche.

569. *Ramiers* : on nomme ainsi les perches du taillis et les branchages, immédiatement après l'abatage et lorsqu'ils ne sont point encore façonnés.

---

---

## CHAPITRE PREMIER.

---

### MÉTHODE DU TAILLIS SIMPLE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Généralités.

570. Dans la méthode du taillis simple, les rejets et les drageons sont considérés comme le produit principal. On évite avec soin tout ce qui peut nuire à leur accroissement et, à cet effet, on n'établit que peu et souvent même point de réserves dans les coupes. Lorsqu'on choisit quelques baliveaux, ce n'est que dans le but de procurer un peu d'ombrage aux expositions chaudes et d'obtenir les semences nécessaires pour régénérer le taillis. Ces baliveaux ne doivent jamais devenir des arbres anciens, et leur nombre doit être réglé de manière qu'en aucun cas ils ne recouvrent pas au delà du *vingtième* ou du *seizième* au plus, de la surface totale.

Toutefois, dans les forêts de l'Etat, il sera souvent convenable de faire une exception à cette règle, afin de procurer des courbes et des courbants à la marine. Lorsque le sol et l'essence le permettront, on pourra, sur les lisières des bois et sur les bords des routes, élever des arbres bordiers destinés à atteindre un âge avancé.

571. Les taillis ne peuvent avoir de durée constante que si les souches, que l'âge ou une maladie fait périr, sont remplacées par de nouveaux pieds. Or, il est certain que ces souches ne vivent point aussi longtemps que l'arbre dont on n'aurait pas dérangé la croissance naturelle ; car les exploitations répétées fatiguent et altèrent les racines (1).

---

(1) Voici l'explication physiologique de ce fait :

La relation intime ou l'équilibre qui existe entre les organes aériens (branches) et les organes souterrains (racines) détermine, comme on le sait, la vie végétale.

Les racines, en pompant la sève ascendante, produisent le développement des feuilles, et celles-ci, à leur tour, par le travail qu'elles accomplissent dans l'atmosphère, fournissent la sève descendante qui assure l'extension des racines, et particulièrement la formation du chevelu, sans lequel l'absorption des sucs de la terre ne saurait avoir lieu.

Or, quand on coupe la cépée d'une souche, on détruit évidemment cet équilibre. A la vérité, de nouveaux rejets apparaissent, mais ils sont minimes, comparés aux tiges qu'ils remplacent, et ne peuvent envoyer, par conséquent, qu'une nourriture tout à fait insuffisante aux racines dont une partie cesse ainsi de former du chevelu, par suite ne fonctionne plus, et ne tarde pas à pourrir.

Cependant, les racines étant diminuées, et les rejets s'accroissant

Pour que l'existence des taillis soit assurée, il faut donc qu'il s'y opère une régénération graduelle, soit par les graines provenant des arbres réservés, soit par des drageons, ou par des rejets qui, nés très-près de terre (*trainants*), s'enracinent et forment des pieds indépendants, alors que le centre de la souche se pourrit, soit enfin par des semis artificiels ou par des plantations. En général, on doit admettre que plus une essence a de propension à drageonner, mieux elle convient, eu égard à sa perpétuité, au régime du taillis.

## ARTICLE II.

## Essences propres aux taillis.

572. Tous les arbres feuillus peuvent être traités en taillis. Le hêtre est le seul auquel ce régime semble ne point convenir. On a observé que si, dans quelques terrains, les souches produisent des rejets, cette faculté leur est enlevée dès la seconde, ou au plus tard à la troisième révolution, à moins

---

chaque année, l'équilibre se rétablit au bout d'un certain temps. Mais bientôt une nouvelle exploitation survient, les mêmes phénomènes se reproduisent, et la souche, troublée périodiquement ainsi dans ses fonctions, finit par contracter des tares, la pourriture se loge dans celles de ses parties où la sève cesse de pénétrer, sa vitalité s'altère de plus en plus et s'éteint, en définitive, bien plus tôt que cela ne fût arrivé si l'arbre eut obéi, dans son développement, aux lois naturelles de la végétation.

qu'on ne coupe au-dessus du nœud de l'exploitation précédente; et, dans d'autres terrains, on a reconnu que les souches meurent plus jeunes et souvent ne repoussent pas, même dans l'âge le plus tendre.

Parmi les arbrisseaux, il en est quelques-uns qui méritent l'attention du forestier, quoique à un moindre degré que les arbres, ce sont :

Le *coudrier*, les *petits saules*, le *merisier à grappes*, le *cornouiller mâle*, les *viornes*, etc.

Les taillis, ordinairement, se composent d'un mélange de diverses essences. L'art du forestier consiste à favoriser les plus importantes, à assurer leur durée, leur bonne croissance et à en obtenir les produits les plus utiles.

#### ARTICLE III.

##### Fixation de l'exploitabilité dans les taillis.

573. L'expérience a prouvé que, pour fournir d'abondants rejets, il ne faut pas que les bois soient coupés à un âge trop avancé. Toutes les essences, en général, sont moins disposées à ce genre de reproduction, lorsqu'elles ont dépassé la période où elles croissent surtout en hauteur, pour entrer plus particulièrement dans celle du grossissement, et il en est même qui alors s'y refusent (1). D'un autre

---

(1) Ce refus tient à la fois à la dureté de l'écorce et aux causes qui viennent d'être indiquées plus haut (note de la page 350).

côté, il est incontestable qu'en coupant à des époques trop rapprochées, on affaiblit les souches (1) et l'on diminue considérablement les produits en matière (406).

D'après les observations des meilleurs forestiers, il est convenable de ne pas prolonger les révolutions de nos principales essences au delà de 40 ans, et de ne les porter qu'exceptionnellement au-dessous de 15 ans. C'est entre ces deux limites qu'il convient généralement de renfermer la fixation de l'exploitabilité des taillis simples, afin d'assurer le mieux possible leur reproduction.

Pour les forêts de l'Etat et des communes, l'*exploitabilité absolue, renfermée dans les limites que nous venons de poser*, devra, la plupart du temps, être préférée. Elle dépend, comme on le sait, des circonstances plus ou moins favorables à la végétation, c'est-à-dire, du climat, de la situation, de l'exposition et du sol. Ainsi, pendant que, dans les meilleures conditions, on pourrait n'exploiter le chêne qu'à 40 ans, on devra le couper dès l'âge de 20 ans, et même plus tôt, lorsque ces conditions seront défavorables. Il convient, au surplus, de ne fixer la durée de la révolution qu'après s'être assuré, par quelques observations, de l'âge au delà duquel les essences, dans une localité donnée, ne repoussent plus de souche ou repoussent mal.

---

(1) Voir la même note, page 350.

574. Lorsqu'on a adopté l'*exploitabilité absolue*, ainsi entendue, pour terme de la révolution des taillis, les données suivantes pourront être considérées, sinon comme règles, du moins comme des indications utiles.

Dans un bon fonds, le *chêne*, le *hêtre*, l'*ormè*, le *frêne*, les *grands érables* et le *charme* pourront s'exploiter de 30 à 40 ans. Les révolutions plus longues ne sont qu'exceptions rares; presque toujours peu avantageuses.

La révolution de 20 à 25 ans conviendra aux mêmes essences, quand le sol sera moins propice, et elle pourra être considérée comme le plus long terme pour l'*aune*, le *tilleul*, le *bouleau*, le *petit érable*, les *alisiers*, les *sorbiers*, le *merisier*, et le *micocoulier*.

Toutes ces essences devront s'exploiter de 15 à 20 ans, dans les fonds médiocres. Cet âge devra être préféré pour les *trembles* et les *grands saules* ainsi que pour le *châtaignier* qui, par exception, n'est jamais conduit jusqu'à son *exploitabilité absolue*, parce que, étant employé exclusivement à faire des berces et des échalas, il atteint son maximum d'utilité bien avant cette époque. Le *tremble*, toutefois, ne se coupe, dans certaines contrées, qu'à 25 ou 30 ans, attendu qu'on l'emploie à la menuiserie.

Les révolutions de 5 à 10 ans doivent être uniquement réservées pour les *petits saules*, les *coudriers* et autres arbrisseaux. Le *robinier*, cependant, peut s'exploiter à cet âge, parce que sa végétation extrême-

ment prompt et la dureté précoce de son bois le rendent dès lors propre à fournir de bons échelas pour la vigne. Comme cette essence drageonne plus que toute autre, ces courtes révolutions présentent moins d'inconvénients (1).

## ARTICLE IV

## Fixation de la possibilité dans les taillis.

375. La possibilité dans les taillis doit être fondée sur la contenance [418]. Cette base, ainsi que nous l'avons dit, est préférable en général à cause de sa simplicité et de la régularité qu'elle imprime à la marche des coupes. Or, cette régularité, c'est surtout dans les bois exploités en taillis qu'on peut la réaliser, parce que, en raison des courtes révolutions auxquelles ces forêts sont soumises, il devient plus

---

(1) Les bespins de cordes pour futaies et de petits pisseaux de vigne, ont, dans divers départements, fait soumettre les taillis des essences les plus importantes à des révolutions aussi courtes. Un tel régime est évidemment vicieux. Sans diminuer ainsi la révolution, on peut satisfaire à ces besoins par des éclaircies possibles à tout âge, qui produiront des bois de quelque petite dimension, qu'on les demande. C'est ainsi qu'on délivre aux adjudicataires de coupes, des milliers de harts, qui servent aux bûcherons pour lier les fagots et aux floteurs pour rassembler les trains. Ils sont extraits, sans aucun dommage, des taillis de l'âge de 6 ans et au-dessous; mais ces extractions peuvent avoir lieu de même dans des cantons plus âgés, et fournir aux différents besoins de la consommation. Les forêts traitées en futaie offrent la même ressource.



facile d'y établir une gradation convenable dans l'âge des bois et d'asseoir les coupes de proche en proche.

Différents auteurs ont prescrit de rendre les contenance des coupes, dans les taillis, inversement proportionnelles au peuplement et à la fertilité du sol. Il est incontestable que cette mesure bien exécutée, rendrait les produits annuels moins variables; mais, comme on réussit ordinairement à créer un rapport soutenu par les moyens plus simples que nous connaissons [420], on a généralement accordé peu d'attention à cette idée, et, en France, particulièrement, tous les taillis sont partagés en coupes d'égale contenance.

#### ARTICLE V

Saison la plus convenable pour la coupe des taillis.

576. Il est généralement à désirer que les taillis ne soient coupés ni en automne ni en hiver, parce que l'intensité du froid, dans cette dernière saison, peut altérer les souches. L'écorce quelquefois même s'en détache, lorsque, gonflée par les pluies elle éprouve l'effet d'une forte gelée. Dans ce cas, toute production de rejets devient impossible, et, à moins que les racines ne fournissent des drageons, le pied est perdu.

Il est peu convenable aussi de couper les taillis en temps de sève; les souches s'affaiblissent, dit-on, par l'écoulement trop abondant du suc séveux. Un

inconvenient plus réel, c'est la perte de la première et plus forte repousse du taillis qui est due à la sève du printemps, tandis que, par la sève d'été, on n'obtient que des rejets qui sont toujours moins vigoureux et ont plus de peine à se défendre contre les froids de l'hiver.

La coupe en temps de sève ne peut être tolérée que pour les taillis dont l'écorce est indispensable aux tanneries.

577. Les mois de février, mars, et quelquefois le commencement d'avril, sont, dans les cas ordinaires, et dans le climat d'une grande partie de la France, les époques les plus favorables à la coupe des taillis. Ces époques pourront être sans doute mieux choisies pour les départements méridionaux où la végétation est très-précoce. La température doit décider. En règle générale, on évitera de couper avant et pendant les grands froids et au moment de la sève.

Quelques parties du Midi de la France et celles qui sont voisines de l'Océan, n'ont guère à craindre les fortes gelées d'hiver ; dans ces pays, il sera préférable de commencer à couper aussitôt après la chute des feuilles, et, pour les chênes à feuilles persistantes, aussitôt que le mouvement de la deuxième sève sera arrêté.

## ARTICLE VI.

## Mode d'abatage des taillis.

578. L'abatage des taillis doit se faire avec des instruments bien tranchants, afin de ne pas faire éclater la souche et l'écorce qui la recouvre. Les perches ayant 0<sup>m</sup>,05 de diamètre et au-dessus doivent être coupées à la hache ; pour les brins plus faibles, il est préférable d'employer la serpe, afin d'éviter l'ébranlement et souvent la rupture des racines que le choc de la hache occasionne aisément. On peut même se servir, pour les tiges les plus minces, de la scie, en prenant la précaution de faire la section oblique à l'horizon ; pratiquée sur des souches aussi petites, cette opération n'a aucun inconvénient.

En général, la souche, quelle que soit sa dimension, doit recevoir par l'abatage une forme telle que les eaux pluviales ne puissent y séjourner ; de plus, la coupe doit se faire le plus près possible de terre, afin que les rejets, naissant à fleur du sol, soient rapprochés des racines et se trouvent ainsi plus solidement assis pour résister aux intempéries. Cependant, lorsque le taillis provient de souches déjà très-vieilles, ou lorsque l'essence est peu disposée à se reproduire par rejets (comme le hêtre, par exemple, et, dans certains terrains froids et humides, même le charme), on fera bien de couper dans le jeune bois,

immédiatement au-dessus du nœud de la précédente exploitation, parce que les pousses nouvelles seront plus abondantes et se développeront avec plus de facilité que si elles avaient à traverser l'écorce épaisse et dure de la vieille souche (1). Enfin, l'abatage à une certaine hauteur de terre sera convenable dans les sols marécageux ou sujets aux inondations, afin d'éviter que l'eau, en pénétrant entre l'écorce et le bois, puis s'y congelant, ne sépare l'un de l'autre et n'empêche ainsi les bourgeons de se former.

Quand les essences ont la propriété de drageonner, le moyen à employer pour assurer la perpétuité du taillis est très-simple. Lorsqu'on s'aperçoit que la faculté reproductive des souches commence à diminuer, on les coupe entre deux terres, c'est-à-dire, au-dessous du collet de la racine. En détruisant ainsi le centre vers lequel se portait la sève, celle-ci agit plus énergiquement sur les racines et donne naissance à une grande quantité de drageons qui remplacent abondamment les souches surannées.

## ARTICLE VII.

Façonnage et vidange dans les taillis.

579. La reproduction des taillis, en général, exige

---

(1) Une précaution très-utile aussi, en pareil cas, consiste à laisser subsister sur la souche, comme *tirants de sève*, quelques-uns des rejets traînants dont la conservation a déjà été recommandée à d'autres titres [571].

que les bois soient façonnés et entièrement vidés avant que les rejets paraissent. On ne saurait méconnaître l'utilité de ce principe, et il est à désirer qu'on puisse l'adopter.

Très-souvent on voit l'aire d'un coupe couverte de stères et de fagots, au milieu desquels les rejets s'élèvent et dépassent quelquefois les piles de bois. C'est ce qui arrive dans les taillis situés en sol très-fertile ou humide, et dans ceux que peuplent des bois d'une végétation rapide. On conçoit que, dans de pareilles coupes, le séjour de bois façonnés et surtout le retard de la vidange ne peuvent manquer d'occasionner du dommage.

Il y en a moins à craindre pour les taillis situés en fonds maigre et aride et dans ceux que peuplent des essences d'une végétation lente, parce que les rejets de la première année sont ordinairement peu élevés.

580. La vidange avant le temps de la sève est la plus avantageuse, et peut presque toujours avoir lieu dans les coupes dont on commencera l'exploitation en automne. Elle sera possible encore dans les coupes de peu d'étendue, lors même qu'on attendrait la fin de l'hiver pour y mettre la cognée. Il n'est pas nécessaire, au surplus, que les bois soient transportés hors de l'enceinte de la forêt; l'essentiel est que la coupe en soit débarrassée, et il est rare qu'on ne trouve pas de places où le produit de l'exploitation puisse être momentanément déposé. Par

le moyen de ces places de dépôt (1), on pourra presser la vidange des coupes, quand même on n'aurait commencé à les exploiter qu'après les fortes gelées.

Ce qui favorise le plus la célérité des vidanges, c'est le bon état des chemins. Il est telle forêt où la sortie des bois n'est possible que lors des grands froids ou des chaleurs de l'été, et où la difficulté des transports diminue considérablement la valeur des coupes. Dans ce cas, on est forcé de consentir à des prorogations de délai de vidange, quel que soit l'inconvénient qui en résulte. De bonnes routes forestières doivent être mises au rang des améliorations les plus utiles, de celles, surtout, qui augmentent le revenu des forêts et qui permettent d'apporter dans le régime des exploitations, la promptitude désirable et l'ordre qui doit y régner.

#### ARTICLE VIII.

Examen des dispositions que renferme le cahier des charges des adjudications de coupes.

581. Le cahier des charges régissant les adjudications des coupes qui se font annuellement dans les

---

(1) Quand les coupes, ainsi que cela doit être, aboutissent toutes sur une ou plusieurs laies sommières ou routes, les accotements de celles-ci deviennent les places de dépôt les plus naturelles et les plus avantageuses.

forêts de l'Etat, des communes et des établissements publics, contient les dispositions suivantes (1) :

**A.** « L'abatage des bois sera entièrement terminé  
» le 15 avril qui suit la date de l'adjudication.

» Les bois à écorcer, en vertu de l'acte d'adjudication, seront coupés avant le 15 mai.

**B.** « A moins de clauses contraires, les bois seront  
» exploités à tire et aire et à la cognée, le plus près  
» de terre que faire se pourra, de manière que  
» l'eau ne puisse séjourner sur les sauches. Les racines devront rester entières.

**C.** « Les coupes seront nettoyées, savoir : en ce  
» qui concerne le ravalement des anciens étocs et  
» l'enlèvement des épines, ronces et autres arbustes  
» nuisibles, avant le terme fixé pour l'abatage; en  
» ce qui concerne le façonnage des ramiers, avant  
» le 1<sup>er</sup> juin.

» A l'égard des ramiers provenant des bois qui  
» auront été écorcés en vertu du procès-verbal  
» d'adjudication, ce dernier délai est prorogé jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet suivant.

**D.** « La vidange sera entièrement terminée le  
» 15 avril qui suit l'expiration du délai d'abatage.

**E.** « Si des circonstances locales nécessitent d'au-

---

(1) Pour plus de facilité dans l'enseignement, nous avons classé ici les dispositions du cahier des charges, dans l'ordre où les différentes parties de l'exploitation des taillis ont été traitées dans le présent chapitre.

» etres termes que ceux fixés par l'abatage, le net-  
» toisement et la vidange des coupes, il en sera fait  
» une clause spéciale de l'adjudication. »

582. Par le dernier paragraphe que nous venons de rapporter, le cahier des charges a prévu que des modifications pourraient être nécessaires, et il permet de les déterminer par des clauses spéciales, qui doivent être proposées par les agents forestiers locaux et soumises à l'approbation de l'administration.

Nous allons examiner les conditions générales et en signaler les parties susceptibles d'être modifiées, lorsque d'ailleurs les circonstances rendront ces changements possibles.

a. *L'abatage doit être terminé au 15 avril.*

Ce terme est trop reculé, pour un grand nombre de localités et fait naître à peu près tous les inconvénients de la coupe en temps de séve.

D'après ce qui a été expliqué plus haut [577], il faudrait selon les différents climats, fixer, non-seulement la fin, mais aussi le commencement de l'abatage, et faire en sorte d'éviter les exploitations d'automne et d'hiver qui, hors des contrées méridionales et d'une partie de celles de l'Ouest situées dans le voisinage de la mer, ne sont pas toujours sans dangers (1).

---

(1). Malheureusement, il existe souvent des obstacles presque insurmontables à une telle amélioration, par suite de l'extrême difficulté que l'on rencontre, dans les mois de février et de mars, à se procurer



Mais, s'il est désirable que le délai d'abatage puisse être raccourci pour les taillis en général, il est certain que celui que le cahier des charges assigne aux bois à écorcer pourrait être prolongé avec avantage, et sans qu'il en résultât aucun inconvénient pour la reproduction.

En effet, sauf dans les régions particulièrement favorisées sous le rapport du climat, la sève n'est entièrement en mouvement que dans la seconde quinzaine d'avril, et souvent même plus tard encore. L'écorcement ne peut donc guère commencer que dans les derniers jours de ce mois ou dans les premiers jours de mai. Or, cette opération, assez longue par elle-même, pour peu que la coupe soit étendue, est sujette en outre à de fréquentes interruptions, amenées tantôt par un refroidissement subit de la température, tantôt par un vent sec, qui suffisent pour augmenter l'adhérence des couches corticales au bois et arrêter le travail.

En augmentant le délai dont il s'agit de 15 jours, on faciliterait singulièrement la fabrication d'un produit de première importance pour l'une de nos

---

des ouvriers. A cette époque de l'année, en effet, les habitants des campagnes, tous à peu près, sont occupés aux travaux agricoles, auxquels, en général, ils ne renoncent à aucun prix. En automne et en hiver, au contraire, leur temps, dans une grande partie de la France, appartient tout naturellement à l'abatage et au façonnage des bois qui deviennent ainsi une ressource précieuse pour ces populations.

principales industries, et très-profitable au propriétaire, sans compromettre, plus qu'elle ne l'est actuellement [576], la reproduction des souches qui, en tout état de cause, ne saurait avoir lieu que sous l'action de la sève d'août.

*b. Les bois seront exploités à la cognée le plus près de terre que faire se pourra.*

Ce mode d'abatage, bien que généralement applicable, admet cependant quelques exceptions, comme nous l'avons fait voir [578]. Par exemple, si, malgré le peu de disposition du hêtre à repousser sur souche, on est forcé par les circonstances de le traiter en taillis, il sera prudent de le faire couper au-dessus du nœud de la précédente exploitation, car ce n'est que du jeune bois que l'on peut espérer des rejets.

C'est par ce mode que, dans l'ancienne Lorraine, on a soutenu, pendant assez longtemps, l'existence de quelques taillis de hêtre; et, lorsque les agents forestiers, pour obéir aux règlements, se sont décidés à faire couper ces taillis rez-terre, les vieux bûcherons ont prédit la mort des souches et ne se sont pas trompés.

Une mesure très-utile pour assurer la reproduction des taillis et dont nous avons déjà parlé plus haut [571 et 578, note] consiste à conserver les rejets traînants, soit que l'on compte sur le mouvement naturel des voitures et des hommes dans la coupe pour les enterrer, soit, ce qui est mieux, qu'on les fasse coucher en terre, plus soigneusement, par des ou-

vriers. Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre cas, on peut obtenir par ce moyen une multitude de jeunes tiges. Il serait donc à propos, en pareille circonstance, de ne pas exiger que l'abatage se fit par trop près de terre, et de recommander au contraire aux bûcherons, tout en coupant en talus, de respecter les trainants dont il s'agit.

*o. Les coupes seront nettoyées, savoir : en ce qui concerne le ramassement des anciens états et l'enlèvement des arbustes nuisibles, avant le terme fixé pour l'abatage ; en ce qui concerne le façonnage des ramiers, avant le 1<sup>er</sup> juin.*

Les ramiers devraient expressément être façonnés dans le plus bref délai possible. Si le terme de cette opération n'est fixé qu'au 1<sup>er</sup> juin, les adjudicataires peuvent les laisser éparpillés dans les coupes pendant tout le mois de mai et, par conséquent, dans le moment où la sève produit déjà des rejets. D'une part, il en résultera du dommage pour la repousse des souches ; de l'autre, les agents et les gardes seront empêchés de visiter toutes les parties des exploitations, ce qui peut favoriser la fraude. Les bûcherons devraient être partagés en deux brigades : l'une chargée d'abattre et de façonner le bois de corde, l'autre de relever et de fagotter les ramiers. Cette dernière travaillerait au fur et à mesure de la chute des arbres et de l'abatage des cépées. Dans tous les temps, une coupe doit être accessible et ne présenter aucun obstacle à la surveillance journalière.

lière. Quant aux anciens étocs, c'est-à-dire, les souches ou parties de souches qui sont mortes, il vaudrait mieux les extraire et leur substituer de jeunes plants bien venants, que de se contenter de les ravalier.

*d. La vidange sera entièrement terminée le 15 avril.*

Cet article des conditions générales, donne aux adjudicataires une année entière, à partir de l'abatage pour le débit et l'enlèvement des bois de leurs ventes, et doit, par conséquent, contribuer au succès des adjudications. Il est à regretter, toutefois, que cette manière d'augmenter les revenus actuels des forêts soit contraire à leur bien-être, et l'on ne peut qu'émettre le vœu bien formel, de voir adopter des délais de vidange plus favorables à la reproduction des taillis, dans toutes les localités où le bon état des chemins et une concurrence suffisante entre les marchands de bois, permettront de le faire sans sacrifice.

---

## CHAPITRE DEUXIÈME.

---

### MÉTHODE DU TAILLIS COMPOSÉ,

ou

SOUS FUTAIE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Généralités.

583. La méthode du taillis sous futaie a pour objet particulier d'élever, sur les taillis, des bois de service; les rejets ne sont plus alors considérés comme le produit le plus important. On veut ici obtenir, à la fois, les avantages du taillis et une partie de ceux de la futaie, c'est-à-dire, régénération prompte et facile, et production de bois de fortes dimensions. Dans cette vue, on conserve, à chaque coupe du taillis, un certain nombre d'arbres auxquels on laisse parcourir plusieurs révolutions.

584. Toutes les essences propres au taillis sim-

ple (les arbrisseaux exceptés), peuvent aussi être traitées en taillis sous futaie, et les mêmes principes d'exploitation s'appliquent à l'un et à l'autre mode. Toutefois, dans celui du taillis sous futaie, il faut considérer non-seulement l'exploitabilité du sous-bois, mais aussi celle de la réserve, et donner une attention particulière au *choix*, au *nombre* et à la *distribution* des baliveaux, trois objets qui sont de la plus haute importance. Car, s'il est incontestable que des réserves modérées et réparties avec intelligence sur le taillis, sont le plus souvent un moyen d'augmenter la quantité et l'utilité des produits en matière, il n'est pas moins vrai aussi qu'un balivage surabondant, fait sans égard aux conditions d'une bonne végétation, amène des résultats diamétralement opposés. En effet, il ne faut point perdre de vue que le taillis sous futaie réunit deux éléments qui, par leur nature, s'entravent et se contrarient réciproquement : d'une part, les arbres réservés qui deviennent branchus, noueux, et s'élèvent peu, parce que chaque exploitation du taillis les isole et provoque leur végétation latérale aux dépens de leur croissance en hauteur; de l'autre, le sous-bois qui est gêné dans son développement par le couvert des réserves qui le surmontent.

Accorder ces deux éléments qui sont en opposition, en réglant le nombre et la distribution des réserves, de manière que la croissance du taillis n'en soit entravée que le moins possible, tel doit donc être le

problème à résoudre dans l'exploitation du taillis sous futaie.

ARTICLE II.

Exploitabilité des taillis sous futaie.

585. L'exploitabilité des sous-bois, dans les taillis sous futaie, doit être réglée d'après les mêmes considérations que celle des taillis simples, sauf, toutefois, à ne point perdre de vue qu'il s'agit ici d'élever des bois de service sur le taillis, et qu'il n'est plus possible, par conséquent, de soumettre celui-ci à des révolutions de courte durée.

En effet, si l'on exploitait le taillis à 10, 15 ou 20 ans, la réserve d'arbres destinés à atteindre un âge avancé manquerait en grande partie son but. D'abord, la plupart de ces tiges, trop grêles pour résister aux intempéries, en seraient inévitablement victimes ; en second lieu, on a peu à espérer de baliveaux n'ayant que l'élévation ordinaire des taillis de cet âge, c'est-à-dire, 4, 6 ou 7 mètres. On sait qu'en général, le fût de l'arbre crû en massif, une fois isolé, ne s'allonge plus, bien que la cime continue à gagner en hauteur ; la raison en est, que, dans cet état d'isolement, n'étant plus serré par des voisins qui le forçaient à s'élever, l'arbre se partage en branches. Il est donc évident que pour obtenir, dans un taillis sous futaie, des arbres ayant une longueur de tige utile aux différentes constructions, il faut, en géné-

ral, qu'ils aient atteint cette longueur, avant d'avoir été l'objet du balivage, c'est-à-dire comme perches du taillis.

D'après ces considérations, on fera donc bien de fixer la révolution des taillis sous futaie à 30, 35 ou 40 ans. Dès lors, on pourra faire choix de baliveaux ayant 10, 12 et 14 mètres de hauteur sur un diamètre proportionné, et qui, par conséquent, supporteront mieux les injures de l'atmosphère et deviendront propres aux usages auxquels on les destine.

586. Plusieurs auteurs allemands, entre autres Pfeil, sont d'avis d'exploiter le sous-bois des taillis sous futaie à *courte révolution*. Les bois, disent-ils, qui croissent sous le couvert perdent la faculté de repousser, bien plus tôt que ceux qui végètent en plein soleil; d'où il suit que, dans les taillis composés soumis à une exploitabilité reculée, un grand nombre de souches, quoique jeunes, périssent soit immédiatement après l'exploitation, soit quelques années plus tard (1).

---

(1) Voici en effet ce qui se passe dans ce cas : lorsqu'un brin ou une cépée vient d'être coupé et que la souche fournit des rejets, la végétation, ainsi que nous l'avons fait voir plus haut (note de la page 350), passe par un état transitoire, pendant lequel elle s'efforce de rétablir l'équilibre entre les liges et les racines. Or, quand les nouveaux rejets croissent sous le couvert, ou des réserves ou des bois blancs, ils languissent, et ne peuvent, faute de lumière, se développer de manière à rétablir, promptement et en temps utile, l'équilibre en question. De leur



Nous reconnaissons la vérité de cette observation, sans cependant adopter le remède proposé, parce qu'il donne lieu à l'inconvénient très-grave aussi, que nous venons de signaler, concernant l'éducation de la réserve. Mais, par contre, il nous paraît d'autant plus indispensable d'employer d'une manière régulière et permanente les travaux d'entretien (repeuplements artificiels, nettoiemens, élagages), dont traite ci-après le chapitre III, et sans lesquels les produits des taillis sous-futaie ne peuvent que s'amoinrir de révolution en révolution, tant en quantité qu'en qualité. Cet amoindrissement graduel dont les exemples sont malheureusement trop fréquents en France, suit une marche d'autant plus rapide que le sol et le climat sont moins propices, et parfois même il aboutit à la stérilité.

587. Quant à l'exploitabilité de la réserve, on conçoit qu'elle dépendra d'abord de l'essence et de la qualité du fonds de terre, et ensuite de l'emploi auquel le propriétaire destine les bois. Ainsi, tandis que, dans un taillis situé en bon fonds, l'Etat et les communes peuvent avoir intérêt à prolonger la durée des réserves de certaines essences jusqu'au

---

côté les racines, imparfaitement nourries par une sève descendante insuffisante, ne parviennent ni à se raviver elles-mêmes ni à raviver la souche ; la pourriture souterraine y continue ses ravages et finit par amener la mort du pied, tantôt dans le cours de la révolution, tantôt, et le plus souvent, à la prochaine exploitation.

moment où elles ont atteint les dimensions et les qualités qui les rendent propres aux grandes constructions, un particulier, possédant une forêt située dans les mêmes conditions de végétation, devrait borner la conservation de ses baliveaux à l'âge où la plus-value qu'ils acquerraient, si on leur laissait parcourir une nouvelle révolution, cesserait de le dédommager du sacrifice qu'il fait en ne les exploitant pas. En un mot, les principes de l'exploitabilité relative, de 1<sup>re</sup> et de 2<sup>e</sup> sorte [410 et 411], trouvent ici une application aussi directe qu'utile (1).

Le terme extrême d'exploitabilité étant fixé, pour la réserve, d'après ce principe, il devient nécessairement le régulateur du balivage, en ce qui concerne du moins les catégories de baliveaux à établir sur le taillis. Ainsi, s'il s'agit, par exemple, d'élever des arbres ayant un âge quintuple de la révolution du taillis, la réserve comprendra cinq catégories de baliveaux dont le nombre variera d'après diverses considérations qui seront développées plus bas [591].

#### ARTICLE III.

##### Choix des baliveaux.

### 588. Les baliveaux doivent être choisis parmi les

---

(1) Voir, pour plus de détails sur cette question le *Cours d'exploitation, de débit et d'estimation des bois* par M. Nanquette, page 294 et suivantes.

**pieds les plus vifs et de la plus belle venue. En donnant la préférence aux brins de semence, qui sont généralement mieux-venants et plus durables que les rejets, il faut éviter de réserver des baliveaux de l'âge trop grêles eu égard à leur élévation, parce qu'ils sont facilement ployés ou rompus par les vents, la neige et le givre.**

**589. La réserve doit se composer, en majeure partie, de chênes, comme étant l'essence la plus précieuse pour les constructions.**

**Après le chêne, on doit préférer le châtaigner, l'orme, le frêne, les grands érables; puis le hêtre et le charme. Il est avantageux aussi de réserver quelques pieds d'alisier, de sorbier, de merisier et de bouleau. Le tremble même pourrait, dans certains taillis, faire partie de la réserve, attendu la rapidité de sa croissance et ses belles dimensions qui le font rechercher pour divers usages [256]. On l'en exclut cependant, et généralement avec raison, parce que l'extrême abondance de ses graines le multiplie dans les taillis au point de compromettre la végétation des essences d'élite [252].**

**En général, il est utile de composer la réserve de plusieurs essences, tout en maintenant la proportion la plus forte aux plus importantes. Non-seulement on assure, de cette manière, les différents besoins de la consommation, mais on a l'avantage d'élever, dans chaque canton de la forêt, sur chaque place pour ainsi dire, les bois qui y prospèrent le mieux.**

On augmente donc la production générale en quantité et en qualité. A ce point de vue, on ne peut qu'approuver ce qui se pratique dans certaines parties de l'Allemagne, où l'on a l'habitude de mêler à la réserve feuillue, un certain nombre de bois résineux, mélèzes ou pins sylvestres, qui réussissent parfaitement dans de telles conditions, fournissent d'excellents bois de travail et de construction et n'entravent cependant que très-peu la croissance du sous-bois, attendu la légèreté de leur feuillage. Cette pratique, du reste, n'est point inconnue en France : dans différents bois particuliers de la Sologne, par exemple, on voit croître, au-dessus de taillis mélangés de chêne, de chataignier et de bouleau, une réserve de pins sylvestres qui présente à tous égards des résultats satisfaisants (1).

590. On a l'habitude de ne marquer que des tiges très-droites, et l'on néglige celles qui présentent quelque courbure ou qui forment la fourche (2) à la

---

(1) V. le rapport de M. Ad. Brongniart, de l'Institut, à M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, sur les plantations forestières dans la Sologne.

(2) La dénomination d'arbres *fourchus* s'applique spécialement à ceux dont la tige se divise à une certaine distance de la base, en deux branches qui s'élèvent verticalement et restent toujours assez rapprochées l'une de l'autre. C'est avec raison que l'on évite de comprendre des arbres ainsi conformés dans les balivages, parce qu'ils ne sont d'aucune utilité spéciale. Mais il n'en est pas de même de ceux qui, à la naissance du houppier, portent une forte branche, laquelle attire à elle une grande partie de la sève destinée à l'alimentation de la cime, et pourra former

naissance des branches, parce que ces dernières sont exposées à être déchirées par les vents.

Les tiges droites doivent, sans doute, être l'objet principal du balivage; mais, dans les forêts de l'État du moins, et pour l'essence *chêne*, il ne faut point perdre de vue les besoins de la marine qui sont du plus haut intérêt. Dans toutes les forêts, et surtout dans celles qui sont traitées en futaies, on n'est jamais embarrassé de trouver des pièces droites, tandis qu'on n'y rencontre pas aussi facilement les courbes et les courbants qui sont indispensables à la construction des vaisseaux. Il faut donc chercher à y pourvoir par les balivages.

#### ARTICLE IV.

##### Nombre des baliveaux.

591. Le nombre des baliveaux à réserver, doit être réglé de manière que le couvert qui en résulte ne puisse compromettre la croissance et la reproduction du taillis. C'est dire qu'il doit varier selon les *essences*, les *sols* et les *expositions*, et qu'il n'est pas possible de prescrire, à cet égard, de règles générales et absolues.

---

plus tard une des courbes si précieuses pour les besoins de la marine. Toutefois, avant de comprendre ces arbres dans les balivages, il importe de s'assurer, par une inspection attentive que l'axe du tronc et celui de la branche sont sensiblement dans un même plan, condition essentielle pour que la courbe formée par leur réunion puisse être utilisée.

En effet, il est des essences, telles que le chêne, le frêne, le bouleau, etc., qui ne donnent qu'un couvert léger et n'empêchent point entièrement la croissance du taillis, alors que les hêtres, les charmes, et d'autres encore, étouffent tout ce qui végète sous leur épais feuillage.

Certaines essences aussi supportent mieux que d'autres d'être dominées. Ainsi les taillis de chêne, quel que soit le sol ou l'exposition, souffrent beaucoup de la présence des arbres, tandis que l'on voit souvent les rejets de charme croître assez bien sous le couvert et même tout près du tronc de chênes anciens.

Quand le sol sera fertile, il y aura moins d'inconvénients, pour le taillis, que les réserves soient multipliées, et qu'elles acquièrent un âge avancé; d'une part, parce que la végétation du taillis est d'autant plus assurée que le terrain présente plus de ressources; de l'autre, parce que, dans un bon fonds, les arbres prennent plus de hauteur de tige, et que, plus cette tige est élevée, moins le couvert de sa tête nuit au taillis.

Mais, dans les terrains médiocres, peu profonds et placés à une exposition chaude, il faut éviter de conserver de vieux arbres, et chercher seulement à *ombrager* le taillis par des réserves moins âgées, qui pourront être en assez grand nombre, mais dont il importe que les têtes soient peu volumineuses. Il ne peut y avoir d'ailleurs que perte à ré-

server des arbres jusqu'à un âge avancé, dans des sols impropres à leur fournir une nourriture suffisante, et où, par conséquent, on ne peut espérer obtenir des bois de fortes dimensions.

En créant dans de pareilles localités un *ombrage* abondant, tout en ne donnant qu'un léger *couvert*, c'est-à-dire, en se rapprochant davantage du mode du taillis simple, on mettra obstacle à l'évaporation trop considérable du sol et des bois eux-mêmes, et l'on écartera, cependant, ce qui pourrait entraver la croissance du taillis déjà trop peu favorisée par la nature du sol.

592. Nous avons dit ailleurs [587] que les catégories de baliveaux, dont doit se composer la réserve, dépendaient du terme extrême d'exploitabilité adopté pour celle-ci, et nous venons d'indiquer quelles sont les circonstances de nature à influencer sur le nombre de baliveaux à comprendre dans chaque catégorie. — On conçoit toutefois, qu'on ne puisse établir, à cet égard, de règle tout à fait fixe, mais on n'en sent pas moins le besoin de certaines données propres à servir de point de départ et de guide, lorsqu'il s'agit, dans la pratique, d'arrêter cet objet aussi important que difficile. Dans ce but, on a cherché à déterminer, par maximum et par minimum, l'étendue que peuvent recouvrir les arbres de réserve, sans compromettre le taillis; puis on a essayé de trouver l'espace moyen que recouvre un baliveau de chaque catégorie, et l'on est arrivé de cette manière à fixer le

nombre d'arbres de différents âges, qu'il conviendrait de réserver à chaque exploitation.

Ainsi qu'il était facile de le prévoir, les expériences faites ont produit des résultats fort divers, et, par suite de ces différences, les opinions émises à ce sujet ont beaucoup varié. Nous ne rapporterons de ces opinions que celles qui se sont assez généralement vérifiées et qui sont le plus conformes à nos propres convictions. Toutefois, nous nous hâtons d'ajouter que lorsqu'il s'agira de régler le couvert de la réserve dans une forêt ayant quelque importance, cet objet demandera toujours à être expérimenté particulièrement; attendu qu'il se modifie selon les essences et selon la disposition des arbres à s'étaler plus ou moins, disposition qui dépend à son tour du sol et du climat. Enfin, nous ferons remarquer que le couvert des vieux arbres est bien plus nuisible au sous-bois (à surface couverte égale) que celui de pieds jeunes ou d'âge moyen, parce que le feuillage des premiers est plus épais et moins pénétrable, par conséquent, aux rayons du soleil que celui des seconds.

393. On admet en principe que, immédiatement avant l'exploitation, les arbres ne doivent couvrir que le tiers, au plus, du terrain, quand les circonstances locales, que nous avons indiquées plus haut, semblent permettre une réserve abondante. Lorsque ces circonstances n'existent que partiellement, le couvert peut être diminué, selon les cas, jusqu'au sixième de la surface.



Le balivage normal qui va suivre, et dont la première idée appartient à Cotta, nous paraît applicable à un grand nombre de nos taillis sous futaie, lorsqu'ils sont placés en fonds convenable; il établit un couvert et un ombrage modérés, et assure des ressources en bois de service et de travail, propres à tous les besoins de la consommation. On pourra facilement, au surplus, y apporter les modifications que des circonstances particulières rendraient avantageuses ou nécessaires, soit en supprimant une et même deux catégories de réserves, soit en diminuant le nombre des pieds composant chacune des catégories.

Il est presque inutile d'ajouter, que ce balivage n'est applicable qu'aux essences dont la consommation réclame des pièces de fortes dimensions, et qui, d'ailleurs, sont susceptibles d'atteindre un âge avancé; telles sont, par exemple : le chêne, le châtaignier, l'orme, le frêne, l'érable. Nous ne voyons pas l'opportunité de réserver, comme on le fait souvent, des hêtres et des charmes jusqu'à 150 ans et plus. Ces arbres, dont le couvert est très-épais, s'étalent considérablement et écrasent le taillis, sans offrir, au propriétaire, lors de leur abatage, une compensation des pertes que leur présence a occasionnées. Il est vrai, toutefois, que le hêtre, par ses fruits, présente quelque dédommagement; c'est un objet à calculer d'après la fréquence des années de semence dans la localité, la valeur de la faine, et les difficultés de la récolte.

**594. BALIVAGE NORMAL.** — Admettant une révolution de 30 ans, on devrait trouver, à chaque exploitation, par hectare :

RÉSERVES par CLASSES D'ÂGE.	NOMBRE de RÉSERVES.	COUVERT d'un ARBRE.	COUVERT de tous LES ARBRES.
		mèt. car.	mèt. car.
Vieilles écorces (150 ans). . . .	10	60	600
Anciens de 1 <sup>re</sup> classe (120 ans). .	20	42	840
Anciens de 2 <sup>e</sup> classe (90 ans). .	30	32	960
Modernes (60 ans) . . . . .	40	15	600
TOTAUX. . . . .	100	»	3000

Lors de la coupe on abattrait par hectare :

Vieilles écorces (150 ans) . . . . . 10

Anciens de 1<sup>re</sup> classe (120 ans) . . . 10

Anciens de 2<sup>e</sup> classe (90 ans) . . . . 10

Modernes (60 ans) . . . . . 10

Total . . . 40 arbres,

et l'on réserverait 50 baliveaux de l'âge (1).

Il resterait donc sur pied, après la coupe :

(1) On remarquera que l'on prescrit une réserve de cinquante baliveaux de l'âge, tandis qu'on ne coupe cependant que 40 pieds d'arbres et qu'on ne compte retrouver, au bout de la révolution, que quarante modernes (voir le tableau). Cette mesure a paru nécessaire pour tenir compte des nombreux accidents dont un certain nombre de baliveaux de l'âge est toujours victime.

RÉSERVES par CLASSES D'ÂGE.	NOMBRE de RÉSERVES.	COUVERT d'un ARBRE. mèt. car.	COUVERT de tous LES ARBRES. mèt. car.
Anciens de 1 <sup>re</sup> classe (120 ans) .	10	42	420
Anciens de 2 <sup>e</sup> classe (90 ans) . .	20	32	640
Modernes (60 ans) . . . . .	30	15	450
Baliveaux (30 ans) . . . . .	50	nul.	»
TOTAUX. . . . .	110	»	1510

On voit, d'après ce qui précède, que le balivage normal que nous proposons, ne recouvre, immédiatement avant la coupe, qu'une superficie un peu au-dessous du tiers de l'étendue totale. Or, c'est ce rapport, entre le taillis et la futaie, que nous avons indiqué, plus haut, comme nous paraissant le plus convenable pour conserver la forêt en bon état, quand le sol et le climat sont d'ailleurs d'une fertilité moyenne.

Pour éviter toute méprise, dans l'application, sur le sujet que nous venons de traiter, nous ferons remarquer que le balivage normal ou tout autre analogue qu'on aurait adopté pour une forêt, ne doit pas être considéré comme une prescription absolue, qu'il faille observer à la lettre dans l'exécution. La plupart du temps, il y aurait impossibilité matérielle à le faire et ce serait, d'ailleurs, méconnaître entièrement l'esprit d'une telle disposition. En étudiant

les conditions de production d'une forêt, sol, climat, essences, et en les combinant avec les intérêts du propriétaire et les besoins de la consommation, on détermine le balivage le plus avantageux, le plus rationnel à appliquer à cette forêt. Ce n'est qu'un terme de comparaison, une image de l'état de choses le plus désirable, dont il faut sans cesse chercher à approcher, sans prétendre jamais le réaliser totalement, si ce n'est sur quelques points exceptionnels. Mais on comprend néanmoins combien cet *état théorique*, si l'on peut s'exprimer ainsi, sera utile au praticien pour le guider dans ses travaux.

## ARTICLE V.

## Distribution des baliveaux.

595. La distribution des baliveaux de différentes catégories présente souvent de très-grandes difficultés, et demande toujours la plus scrupuleuse attention.

Si la coupe est située dans un même plan, il faut chercher à répartir l'ombrage, le plus également possible, sur l'ensemble du terrain; si, au contraire, elle offre des accidents variés dans sa configuration, le balivage doit changer selon la nature du sol et l'exposition de chaque partie. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de conserver, sur un même point, plusieurs arbres anciens. Non-seulement ils causent,

ainsi réunis, un dommage bien plus considérable que lorsqu'il sont isolés ; mais, s'ils sont destinés à disparaître ensemble à la prochaine exploitation, il en résultera, le plus souvent, un vide dans le taillis, sur lequel les bois blancs et les morts-bois trouveront accès, ou qu'il faudra combler par des repeuplements artificiels.

Toutes les fois que cela se pourra, on fera bien de réserver les arbres anciens sur les lisières des bois et sur les bords des routes et des chemins. Dans cette position, ils nuiront moins au taillis et leur propre végétation y gagnera.

596. Le balivage raisonné des taillis sous futaie est un objet pour l'exécution duquel les règles de la théorie ne sauraient suffire, parce qu'il existe une infinité de cas et de circonstances qu'on ne peut ni préciser ni prévoir, et que le coup d'œil exercé du praticien est seul capable de bien apprécier. C'est assez dire que cette opération nécessite une habileté plus grande et bien plus rare qu'on ne le pense communément (1).

---

(1) Les conditions dans lesquelles les agents forestiers et, avec eux, la plupart des particuliers exécutent cette importante opération du choix et de la distribution des baliveaux sont, il faut le reconnaître, peu faites pour en obtenir de bons résultats. En effet, le martelage, c'est-à-dire, la désignation des réserves de toutes catégories, a lieu, comme on le sait, *en une seule fois* et s'exécute dans le printemps ou l'été qui précède l'exploitation du bois. La coupe est vendue *sur pied*, abattue, façonnée et vidée suivant certaines conditions, imposées par le vendeur, acceptées

par l'acquéreur, et dont la principale est de représenter, au récolement, toutes les réserves frappées du marteau. Or, quand le taillis est sur pied, enveloppant les arbres de toute part, empêchant souvent de juger leur port, de bien apercevoir leur cime, il est, sinon impossible, du moins fort difficile de faire toujours de bons choix individuels. Mais ce qui est bien plus difficile encore, c'est de distribuer convenablement les diverses catégories de réserves, de manière à répartir l'ombrage dans la mesure où il est utile, et à atténuer, autant que possible, les inconvénients du couvert.

Nous savons que des obstacles à peu près insurmontables s'opposent à ce qu'il soit rien changé à cet état de choses dans les forêts soumises au régime forestier : les règlements administratifs, la marche du service et les garanties de régularité dont il est nécessaire de l'entourer, enfin, le nombre limité d'agents chargés des opérations dont il s'agit ne permettent pas (quant à présent du moins) d'y songer. Mais il n'en est pas de même dans les bois de particuliers, que les propriétaires exploitent eux-mêmes pour n'en vendre les produits qu'après façonnage. Dans ces bois, il sera facile de modifier le procédé actuel, en s'y prenant de la manière suivante :

On exploitera le taillis à l'époque de l'année où l'on a coutume de le faire, en laissant sur pied, d'abord, toutes les réserves de la révolution précédente et, en outre, les plus belles perches du taillis, en nombre triple ou quadruple de celui des baliveaux de l'âge qui devront être maintenus définitivement. Ces perches seront répandues sur toute la coupe, même dans les lieux où il se trouve d'anciennes réserves. — Aussitôt l'abatage du taillis terminé, on procédera au martelage de la réserve, de façon que les arbres abandonnés puissent encore être coupés en temps utile pour la reproduction de la souche. On conçoit aisément que cette opération se fera avec promptitude et facilité, et qu'elle présentera toutes les garanties désirables pour le meilleur choix des arbres et leur espacement le plus avantageux.

---

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### TRAVAUX NÉCESSAIRES

POUR ENTRETENIR LES TAILLIS EN BON ÉTAT.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Repeuplements artificiels.

597. Aussitôt après l'exploitation des coupes de taillis, on doit s'occuper de remplacer, par voie de semis ou de plantation, toutes les souches qui ne repoussent plus, et de regarnir de la même manière les places qui ne seraient peuplées que de bois de médiocre qualité. Sans cette précaution, les meilleures essences seraient souvent dépossédées par les bois blancs, et le chêne surtout, la plus précieuse de toutes, finirait par disparaître entièrement.

C'est effectivement un fait reconnu, que le chêne se reproduit mal de semence dans nos taillis, même lorsqu'il y est dominant. Ce fait est surtout saillant dans les taillis composés. Nous connaissons des

forêts considérables, où la réserve en anciens et en vieilles écorces, formée en presque totalité de très-beaux chênes, atteste l'abondance avec laquelle cette essence y était répandue autrefois, et où l'on ne trouve plus aujourd'hui que fort peu de jeunes sujets de franc pied, propres à remplacer les arbres parvenus à maturité. Aussi est-on réduit à choisir les baliveaux parmi les perches des cépées, quoique l'on sache que les réserves de cette nature ne valent pas, à beaucoup près, celles qui proviennent de semence. En effet, un rejet n'atteint jamais l'âge auquel le brin peut parvenir; il se détériore, se creuse fréquemment par le pied; et n'offre que rarement des ressources à la marine et aux grandes constructions civiles.

Si nous recherchons la cause d'un inconvénient aussi grave, nous la trouvons dans le tempérament du jeune plant. On sait que les brins de chêne, dès les premières années de leur existence, ne supportent pas d'être couverts [72]. Or, dans un taillis, ils le sont en général toujours, soit par des rejets, soit par les arbres de réserve; il est donc évident qu'ils doivent finir par périr, et que, dans une pareille situation, les glands, quelle que soit leur abondance, se répandent et lèvent en pure perte (1).

598. Convaincu de cette vérité par l'expérience, Hartig propose de planter, par hectare, après chaque

---

(1) Voir l'appendice.



exploitation, une certaine quantité de brins de chêne bienvenants, pour assurer les ressources nécessaires au balivage (pour le nôtre ce nombre serait 50). Il veut que ces brins aient une hauteur de 2 mètres à 2 mètres 50 centimètres, qu'ils soient convenablement espacés et défendus par des tuteurs contre les coups de vent et contre la pression de la neige et du givre.

Ce procédé n'est cependant à conseiller qu'exceptionnellement, à cause des difficultés qu'entraîne son exécution et de la dépense assez élevée à laquelle il donne lieu. En effet, non-seulement la plantation même de tiges aussi élevées demande des soins particuliers, mais le jeune chêne de la hauteur indiquée par Hartig, ne devient propre à être transplanté avec succès, qu'après avoir été une première fois repiqué en pépinière. Lors de ce repiquement, on retranche une portion de son pivot, et on le force ainsi à former plus de racines latérales et plus de chevelu.

En général, il sera bien préférable de ne planter que des sujets de 3 à 5 ans qu'on élève très-facilement et à fort peu de frais en pépinière (voir le 6<sup>e</sup> livre de ce cours), et qu'à défaut, quoique avec beaucoup moins d'avantage, on pourrait même prendre directement en forêt. En les transplantant, on recèpe ces sujets, afin de donner à leur végétation un essor plus rapide (1).

---

(1) Pour que ces repeuplements produisent les précieux résultats qu'il

Comme nous l'avons dit plus haut, on n'opère ces travaux que dans les parties clairiérées ou les moins abritées de la coupe, et l'on arrache, en outre, les souches dépérissantes ou mortes, pour gagner un peu de terrain. Les bois blancs et les morts-bois, s'ils peuplent seuls certaines places de la coupe, doivent aussi être soigneusement extirpés, et remplacés par des essences meilleures (1).

Outre le chêne qui tient le premier rang, d'autres bois, tels que l'orme, le frêne, les grands érables, etc., méritent encore d'être répandus, dans nos taillis sous futaie, plus qu'ils ne le sont; ils amélioreront considérablement la composition du taillis et pourront aussi, avec avantage, faire partie de la réserve.

---

est permis d'en attendre, il est très-essentiel de se souvenir des exigences de nos deux principales espèces de chêne, en ce qui concerne le terrain [70 et 79], afin de ne pas placer indifféremment, ainsi qu'on l'a fait trop souvent jusqu'ici, le rouvre dans les sols frais et humides et en plaine, le pédonculé dans les terrains accidentés, secs et peu profonds.

(1) Dans les taillis sous futaie, ces remplacements s'opèrent souvent naturellement, à la suite d'une année de semence abondante. Il n'est pas rare alors de voir, dans les coupes exploitées depuis quelques années, des semis très-complets de chêne et d'autres essences dures, levés sous les bois blancs et les morts-bois. On conçoit qu'en coupant ceux-ci une ou plusieurs fois, jusqu'à ce que les autres soient en état de soutenir avantageusement la lutte, on fera une excellente opération [356], fort simple en elle-même, peu coûteuse et qui, tout en épargnant au propriétaire des frais de repeuplement bien plus considérables, lui fera encore gagner du temps.

## ARTICLE II.

## Nettoiements et éclaircies.

599. Après avoir assuré, par les moyens que nous venons d'indiquer, la conservation des essences les plus précieuses, on ne peut point encore abandonner le jeune taillis à lui-même; car, bien que l'on ait extirpé les bois blancs et les morts-bois dans les places où ils dominaient entièrement, il s'en trouvera cependant, qui provenant soit de nouvelles semences, soit d'anciennes racines, reparaîtront parmi les cépées de bonnes essences, auxquelles ils ne tarderont pas à nuire. Ainsi que dans les jeunes futaies, ce sera une opération des plus utiles, de faire disparaître ces parasites, aussitôt et autant de fois qu'il en sera besoin. Par ce moyen on écartera toute entrave à la végétation du taillis (1).

En procédant à ce nettoiemement au commencement de l'automne il est probable que l'on diminuera les chances de la reproduction.

---

(1) En principe, il est incontestable que ces nettoiements doivent se faire sans avoir égard aux produits pécuniaires. Cependant, pour éviter une opération entièrement onéreuse et à laquelle un propriétaire aurait de la peine à se décider, on peut ne commencer ces extractions qu'à l'âge de 6 à 9 ans. On en obtiendra, dès lors des fagots propres au chauffage, surtout à celui du four, et dont le prix de vente offrira, le plus souvent, un bénéfice assez considérable. La valeur des bois dans les différentes localités fera avancer ou retarder cette opération utile.

600. Lorsque le taillis, ainsi débarrassé des bois blancs, aura atteint l'âge de 12 à 15 ans, il sera à propos d'y faire une éclaircie, d'après les principes que nous avons développés pour le traitement des jeunes futaies [466]. Toutefois, on devra se borner à enlever les perches dominées qui se trouvent dans les cêpées et respecter soigneusement les brins de semence qui végètent, çà et là, sous le couvert, et dont on peut espérer qu'ils vivront jusqu'au retour de l'exploitation et formeront ainsi une souche nouvelle propre à la reproduction. On devra aussi laisser subsister les *trainants* susceptibles de s'enraciner et de devenir par la suite des pieds indépendants [571]. Une seule éclaircie sera suffisante, si la forêt est exploitée à 20 ou 25 ans; on pourra en effectuer deux, dans le cas d'une révolution de 30 à 40 ans, surtout si l'on ne retarde pas le nettoisement dont nous venons de parler.

Un propriétaire qui cherche à donner des soins raisonnés et suivis à l'exploitation de son taillis, augmentera le nombre des éclaircies, favorisera par là l'accroissement des bois et obtiendra plus de produits (1).

---

(1) Voir l'appendice.

## ARTICLE III.

## Elagage des baliveaux.

601. Pour compléter la série de travaux à exécuter dans les taillis, il nous reste à parler de l'élagage ou taille des baliveaux opération dont on ne peut méconnaître l'utilité.

Aussitôt qu'on les isole, la plupart des arbres et principalement le chêne, se garnissent abondamment, le long du tronc, de branches gourmandes qui détournent, à leur profit, une grande partie de la sève destinée précédemment à la cime. Ces branches prenant un prompt accroissement, il arrive, au bout de plusieurs années, que la cime n'est plus assez nourrie ; elle sèche et amène ainsi le dépérissement prématuré de l'arbre. De plus, la tige devient très-noueuse et moins propre, par conséquent, au service et au travail. Il est donc évident que l'émondage de ces branches gourmandes, pratiqué non-seulement sur les réserves anciennes et modernes, mais aussi sur les baliveaux de l'âge, est de la plus grande utilité, si le taillis sous futaie doit atteindre son but.

Les époques auxquelles l'émondage doit se faire ne peuvent être déterminées avec précision. Le plus ordinairement, il y a lieu de le commencer trois ans après l'exploitation de la coupe, et de le répéter de trois en trois années, jusque vers la moitié ou les deux tiers de la révolution ; le taillis, alors, devient

assez élevé pour empêcher de nouvelles productions du tronc (1).

La coupe des branches se fera rez-tronc, avec une serpe bien tranchante et en menant le trait de l'instrument de bas en haut, afin de ne point arracher l'écorce. Quant au moyen d'exécuter cette opération avec facilité, surtout sur de gros arbres, le meilleur paraît être de se servir d'échelles; l'ouvrier conserve ainsi les deux bras libres, et se meut plus aisément en tous sens que lorsqu'il est réduit à grimper, fût-il même muni de crampons (2).

La saison à choisir pour ces travaux est le commencement de l'automne, comme étant la moins favorable à la reproduction. Dans les pays où le bois a de la valeur, cet émondage n'est point onéreux; les bourrées qui en résultent couvrent presque toujours les frais d'exploitation et donnent souvent même des bénéfices. Mais n'en fût-il pas ainsi, il conviendrait cependant de tenir à son exécution; l'avantage marqué qu'on en obtiendra pour les arbres compensera amplement les frais.

---

(1) Voir l'appendice.

(2) Les crampons dont se servent habituellement les élagueurs, et aussi les délinquants, pour grimper sur les arbres, sont très-funestes aux chênes. La piqure du crampon laisse une trace ordinairement visible à l'extérieur, et détermine à l'intérieur un épanchement de sève qui produit une tache noire, plus ou moins large, dans le bois et donne naissance à un vice analogue à la *frotture*. — Voir le *Cours d'exploitation, débit et estimation des bois* par M. Nanquette, pages 255 et 256.

602. Outre les branches gourmandes, l'élagage doit encore porter, dans les baliveaux, anciens et modernes, sur les branches sèches qui pourraient se présenter, et sur celles des branches latérales qui, s'étendant trop, empêchent l'arbre de gagner en hauteur et écrasent le taillis en pure perte. Cette dernière opération demande du discernement de la part de celui qui la dirige, et de l'adresse dans l'exécution. Il ne faut point perdre de vue que si la végétation de la jeune tige est facile à diriger par la taille, l'arbre déjà âgé peut éprouver un grand dommage par l'enlèvement total de fortes branches; tant parce que cet enlèvement interrompt l'équilibre entre la tête et les racines, que parce que les plaies, occasionnées au tronc par l'opération, ne se cicatrisent parfois qu'imparfaitement et deviennent ainsi une cause de pourriture. C'est surtout le chêne qui est plus particulièrement exposé à ce dernier genre de vices. Les nœuds gâtés, les grisettes, les huppés [76 bis] n'ont souvent pas d'autre origine qu'une branche dont l'amputation a été faite trop près du tronc. Il est donc à conseiller de ne jamais couper rez-tronc les branches vives qui ont plus de 10 à 12 centimètres de diamètre, et dans ce cas, de se borner à en retrancher les extrémités pour les empêcher de s'allonger davantage. Mais si, par un motif particulier, tel que la rupture accidentelle, par exemple, on était forcé de supprimer une branche, il faudrait, s'il se peut, laisser subsister un chicot de 1 mètre au moins

de longueur, garni de quelques ramilles, afin d'y attirer la sève et de garantir ainsi le chicot contre la pourriture. Il ne faut pas oublier non plus, que l'arbre isolé a besoin, pour prospérer et pour résister aux intempéries, d'une tête plus développée que celui qui a crû en massif, et qu'il ne peut d'ailleurs jamais atteindre la hauteur de ce dernier, par cela même qu'il a un plus grand nombre de branches à nourrir (1).

603. L'élagage est un art qui a ses règles théoriques et pratiques, et qui, transporté en partie dans la culture des bois, peut produire des effets heureux. Dans les forêts de l'Etat surtout, il a une haute importance, à cause des moyens qu'il offre pour favoriser la formation des courbes et courbants propres aux constructions navales (2).

---

(1) Voir l'appendice.

(2) On peut consulter avec fruit, sur cet objet, le *Manuel de l'Élagueur ou de la conduite des arbres forestiers*, par M. Holton. Paris, chez M<sup>me</sup> Huzard ; prix : 2 fr.

---



---

## CHAPITRE QUATRIÈME.

---

### DU BALIVAGE DES TAILLIS

SELON L'ORDONNANCE RÉGLEMENTAIRE DU CODE FORESTIER.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Texte de l'ordonnance.

604. Après avoir cherché à fixer les règles de l'exploitation des taillis, en nous appuyant tout à la fois sur la théorie et sur l'expérience, il ne sera pas inutile de nous occuper des dispositions légales qui, en France, régissent la matière, et auxquelles les agents de l'administration des forêts sont tenus de se conformer, toutes les fois qu'il n'existe pas de règlement spécial pour la localité qu'ils administrent

Ces dispositions, qui se rapportent principalement au mode de balivage, se trouvent consignées dans l'article 70 de l'ordonnance royale du 1<sup>er</sup> août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier; elles sont ainsi conçues :

« Lors de l'exploitation des taillis, il sera réservé  
» 50 baliveaux de l'âge de la coupe, par hectare. En  
» cas d'impossibilité, les causes en seront énoncées  
» aux procès-verbaux de balivage et de martelage.

» *Les baliveaux modernes et les anciens ne pour-*  
» *ront être abattus, qu'autant qu'ils seront dépérissants*  
» *ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle*  
» *révolution.* »

## ARTICLE II.

Examen de ces dispositions et conséquences qui en découlent.

605. Cet article, calqué sur l'ordonnance de 1669 qui a régi les forêts jusqu'en 1827, paraît avoir pour but principal d'assurer à la France, qui possède peu de futaies, les ressources nécessaires en bois de construction et de travail.

On a craint, avec quelque raison sans doute, que, du silence du code et de l'ordonnance à l'égard des arbres à réserver sur les taillis, il ne résultât, en général, une anticipation sur les ressources de l'avenir, et que, pressées par des besoins toujours croissants, les générations actuelles ne vinssent à absorber plus que l'usufruit de richesses dont les siècles passés les ont rendues dépositaires.

En second lieu, il importait de donner aux agents forestiers un point d'appui légal qui, dans l'administration des forêts des communes et des établissements publics, leur permît de renfermer dans de

justes bornes le mode de jouissance des propriétaires.

Sous ces divers rapports, on ne peut qu'approuver la sagesse de l'article de l'ordonnance; mais il est impossible de méconnaître, d'un autre côté, les graves inconvénients de l'état de choses qu'il a consacré.

En effet, deux objets nous frappent dans les prescriptions qu'il renferme :

1° Un même mode de balivage est appliqué à tous les taillis;

2° Dans ce mode, on ne fixe que le nombre des baliveaux de l'âge; celui des modernes et des anciens n'est point déterminé.

Ainsi le taillis sous futaie est admis partout, le taillis simple nulle part. Et cependant, que de forêts dont le sol est entièrement impropre à la culture d'arbres de fortes dimensions, et dont l'essence, d'ailleurs, rend cette culture sans objet !

On comprend tout de suite qu'une application aussi générale et aussi peu raisonnée d'un mode d'exploitation quelconque, ne peut que faire commettre de nombreuses fautes. Or, au cas particulier, ces fautes seront d'autant plus graves que le balivage prescrit ne donne pas le moyen de les atténuer, car l'ordonnance ne s'arrête que devant le dépérissement des arbres, et n'admet, dans le nombre des réserves, aucune modification tirée des circonstances qui influent sur la végétation et sur l'emploi des bois.

Enfin, le traitement qu'elle ordonne, suivi à la lettre, conduit, dans un temps plus ou moins long, à la destruction de l'état de forêt auquel il doit s'appliquer (le taillis sous futaie).

C'est cette dernière assertion qu'il nous reste à prouver.

606. Pour administrer cette preuve, il nous suffira d'examiner ce que devient, à la longue, un taillis sous futaie exploité d'après le régime de l'ordonnance.

A cet effet, admettons, comme plus haut [594], une révolution de 30 ans. Etablissons de plus (ce qui ne saurait être contesté), que le chêne, le hêtre et la plupart des autres essences dures, peuvent, dans un sol de fertilité moyenne, atteindre généralement l'âge de 180 ans ou six révolutions, sans dépérir et sans présenter des signes évidents de mauvaise végétation, et, par conséquent, sans être parvenus au degré d'exploitabilité voulu par l'ordonnance. Adoptons aussi, pour les différentes catégories de baliveaux, le même couvert qui a servi de base à nos calculs concernant le balivage normal; et supposons, pour les arbres de six révolutions dont il n'a pas été question dans ces calculs, un couvert de 70 mètres carrés, c'est-à-dire, supérieur de dix mètres carrés seulement, à celui des vieilles écorces de 150 ans. Enfin, fixons, comme plus haut [594], le déchet des baliveaux de l'âge à un cinquième.

Le tableau ci-après fait voir quel sera, avec ces données, le couvert sur un hectare, au bout de la sixième révolution.

RÉSERVES par CLASSES D'ÂGE.	NOMBRE de RÉSERVES.	COUVERT d'un ARBRE.	COUVERT de tous LES ARBRES.
		mèt. car.	mèt. car.
Vieilles écorces (6 révolutions) ..	40	70	2800
Id. (5 révolutions) ..	40	60	2400
Anciens (4 révolutions) . . . . .	40	42	1680
Id. (3 révolutions) . . . . .	40	32	1280
Modernes. . . . .	40	15	600
TOTAUX. . . . .	200	»	8760

Ainsi, après six révolutions, les 200 arbres qui existeront sur un hectare, couvriront 8760 mètres carrés, et le taillis n'en occupera plus que 1240 où il ne sera pas surmonté.

Autant vaudrait dire que le taillis sous futaie a disparu pour faire place à une futaie bâtarde, dont les arbres différents d'âge, branchus et de hauteur inégale, se gênent et s'entravent réciproquement.

Dans cet état de choses, si l'on vient à couper les réserves les plus âgées, il est évident qu'on ne pourra plus compter sur des rejets de souche; et les clairières occasionnées par l'enlèvement de ces arbres, se garnissant principalement de bois blancs, ceux-ci déposséderont peu à peu les bonnes

essences. Toutefois, deux expédients pourraient être employés pour prévenir un aussi fâcheux résultat. L'un, que nous connaissons, serait de repeupler ces clairières par semis ou par plantation [597]; l'autre consisterait à abandonner, pendant une révolution, le mode du taillis sous futaie, et à établir des coupes de régénération avec les arbres de réserve, afin de produire, de semence, une jeune forêt susceptible d'être de nouveau exploitée en taillis. Mais, le premier de ces moyens a l'inconvénient de devenir fort coûteux, en raison de la surface considérable à repeupler artificiellement chaque année (2800 mètres carrés par hectare, c'est-à-dire, plus du quart de la contenance de la coupe); le second compromet le rapport soutenu et fait succéder la disette à l'abondance; car il oblige à abattre toutes les réserves dans le cours d'une même révolution, et réduit, par conséquent, les produits des révolutions suivantes au taillis seul.

De quelque point de vue qu'on le considère donc, le balivage selon l'ordonnance, exécuté à la lettre, ne saurait aboutir qu'à de mauvais résultats. Dans les terrains propres au taillis sous futaie, ces résultats ne se feront sentir qu'après un assez grand nombre d'années; au contraire, dans les terrains que réclamait le taillis simple, le mal sera pire et plus prompt.

## ARTICLE III.

## Conclusion.

607. Il faut le reconnaître, l'article 70 de l'ordonnance réglementaire du code forestier, quoique dicté par une sage prévoyance, a maintenu dans les taillis un état de choses vicieux qu'il est urgent de remplacer par un régime d'exploitation fondé, dans chaque localité, sur les exigences culturales et sur celles de la consommation. Notre opinion n'est pas, cependant, que cet article soit abrogé immédiatement ; nous croyons au contraire, qu'il doit être maintenu quant à présent, parce que, comme nous l'avons dit au commencement de ce chapitre, nous reconnaissons en lui un principe conservateur, propre à prévenir de funestes abus.

Mais, ce que nous désirons vivement, c'est son abrogation graduelle, par des dispositions d'aménagement<sup>(1)</sup>, basées sur un mûr examen des lieux, et sur la saine application des principes d'économie forestière. Une semblable mesure n'a d'abord rien de contraire à la loi, et semble même avoir été prévue par elle ; car l'article 15 du code forestier (qui s'applique aux forêts de l'Etat comme à celles

---

(1) On entend par ce terme, l'opération qui consiste à régler, pour une ou plusieurs révolutions, le mode de culture d'une forêt, ainsi que la marche et la quotité de ses exploitations.

des communes et des établissements publics), dit : *que les aménagements seront réglés par des ordonnances royales* (1), c'est-à-dire, par des actes qui ont même force que l'ordonnance réglementaire elle-même, et qui, par conséquent, peuvent la modifier.

Trop souvent, jusqu'ici, on n'a fait consister l'aménagement des taillis que dans la fixation de la révolution, et dans la division du terrain en coupes d'égale contenance.

Quant au mode de balivage, on le passait sous silence, s'en référant ainsi aux dispositions de l'ordonnance réglementaire.

Nous pensons qu'au contraire, ce dernier objet devrait toujours être soumis à une discussion approfondie, dans les procès-verbaux d'aménagement, et que, partout où sous ce rapport il existe une lacune dans les anciens actes, il faudrait s'empresse de la remplir, en provoquant des décrets complémentaires, qui régleraient cette importante matière.

C'est ainsi que, sans s'exposer aux inconvénients d'une abrogation immédiate de l'article 70 de l'ordonnance, on réaliserait peu à peu une amélioration de la plus haute portée dans l'état de nos forêts (2).

---

(1) Aujourd'hui, des décrets de l'Empereur.

(2) Voir l'appendice.



## CHAPITRE CINQUIÈME.

---

### APPLICATION

DES

### DEUX MÉTHODES D'EXPLOITATION DU TAILLIS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

#### Exploitation du chêne en taillis.

608. Le chêne, l'arbre le plus intéressant pour la futaie, est en même temps l'un des plus propres à croître en taillis. Sa souche produit des rejets pendant près de deux siècles, lorsque le sol lui est favorable ; elle donne des cépées abondantes et d'une croissance prompte, qui fournissent un bon bois de chauffage, de charbon et d'ouvrage.

L'écorce du chêne, qui est particulièrement recherchée pour les tanneries, est d'autant meilleure pour cet usage, que le bois est plus jeune et qu'il a

crû plus rapidement. Cette circonstance rend les taillis de chêne infiniment précieux et leur donne une valeur qu'aucune autre essence ne peut atteindre.

Il importe de remarquer que sous le double rapport de la faculté de reproduction des souches et de la qualité des écorces, le chêne rouvre est préférable au pédonculé. De plus, son feuillage étant plus abondant, il couvre et conserve mieux le sol que ce dernier.

Si l'on veut traiter le chêne en taillis sous futaie, on en obtiendra des bois de travail et de service d'une utilité générale, et particulièrement des courbes de marine, si recherchées aujourd'hui, attendu le libre développement que peuvent prendre, dans ce genre de forêt, les branches de la cime.

Le seul inconvénient des taillis de cette essence, déjà signalé plus haut [597], est que les brins de semence y réussissent trop rarement. Lors donc que les souches périssent, il devient indispensable de les remplacer au moyen du semis ou de la plantation.

609. Quand il y a lieu d'écorcer les taillis de chêne, il faut attendre que le bois soit en pleine sève, c'est-à-dire que les bourgeons commencent à s'épanouir, car ce n'est qu'alors qu'on peut procéder à cette opération. Le mieux est d'écorcer les arbres et les perches sur pied, après que tous les menus bois non susceptibles d'écorcement auront été coupés et enlevés.

Les bûcherons chargés de l'écorcement doivent

d'abord faire, au pied des arbres et des perches, une entaille circulaire assez profonde pour arriver jusqu'à l'aubier. Ils fendent ensuite l'écorce longitudinalement et par bandes, avec la pointe d'une serpe ou avec une lame quelconque, et la lèvent avec un outil en fer, en bois dur ou en os, qui a la forme d'une spatule. Cette écorce qui se détache sans peine lorsque la température est douce et un peu humide, s'arrache, depuis la coupure circulaire au bas du tronc, jusqu'au point le plus élevé où le bûcheron puisse atteindre. Il arrive souvent que les ouvriers arrachent l'écorce du haut en bas, ce qui rend d'autant plus indispensable la coupure circulaire au pied des chênes; cette coupure empêche que la souche et les racines ne soient dépouillées de leur écorce dont l'adhérence complète au bois est, comme on le sait, une condition indispensable de la production des rejets.

Ce premier travail fait, on coupe les chênes à fleur de terre pour en écorcer les parties supérieures qui n'avaient pu être atteintes. On expose pendant quelque temps les écorces au soleil, pour les sécher, puis on les lie en bottes. Il faut se hâter de les mettre à couvert; car si elles étaient exposées à la pluie, elles perdraient de leur qualité.

L'écorcement diminue de quelque chose le volume du bois; on calcule cette diminution au huitième à peu près. Mais cette perte est largement compensée par la valeur de l'écorce, et il est arrivé déjà que le

prix de l'écorce d'une coupe a dépassé celui du bois dont elle provenait. La perte la plus réelle est celle de la sève du printemps, qui s'écoule sans résultat et remet à la sève d'été la production de rejets moins robustes alors pour résister aux fortes gelées [576].

La température de la France étant généralement assez douce, cet inconvénient n'est que peu à craindre dans un grand nombre de départements ; et les besoins des tanneries, ainsi que les grands avantages pécuniaires que présente l'écorcement ne permettent pas d'hésiter sur son adoption (1).

L'expérience prouve d'ailleurs que cette opération ne compromet pas l'existence des taillis de chêne. Ce qui est très-probable, néanmoins, c'est que les souches coupées toujours en temps de sève ne sauraient avoir la durée de celles dont la coupe ne s'effectue, au contraire, qu'en saison convenable.

---

(1) L'écorçage à la vapeur, dont M. Maître est l'inventeur, permet d'enlever et d'utiliser l'écorce des chênes abattus en toute saison ; son emploi éviterait les inconvénients des procédés actuels, au point de vue de la reproduction des taillis. Des expériences, qui ne sont pas encore décisives, tendent d'ailleurs à établir que l'on obtiendrait ainsi, à moins de frais, une écorce d'aussi bonne qualité que celle faite au printemps.

## ARTICLE II.

## Exploitation du hêtre en taillis.

610. Il est incontestable que le hêtre n'est pas disposé à repousser sur souche ; une écorce trop adhérente au bois et d'un tissu trop serré, semble s'opposer au développement facile des rejets. Quelle que soit au surplus l'organisation particulière de cet arbre, il est de fait, qu'en le traitant en taillis, et surtout en le coupant à fleur de terre, on s'expose à voir mourir les souches.

Nous avons dit ailleurs [578], qu'un moyen de soutenir plus longtemps le hêtre en taillis, consiste à couper toujours au-dessus du nœud de l'exploitation précédente, afin que la sève, circulant sous une écorce plus jeune et plus tendre, ait plus de facilité à produire de nouvelles pousses. Mais, outre que ce moyen n'est pas infailible dans certaines localités (1), surtout dans les situations élevées et froides,

---

(1) De nombreuses observations ont constaté que le hêtre repoussait mieux de souche dans les terrains maigres que dans les bons fonds. Hartig avait cherché à expliquer cette particularité de la manière suivante, sans toutefois prétendre que son explication fût la vraie. « Dans un sol substantiel, dit-il, l'affluence très-forte de la sève donne lieu à des bourgeons d'une grande vigueur. Mais l'écorce dure du hêtre, faisant obstacle à ce qu'ils paraissent promptement à la surface extérieure, il arrive qu'ils se crispent et prennent une croissance contournée qui alors ne leur permet plus de percer. Lorsque le sol est médiocre, au contraire, la sève

les souches d'un taillis ainsi exploité présenteraient, au bout de quelques révolutions, des chicots informes qui, s'élevant toujours davantage, finiraient par devenir de petits têtards, sur lesquels les rejets n'auraient plus une insertion et une assiette assez solides pour résister aux coups de vent ou à la pression de la neige et du givre.

611. Hartig, dont l'expérience est d'un grand poids dans toutes les questions forestières, a reconnu l'impossibilité de maintenir les taillis de hêtre, en suivant les règles ordinaires de l'exploitation des taillis ; il propose, en conséquence, un mode particulier dont voici les détails.

Supposant la forêt de hêtre soumise à une révolution de 30 ans, il conseille de réserver à la première exploitation, 100 baliveaux par hectare ; à la deuxième, lorsque les souches auront 60 ans, il veut que l'on réserve, par hectare, 2000 baliveaux. Trente ans plus tard, les souches ayant 90 ans, on doit interrompre le régime du taillis ; et exploiter d'après la méthode du réensemencement naturel. Les 100 premières réserves étant âgées de 90 ans, et les 2000 autres de 60 ans, on peut espérer la se-

---

est peu abondante, la végétation moins prompte, et les bourgeons trouvent moyen de perforer lentement l'écorce. » Ce qui confirmait Hartig dans son opinion, c'est qu'il avait remarqué que, dans les bons sols, le hêtre repousse mieux lorsqu'il est coupé en temps de sève, c'est-à-dire, lorsque les souches ont perdu une partie de la sève surabondante.

mence nécessaire au repeuplement du terrain. On doit alors effectuer les trois coupes de régénération, dont l'effet sera de créer une jeune forêt qui remplacera les anciennes souches et qui pourra de nouveau être traitée en taillis, sauf, toutefois, à lui appliquer le même mode.

Hartig ne fait mention que d'un taillis de hêtre qui n'a jamais été exploité, et qui, à la première coupe, ne présente que des souches de 30 ans. Une pareille forêt se rencontre rarement; il est plus ordinaire d'en trouver qui ont déjà été exploitées pendant quelques révolutions et où les souches sont d'âges très-différents. Dans ce cas, il faudra donc réserver de suite 2000 perches par hectare. Ce nombre, toutefois, ne doit pas être considéré comme invariable; il dépend de la grosseur des perches et de la quantité d'arbres antérieurement réservés. Il ne s'agit, en effet, que d'établir un massif convenable, qui puisse produire le repeuplement naturel aussitôt que les perches seront assez âgées pour porter semence.

612. En réfléchissant aux moyens jugés indispensables pour assurer la durée du hêtre en taillis, on est nécessairement amené à conclure que ce mode d'exploitation ne lui convient pas et qu'on lui fait violence en l'y soumettant.

Si l'on examine avec attention les taillis de hêtre, surtout ceux dont les souches sont un peu anciennes, on y trouvera toujours des clairières plus ou moins

considérables, causées par la mort d'une partie de ces souches ; si les clairières sont remplies, ce sera par des essences à semences légères, le plus souvent par les bois blancs, à moins que des repeuplements artificiels n'y mettent obstacle. C'est ainsi que le hêtre est peu à peu dépossédé du terrain où antérieurement il dominait.

Les moyens proposés par Hartig sont sans doute suffisants pour prévenir un tel résultat ; mais ils sont compliqués et peu avantageux au propriétaire, à cause de la suppression presque totale des produits de la deuxième révolution. En effet : couper d'abord afin d'obtenir des rejets ; puis, dès la seconde révolution, laisser sur pied la plus grande partie de ces rejets pour en former des arbres à semences ; exploiter ensuite d'après la méthode du réensemencement naturel, et ne reprendre enfin le régime du taillis que lorsque la semence aura créé de nouveau une jeune forêt, tels sont ces moyens.

Ce n'est donc qu'avec beaucoup de soins, et à l'aide d'opérations difficiles et même onéreuses, que l'on parvient à conserver le hêtre en taillis, tandis qu'on perpétue facilement cette essence par la méthode du réensemencement naturel, méthode uniforme, dont les règles sont faciles à suivre, et par laquelle on obtient d'ailleurs, dans un temps donné, des produits en matière plus considérables et plus utiles. Toutefois, lorsque les circonstances ne permettront point de traiter les forêts de hêtre en futaie,



## ARTICLE III.

## Exploitation du châtaignier en taillis.

614. La souche du châtaignier a une longue durée, et les cépées qu'elle produit sont bien fournies et d'une croissance vigoureuses et rapide. C'est surtout dans des pays vignobles que les taillis de cette essence sont avantageux, à cause des cercles de futaille et des échalas qu'ils fournissent et qui sont de première qualité.

Les bativieux sont d'autant moins à conseiller, dans les taillis de châtaignier, que leur couvert est épais et que les rejets supportent difficilement d'être dominés. Les perches de 10 à 15 ans fournissent d'ailleurs déjà des fruits; les réserves, sous le rapport du repeuplement naturel, ne sont donc pas nécessaires. On peut, toutefois, en conserver sur les lisières du taillis, afin d'obtenir quelques fortes pièces et d'augmenter la récolte des châtaignes.

Dans les départements du Rhin, où il existe beaucoup de taillis de châtaignier, on a l'habitude, après chaque exploitation, de cultiver le terrain, entre les souches, pendant un ou deux ans. Ordinairement on y plante des pommes de terre. Outre la récolte que cette opération produit, elle a le grand avantage d'activer considérablement la végétation des cépées en débarrassant le châtaignier des arbustes et des morts-bois, qui, comme on le sait, lui nuisent beaucoup.

## ARTICLE IV.

## Exploitation de l'aune en taillis.

615. Le régime du taillis est celui qui convient le mieux à l'aune. Ses souches fournissent, pendant plus d'un siècle, des rejets abondants et d'une croissance rapide, et l'aune blanc drageonne même beaucoup.

En général, les baliveaux qu'on réserve dans les aunaies, pour fournir de la semence, ne remplissent pas le but proposé.

Les aunes se trouvent d'ordinaire ou dans les marais, ou dans les sols aquatiques, ou enfin, dans des lieux très-humides. Dans les deux premiers cas, la semence est noyée; dans le dernier, le terrain est tellement gazonné ou rempli de joncs et d'autres plantes nuisibles, que la graine tombe en pure perte. Il ne faut donc pas compter sur le semis naturel pour l'entretien du taillis; le seul moyen de repeuplement, lorsque les drageons ne réussissent pas, consiste dans la plantation, et pour l'aune blanc dans les boutures (1).

On doit cependant réserver quelques baliveaux, mais dans le seul but d'élever quelques arbres utiles aux constructions hydrauliques et à d'autres usages.

---

(1) Voir le VI<sup>e</sup> livre de ce cours.

Lorsque les aunaies se trouvent placées dans des marais d'une grande profondeur, il devient impossible de les exploiter autrement qu'en hiver, pendant les fortes gelées, quels que soient d'ailleurs les inconvénients qui peuvent en résulter pour la reproduction.

#### ARTICLE V.

Exploitation du robinier faux accacia en taillis.

616. Le robinier est une des essences les plus propres au taillis, lorsqu'il est placé dans un sol et dans un climat convenables. Non-seulement il croît avec une rapidité prodigieuse (1), mais il drageonne abondamment et son bois acquiert dès les premières années un grain très-serré.

Un inconvénient assez grave des taillis de robinier, c'est la multiplicité d'épines qui garnissent les tiges ; la blessure de ces épines est fort douloureuse et présente même souvent, dit-on, quelque danger. Cette circonstance rend l'exploitation de ces bois difficile, et beaucoup plus coûteuse, par conséquent, que celle des autres.

Quant aux baliveaux, il n'est pas à conseiller d'en

---

(1) Dans un sol substantiel et frais, les rejets s'élancent souvent dès la première année à 3 et même à 4 mètres de haut, et, à l'âge de 5 ou 6 ans, les perches mesurent jusqu'à 8 et 10 centimètres de diamètre à un mètre de terre.

réserver. La tête du robinier est rameuse et très-sujette à être déchirée par les vents ; il n'est donc pas prudent de l'isoler sur le taillis.

## ARTICLE VI.

## Exploitation des taillis mélangés

617. A quelques exceptions près, les essences dont nous venons d'examiner, dans les cinq articles précédents, l'exploitation en taillis, se trouvent, comme tous les autres arbres feuillus, ordinairement mélangés dans les taillis et y dominant plus ou moins, suivant que le climat et le sol conviennent davantage aux uns ou aux autres. Le chêne et le hêtre même se rencontrent rarement sans mélange d'autres bois et, lorsque ce mélange est maintenu dans de justes bornes, il est loin d'être contraire à la bonne croissance de nos essences d'élite, surtout de celles dont il convient de composer la réserve. Il en est ainsi, par exemple, du chêne pédonculé, la plus précieuse de toutes au point de vue des grands emplois. Cet arbre, propre aux plaines fertiles ou humides ne peut se maintenir à l'état pur dans les taillis, à cause du couvert incomplet de sa cime [82] ; son pied est donc presque toujours environné d'essences secondaires [591] qui, tout en protégeant le sol, ne souffrent que très-faiblement d'être surmontées. Les plus belles et les meilleures pièces de chêne que fournissent les taillis se rencontrent dans de telles conditions.

Les ormes, les frènes, les érables, les charmes et les tilleuls, se reproduisent très-abondamment de souches, pendant 100 à 150 ans ; les deux premiers ont une disposition marquée à drageonner, et les charmes et les tilleuls, qui poussent de nombreux *trainants* [571], se perpétuent facilement de cette manière, lorsque la souche-mère vient à mourir.

Les bouleaux, les alisiers, les sorbiers, les merisiers et les micocouliers fournissent des rejets jusqu'à 60 et 80 ans, et les saules et les trembles dont le pied est de moindre durée, drageonnent considérablement.

En général, le mélange des deux derniers (parfois aussi celui du tilleul) avec les essences dures n'est pas favorable, et, lorsqu'il existe, il importe de le surveiller [599], afin d'empêcher que ces essences ne soient surmontées, étouffées et finalement évincées par les bois blancs. Ce n'est que par des nettoiemens fréquemment répétés que l'on peut maintenir un mélange convenable.

En ce qui concerne le balivage dans les taillis mélangés, simples ou composés, toutes les indications nécessaires ont été données plus haut [591 à 596].

#### ARTICLE VII.

##### Exploitation des taillis d'arbrisseaux.

618. Il faut éviter de mêler les arbrisseaux avec les arbres. Dans les premières années, leur crois-

sance pourrait être égale, mais plus tard, les arbrisseaux seraient immanquablement surmontés ; il ne peut être convenable d'ailleurs de soumettre les uns et les autres à la même révolution.

Ceux des arbrisseaux qui, par la qualité de leur bois et par les usages auxquels ils sont propres, méritent plus particulièrement l'attention du forestier, sont : les *petits saules*, le *cornouiller mâle*, le *coudrier* et le *cerisier à grappes*. Les deux derniers peuvent avec avantage croître en mélange. Quant au cornouiller mâle, il n'existe guère d'espèce feuillue d'une végétation aussi lente ; on ne peut donc le cultiver que seul. Ordinairement on l'exclut des forêts, parce que, mêlé à d'autres essences, il en est écrasé et, ne pouvant s'élever, il s'étale. Cependant, l'excellente qualité de son bois, sa souplesse, sa dureté devraient lui faire accorder, dans les forêts, une place petite mais exclusive, puisqu'il ne peut s'allier à aucune autre essence.

Comme nous l'avons dit [574], c'est pour les taillis d'arbrisseaux qu'il convient d'adopter les révolutions de 5 à 10 ans ; le cornouiller, toutefois, pourrait être coupé à un âge un peu plus avancé, vu la lenteur de sa croissance. Exploités ainsi, on les nomme *menus-taillis*. Il est inutile d'ajouter que ces essences ne sont traitées qu'en taillis simple et, la plupart du temps, sans aucune réserve.

---

## CHAPITRE SIXIÈME.

---

### DU SARTAGE.

---

619. On appelle *sartage*, un mode particulier d'exploiter les taillis, qui consiste à cultiver des céréales, à chaque coupe, pendant un ou deux ans, après avoir brûlé, au préalable, les menus bois, broussailles, morts-bois et autres plantes, sur la surface du sol, dans le but de le rendre plus favorable à la végétation.

C'est principalement dans les Ardennes, dans les pays de Liège et de Luxembourg et sur différents points de l'Allemagne méridionale que cette pratique est en usage. Elle est extrêmement ancienne et semble avoir pris naissance, dans ces contrées, par suite du manque de terres arables dû à la fois à la pauvreté du sol, à sa forme accidentée, et à l'âpreté du climat.

Le chêne, particulièrement le rouvre, est de toutes les essences celle qui supporte le mieux le sartage. Dans les Ardennes, les taillis sartés, situés généra-

lement en pente et sur un sol de schiste ardoisier, sont presque exclusivement composés de chêne rouvre qui, dans ces conditions, fournit des bois de feu et de charbon excellents, de fort bons bois d'œuvre, quand on fait des réserves, et surtout des écorces de première qualité (1). Ces écorces et les céréales formant les produits les plus importants des taillis soumis au sartage, il est de l'intérêt du propriétaire d'exploiter ceux-ci à de courtes révolutions, c'est-à-dire, de 15 à 25 ans.

620. Lorsque le sol est nu, dépourvu à la surface d'herbes et de gazon, l'opération du sartage a lieu de la manière suivante.

Après avoir écorcé sur pied, lors de la sève du printemps [609], puis abattu et vidé le bois de la manière ordinaire, on répand sur la surface du sol, entre les souches exploitées, toutes les menues branches, brindilles, cimeaux et broussailles qui n'ont point fait partie du bois de corde (2). Par un temps

---

(1) La qualité des écorces est, en général, d'autant meilleure que le liber a une épaisseur plus considérable, comparativement aux couches corticales et à l'épiderme ; car il paraît que le tannin est contenu surtout dans le liber. Or, cet organe est d'autant plus développé que la végétation est plus rapide et que le bois est jeune ; ces deux circonstances se trouvant réunies dans les taillis sartés, on conçoit que les écorces qu'ils fournissent doivent être de très-bonne qualité.

(2) En général, on ne fait pas de fagots dans les taillis sartés, mais on façonne en cordes, soit pour le chauffage ordinaire, soit pour être carbonisé (bois de charbonnette), tout le bois au-dessus de 25 millimètres environ de diamètre.



calme, on y met le feu. La flamme se propage rapidement et convertit en cendres le bois ainsi répandu. Cette mise à feu doit avoir lieu, au plus tard, dans les premiers jours de juillet (1). Afin de circonscrire le feu dans la coupe en exploitation, on en pioche à la houe le pourtour sur une certaine largeur, immédiatement avant la mise à feu, et l'on dispose des hommes sur tout le périmètre, afin de combattre et de maîtriser l'incendie si, par accident, il venait à atteindre les parties voisines. Dans quelques localités de l'Allemagne, on prend même la précaution, lorsque la coupe est grande, de la subdiviser en un certain nombre de parcelles ou lots dont chacune séparément est mise à feu. Les séparations s'établissent, soit en labourant le pourtour de chaque parcelle sur une certaine largeur, soit en réunissant sur ce pourtour des perches de la coupe qui, mises en tas continu, forment un petit

---

(1) Dans l'Odenwald (grand-duché de Hesse-Darmstadt) le délai de rigueur pour la mise à feu est fixé au 10 juin; dans les Ardennes, au contraire, elle n'a lieu qu'en août et septembre. Il en résulte, évidemment, que les rejets de la première année sont détruits. C'est un retard fâcheux, et il est permis de croire que ce nouveau trouble apporté dans la végétation des souches altère leur vitalité et compromet leur durée. Mais d'un autre côté, la repousse ne se produisant qu'au printemps suivant (quelquefois même dans le second printemps), les rejets naissent dans de meilleures conditions pour résister aux froids de l'hiver [576 et 609], ce qui, dans un climat aussi rude, est peut-être une circonstance essentielle à leur réussite (v. note, p. 350).

rempart ou sentier en relief. Enfin, le périmètre de la coupe entière est encore labouré sur une largeur de plusieurs mètres.

Quand le moment est venu de semer les céréales, on les répand sur le sol, et on les recouvre au moyen d'un léger labour à la houe. Quand le sarage a été effectué de bonne heure, on peut cultiver du sarrasin la première année et du seigle l'année suivante; mais si, au contraire, la saison est déjà avancée, il faudra se contenter d'une seule récolte de seigle (1). Ces céréales devront être coupées à la faucille, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que les rejets soient respectés.

Le mode de sarage que nous venons de décrire,

(1) Feu M. de Salomon, directeur de l'Ecole forestière, a rapporté, en 1835, d'une tournée faite avec ses élèves dans l'Odenwald, une céréale, appelée *seigle multicaule* (*secale cereale multicaule*), qui est cultivée avec un très-grand succès dans les taillis sarrés. Ce seigle est bisannuel et se sème dans les taillis avec le sarrasin. La première année, il ne s'élève qu'à environ 16 centimètres et on peut le couper, sans lui nuire, en récoltant le sarrasin. La deuxième année, ses tiges, qui sont ordinairement à vingt ou trente sur le même pied, s'élèvent à plus de 2 mètres et donnent des épis très-productifs. Son emploi, en mélange avec le sarrasin, présente d'abord l'avantage de procurer deux récoltes au moyen d'une seule culture; en second lieu, on évite les dangers de la dégradation des sols inclinés, dans lesquels, comme on le sait, les terres trop ensablées par la culture sont toujours exposées à être entraînées par les eaux pluviales. (Voir le *Mémoire* publié par M. de Salomon dans le journal de la société d'agriculture de Nancy, février 1836, sur le sarage des taillis de chêne de l'Odenwald et sur le seigle multicaule.)

se nomme *sartage à feu courant*. Les cendres qui en résultent ajoutent à la fertilité du sol par les sels qu'elles contiennent, et par la faculté qu'elles ont d'attirer et de retenir l'humidité de l'air, de manière à ne la céder que lentement aux plantes; de plus, il est incontestable qu'elles sont un puissant stimulant pour la végétation. On conçoit donc que, à la suite du sartage, les céréales et le bois croissent tous deux avec beaucoup de force. Si l'action du feu a quelquefois pour effet de nuire à la reproduction, en détruisant les semences et les jeunes plants et en charbonnant partiellement la surface des souches, elle provoque, d'une autre part, des rejets en abondance et singulièrement vigoureux, par la température élevée qu'elle communique au sol. Enfin, un dernier avantage du sartage est l'abri que les céréales procurent aux jeunes rejets (1).

621. Il existe encore un autre mode de sartage, dit *à feu couvert*, auquel on a recours quand le sol est garni d'herbes, de plantes rampantes et surtout de gazon. Il consiste à peler, à la houe, la surface du terrain couverte de gazon et d'autres plantes, à en former un grand nombre de petits fourneaux que l'on allume et dont on répand alors les cendres

---

(1) C'est contre les vents froids, bien plus que contre les ardeurs du soleil, qu'il importe d'abriter les rejets, dans les deux premières années. Dans les Ardennes, on avait coutume autrefois de réserver, autour de chaque coupe, un cordon de futaie qui répondait à ce besoin et offrait

sur toute l'aire de la coupe. Du reste, on procède comme il a été dit plus haut.

Ce mode ne présente pas les avantages du premier ; on en obtient, pour le bois, une végétation moins abondante et moins vigoureuse, sans doute parce que, d'une part, on enlève en certains endroits, trop de terre avec le gazon et que cette terre, brûlée et calcinée, que l'on répand ensuite avec les cendres, n'est plus propre à la végétation ; d'autre part, parce que les racines sont quelquefois coupées ou mutilées ou trop découvertes et que le sol n'est point également échauffé sur toute sa surface (1).

Enfin, le sartage à feu couvert devient plus nuisible dans les pentes rapides que celui à feu courant, parce qu'il ameublir la terre plus profondément et l'expose davantage à s'ébouler. Il est vrai toutefois, qu'il donne la faculté de réserver, avec plus de chances de succès, quelques baliveaux dans les coupes, attendu qu'on peut en éloigner le feu à

---

d'ailleurs des ressources d'autant plus précieuses que le sartage à feu courant ne permet guère de réserver des baliveaux dans la coupe même. Peu à peu, ces cordons ont été exploités ; on a négligé de les remplacer et, depuis lors, on a remarqué, principalement sur les plateaux, que la reproduction des taillis y était de plus en plus compromise. On n'hésite pas à attribuer à cette circonstance, jointe aux abus du pâturage, la dégradation considérable de certaines forêts de cette contrée.

(1) Le sartage à feu couvert offre encore un autre danger qui réside dans le répandage des cendres, dont une pelletée seulement, jetée sur une souche, suffit pour la faire périr, quand l'incinération du gazon n'est pas complète.

volonté, ce qui ne saurait se faire en sarrant à feu courant, à moins de recourir à des précautions particulières.

Quel que soit le mode de sarrage que l'on emploie, il est à conseiller de le faire suivre de quelques plantations ou semis, pour assurer la perpétuité des bonnes essences et surtout du chêne. A la vérité, ces travaux semblent moins urgents ici que dans les taillis ordinaires, à cause de la facilité avec laquelle les rejets, dans les taillis sarrés, poussent des racines qui leur sont propres et forment ainsi de nouveaux pieds indépendants de la souche mère. Ce fait, qui est incontestable, tient, sans nul doute, à ce que la terre se trouve ramenée contre les souches et soulevée au niveau de la taille d'abatage par le fait même du labour donné au sol. Toutefois, dans une coupe, il y a toujours beaucoup de places qu'il sera très-utile de repeupler artificiellement.

622. Dans les Ardennes, aussitôt après la récolte des céréales, les genêts lèvent en abondance dans les coupes, surtout dans celles qui ont été sarrées à feu courant. Ces arbustes étoufferaient donc les semis. En plantant des sujets de 0<sup>m</sup>,50 à 1<sup>m</sup> de haut, préalablement préparés en pépinière, et autour desquels on arracherait les genêts dès la première année de leur levée, le succès de l'opération serait à peu près assurée.

La présence des genêts dans les jeunes coupes est

d'ailleurs utile aux rejets dans le premier âge, en ce qu'elle les protège contre les intempéries. En outre, ces arbustes fournissent des produits qui peuvent s'exploiter régulièrement, quelques années après la vidange des bois, et qui sont recherchés surtout pour le chauffage du four. À cet égard, il faut remarquer, toutefois, qu'il peut y avoir du danger à laisser persister les genêts trop longtemps, dans le but d'en tirer plus de profit, parce que, dans ce cas, les rejets de bois dur, particulièrement ceux du chêne, perdent trop tôt leurs branches inférieures, ne prennent pas de corps, faute de lumière, et sont souvent exposés à languir ou à être écrasés par la neige, lorsque l'épais fourré de genêt vient à disparaître. — Il importe donc de faire enlever ceux-ci soit en une fois, soit en plusieurs, 4 ou 5 ans, au plus tard, après la coupe.

623. La pratique du sartage, comme nous l'avons dit, n'est usitée que dans quelques localités; mais elle pourrait être appliquée avantageusement sur différents points de la France, par les particuliers qui possèdent des taillis de chêne, en évitant, toutefois, d'y soumettre ceux qui sont assis dans des fonds secs et légers ou en pente rapide.

---

## CHAPITRE SEPTIÈME.

---

### DE L'ÉTÊTEMENT ET DE L'ÉMONDAGE.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Généralités.

624. On fait d'un arbre un *têtard*, lorsqu'on abat sa tige à une certaine hauteur du sol ; on l'*émonde*, on contraire, en lui enlevant toutes les branches latérales jusqu'à la partie supérieure de la cime qu'on laisse intacte.

Par suite de l'une ou de l'autre opération, il se présente, au point de la coupe, des rejets que l'on exploite périodiquement à l'instar du taillis. Des repousses nouvelles se répètent aussi longtemps que la tige conserve sa faculté de reproduction, c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'âge ou une maladie l'en prive.

625. Sous le rapport de la valeur des tiges, il importe peu d'en pratiquer l'étêtement à une hau-

teur plus ou moins grande, car cette opération altère ordinairement le centre du bois, en favorisant l'infiltration des eaux pluviales, et c'est chose rare de voir des têtards un peu vieux, dont la tige ne soit creuse. Il n'en est pas de même des arbres émondés; ils se conservent plus longtemps et peuvent être utilement employés, lorsqu'ils ont atteint les dimensions convenables. Cet avantage est dû à ce que, le sommet de l'arbre restant toujours garni, les eaux pluviales glissent sur la partie coupée et pénètrent moins aisément dans l'intérieur du tronc.

Mais, si l'étêtatement a l'inconvénient de hâter la perte du tronc, il fournit par contre des rejets plus abondants, plus forts et plus utiles que l'émondage, dont on n'obtient que du fagotage de peu de valeur.

L'étêtatement s'opère à une hauteur de 1 jusqu'à 6 et 7 mètres. On tient bas les têtards plantés sur les bords des ruisseaux, des rivières, dans les pentes, etc., pour maintenir les terres; on donne de l'élévation, au contraire, à ceux sous lesquels on cultive des céréales ou des fourrages.

En effet, c'est dans les pâturages, dans les prairies, sur le bord des champs, des routes et des chemins que les arbres émondés et les têtards trouvent plus particulièrement leur place; et l'on conçoit, pour ces derniers, que plus ils seront élevés au-dessus du sol, moins ils empêcheront les plantes fourragères



la tige ; plus tard, on laisse subsister des bouts de branches pour la facilité des repousses.

L'emploi d'instruments bien tranchants est essentiel pour cette opération, afin que la tranche soit nette et sans éclats. Pour éviter l'infiltration des pluies, la coupe des têtards doit, autant que possible, être faite obliquement à l'horizon ; celle des arbres à émonder de même, mais en menant le trait de l'instrument de bas en haut.

#### ARTICLE VI.

##### Avantages des têtards et des arbres émondés.

630. Il est des pays, par exemple dans le voisinage du Rhin, où toutes les terres vagues en parcours, tous les bords des rivières et des ruisseaux sont plantés de têtards et d'arbres d'émondés. Ces plantations soutiennent les rives contre l'envahissement des eaux et défendent les habitations et les terres cultivées contre les glaçons que le dégel et les inondations pourraient y porter ; soumises à des coupes périodiques, elles fournissent en même temps un chauffage abondant. Les terrains en parcours, surtout, étant ainsi plantés, offrent, avec les produits en bois, de l'herbe et des feuilles pour la nourriture des bestiaux.

Les arbres d'émondés et les têtards sont d'un très-


grand intérêt partout où le bois a de la valeur. Leur plantation n'enlève rien à la culture des terres ; on en garnit les places improductives, les endroits marécageux, les lisières des prairies et d'autres lieux dont la charrue ne peut approcher ; toutes les eaux devraient en être bordées.

Il est à regretter que des plantations aussi utiles, qui s'opèrent avec tant de facilité et qui, sans présenter aucun obstacle à l'agriculture, peuvent offrir les plus grands avantages aux propriétaires, soient encore aussi négligées dans un grand nombre de nos départements.

---



## LIVRE CINQUIÈME.



---

## LIVRE CINQUIÈME.

---

### DES EXPLOITATIONS DE CONVERSION.

---

#### CHAPITRE PREMIER.

##### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

---

631. Les exploitations de conversion ont pour but d'introduire dans les forêts une autre méthode de culture que celle qui, jusqu'alors, y était pratiquée. A cet effet, elles doivent changer l'état du bois, et ce changement doit être consommé dans un temps donné.

Or, nous connaissons trois principales méthodes de culture, celle de la *futaie*, celle du *taillis simple* et celle du *taillis composé* (1). On peut donc concevoir les conversions suivantes :

---

(1) Nous ne comptons pas le *jardinage* au nombre des méthodes d'exploitation que, dans certaines circonstances, il pourrait être utile d'introduire, parce que ce n'est qu'un mode particulier d'exploiter certaines forêts soumises au régime de la *futaie*. Nous ne parlons pas non

1° Conversion d'une futaie en taillis simple ou en taillis composé ;

2° Conversion d'un taillis simple en taillis composé ou en futaie ;

3° Conversion d'un taillis composé en taillis simple ou en futaie.

Les règles culturales pour exécuter ces différentes opérations forment l'objet de ce livre ; mais pour les appliquer avec discernement, il faut être fixé sur les cas où un changement de régime devient réellement nécessaire ou utile. Cette question, qui n'est pas ~~seulement~~ forestière, mais qui touche aussi à l'économie politique, a été débattue à plusieurs reprises et décidée en sens divers. Il nous a semblé, ~~toutefois~~, que les données nécessaires pour la résoudre n'avaient pas toujours été bien nettement établies, convenablement rapprochées et discutées. Nous nous proposons donc de l'examiner dans ce qui va suivre, parce que nous la considérons comme devant dominer toute la théorie des conversions.

---

plus, sous ce rapport, du ~~sartage~~, de l'~~éclatement~~ et de l'~~émondage~~. Les deux derniers modes, comme on le sait, conviennent dans les terres cultivées, dans les prés et dans les pâturages, bien plutôt que dans les forêts, et l'autre, qui ne se pratique que dans quelques localités, n'est d'ailleurs qu'un taillis simple, plus la culture des céréales et l'écobuage.

---

## CHAPITRE DEUXIÈME.

---

### EXAMEN COMPARÉ

DES

TROIS PRINCIPALES MÉTHODES D'EXPLOITATION.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Enoncé de la question et données employées pour sa solution.

632. La question que nous venons d'indiquer dans le précédent chapitre peut se formuler ainsi :

*Quelle est la méthode d'exploitation qui mérite la préférence, eu égard aux besoins de la consommation, aux intérêts du propriétaire et à la nature des lieux ?*

Pour la résoudre, nous examinerons successivement les trois méthodes d'exploitation sous les rapports suivants :

1° Quantité de produits en matière que chacune procure dans un temps donné ;

2° Qualité de ces produits ;

3° Revenu qui en résulte pour le propriétaire ;



4° Enfin , influence de chaque méthode sur la fertilité du sol (1).

#### ARTICLE II.

De la quantité des produits en matière.

633. Dans le second livre de ce cours, nous avons démontré que, pour obtenir dans un temps donné les produits matériels les plus considérables, il faut couper le bois lorsqu'il a atteint son plus grand accroissement moyen [406]. Si donc il pouvait être démontré que le plus grand accroissement moyen des futaies est plus considérable que celui des taillis, on prouverait en même temps que ceux-ci doivent produire moins de matière que les autres.

Or ce fait est établi par les expériences de tous les forestiers qui se sont occupés de recherches de ce genre, et les auteurs français, comme les allemands, ont fourni de nombreuses preuves à l'appui (2).

Hartig, par exemple, ayant comparé entre eux (toutes circonstances égales d'ailleurs) un taillis simple exploité à 30 ans et une futaie soumise à une révolution de 120, a trouvé que les produits en matière de ces deux forêts étaient dans le rapport de

---

(1) Voir l'appendice.

(2) Voyez Varenne de Fenille, de Perthuis, Cotta, Hartig et autres.

4 à 7. On conçoit, au surplus, que ce rapport se modifie, d'abord en raison des révolutions attribuées à chaque régime et qui peuvent être plus ou moins favorables à la production en matière ; en second lieu, selon les essences, dont les unes croissent rapidement dans leur jeunesse, mais se ralentissent de bonne heure, tandis que les autres font peu de progrès d'abord, mais ont un accroissement plus fort et plus soutenu dans un âge avancé.

Sans prétendre donc exprimer, par un chiffre constant, le rapport entre les produits matériels des futaies et ceux des taillis, on peut cependant affirmer d'une manière générale : que le volume fourni par les futaies, dans un temps donné, est toujours plus grand que celui des taillis simples fourni dans le même temps, quelque révolution que l'on adopte, pour l'une ou l'autre de ces forêts, *dans le cercle tracé par les règles de la culture des bois et les intérêts du propriétaire.*

634. La supériorité de la futaie sur le taillis simple étant établie quant à la production en volume, il sera facile de fixer la position du taillis composé sous ce rapport. En effet, dans ce genre de forêt, une partie du terrain est occupée par des arbres qui atteignent un développement analogue à celui de la futaie, l'autre partie est couverte par le taillis proprement dit ; le produit matériel d'une telle combinaison doit donc évidemment être inférieur à celui de la futaie, et supérieur au contraire au produit du taillis simple.

## ARTICLE III.

## De la qualité des produits matériels,

635. La qualité des produits en matière est relative à l'emploi auquel on les destine. On distingue deux principaux genres d'emploi, savoir :

1° Le bois de feu (chauffage, charbon) ;

2° Le bois d'œuvre (construction, travail).

Chacun de ces emplois exige des qualités particulières qui, la plupart du temps, ne se trouvent pas réunies dans le même individu ; ainsi le meilleur bois de construction n'est pas toujours le meilleur bois de chauffage *et vice versa*.

636. BOIS DE FEU. — Les qualités du bois de feu doivent être de brûler facilement, d'une manière égale, sans trop de promptitude ni trop de lenteur, et de fournir, pour un volume donné, la plus grande somme de chaleur.

Or, les expériences faites à ce sujet, et vérifiées d'ailleurs par la pratique, tendent à établir que les bois possèdent ces différentes qualités au plus haut degré vers l'époque de leur plus grand accroissement qui, comme on le sait (v. page 180, note), correspond à peu près à l'âge de 60, 80, 90 ou 100 ans pour les bois durs, et à celui de 30, 40 ou 50 ans pour les bois blancs. En deçà de cette époque, le bois a moins de valeur calorifique ; au delà, il ne paraît plus

gagner sous ce rapport, et il devient d'une combustion plus difficile et plus lente à mesure que les tissus s'altèrent par l'effet du dépérissement. Il est à observer, toutefois, que les bois crûs sur souches atteignent, plus tôt que les brins de semence, le maximum de leur valeur calorifique, et qu'ils y parviennent d'autant plus promptement que les souches sont plus âgées; en général, c'est de 25 à 30 jusqu'à 40 ans que ce maximum se présente dans des taillis.

Lors donc qu'il ne s'agira que de bois de feu, des taillis pourront fournir des produits aussi utiles que les futaies. Il est incontestable même que le bois des taillis sera, sous ce rapport, meilleur que celui des futaies soumises à de longues révolutions; mais il est non moins évident, d'un autre côté, que les futaies dont la révolution ne dépassera pas l'époque du plus grand accroissement moyen, ou s'arrêtera même un peu en deçà, produiront une qualité de bois supérieure ou au moins égale à celle des taillis (1).

---

(1) On trouve la preuve du fait que nous avançons dans les taillis mêmes, où le bois le plus recherché pour le chauffage est celui des *bali-veaux modernes*, c'est-à-dire, d'arbres qui ont ordinairement de 50 à 80 ans.

Quant au charbon, il est certain, (malgré l'opinion contraire répandue à cet égard) que celui que l'on obtient de brins de semence d'âge moyen, est d'une qualité au moins égale, sinon supérieure, à celle du charbon fourni par les bois taillis parvenus à maturité. *Karsten*, dont les travaux

637. BOIS D'OEUVRE. — Quant à l'emploi des bois pour les constructions civiles et navales, ainsi que pour les divers ouvrages de fente, etc., il n'y a point de parallèle à établir entre les futaies et les taillis simples, ceux-ci n'étant point destinés à produire des bois de cette nature. Il ne reste donc qu'à comparer les arbres élevés dans les taillis composés avec ceux qui ont crû dans les futaies traitées par éclaircies.

Les qualités que doit présenter un bois d'œuvre sont : la force, l'élasticité, la durée. Or, l'expérience prouve que ces propriétés s'acquièrent au plus haut degré sous l'influence des agents atmosphériques, à mesure que la substance ligneuse prend plus de densité, c'est-à-dire, avec l'âge. Un bois d'œuvre doit

---

sont connus et appréciés de tous les métallurgistes, donne les quantités suivantes de charbon, obtenues de 100 parties de bois (en poids), par la méthode ordinaire de carbonisation.

Jeune chêne. . . . .	25,45
Vieux <i>idem</i> . . . . .	25,60
Jeune hêtre. . . . .	25,50
Vieux <i>idem</i> . . . . .	25,75
Jeune charme. . . . .	24,90
Vieux <i>idem</i> . . . . .	26,10

Des maîtres de forges du Bas-Rhin et de la Meuse, ont fait, sur cet objet, de nombreuses expériences en grand, et ont obtenu des résultats analogues à ceux de *Karsten*. Pfeil, dans son *Traité de culture forestière* (1839), indique, parmi les différents genres d'utilité de la futaie, celui de fournir de très-bons bois de charbon aux usines métallurgiques.

offrir, en outre, des dimensions convenables en longueur et en grosseur, et être exempt de tous défauts (1) qui le rendraient plus ou moins impropre à sa destination, et diminueraient beaucoup, par conséquent, sa valeur.

Nos naturalistes les plus distingués, les Réaumur, les Buffon, les Duhamel, ont successivement entrepris des recherches étendues dans la vue de déterminer le mérite, comme bois d'œuvre, des arbres élevés sur les taillis. Tous trois ont déclaré que les baliveaux ne répondaient sous aucun rapport à ce besoin, et ils ont conclu que les futaies, éclaircies périodiquement, pouvaient seules y satisfaire. Cependant, des praticiens justement appréciés, tels que de Perthuis et autres, ont combattu ces opinions, en ce qu'elles avaient de trop exclusif, et nous pensons que ce n'est pas sans raison.

On ne saurait, en effet, refuser aux baliveaux (surtout à ceux qui ont été élevés sur des taillis soumis à de longues révolutions) un degré réel d'utilité pour les constructions et l'industrie ; il est même incontestable, qu'en raison de l'état libre dans lequel ils se trouvent placés à chaque coupe de taillis, leur bois acquiert plus de densité que celui des arbres qui auraient crû dans un massif trop serré. Mais il faut reconnaître aussi que, par leur isolement et par

---

(1) Voir l'ouvrage déjà cité de M. Nanquette, intitulé *Exploitation, débit et estimation des bois*, pages 229 à 257.

leur extension considérable en branches, ces réserves sont exposées à une foule d'accidents météoriques qui leur causent trop souvent des défauts majeurs. D'un autre côté, elles deviennent toujours plus ou moins noueuses et perdent, par conséquent, de leur force, de leur élasticité et de leur qualité pour la fente; enfin, elles n'acquièrent jamais un fût ni aussi élevé, ni aussi parfaitement rond et droit que l'arbre venu en massif.

Si l'on compare ces bois à ceux qui ont crû dans les futaies traitées par éclaircies, il ne peut rester aucun doute sur la supériorité des derniers. Ceux-ci, par l'état de massif dans lequel ils sont maintenus, prennent une hauteur sous branches plus que double de celle des baliveaux, et l'appui mutuel qu'ils se prêtent contre les intempéries les exempte, presque toujours, des vices si communs aux arbres isolés. Les éclaircies périodiques ayant pour effet de distribuer l'air et la lumière dans une juste proportion, par l'espacement graduel des tiges, il en résulte un bois d'une texture plus homogène et d'une densité plus égale.

#### ARTICLE IV.

##### Du revenu.

638. Dans les deux précédents articles, nous avons démontré :

1° Que les futaies fournissent, dans un temps

donné, des produits matériels plus élevés que les taillis simples et les taillis composés, et que ces derniers, sous ce rapport, sont intermédiaires entre les premières et les seconds ;

2° Que le bois des futaies est généralement d'une qualité supérieure, sauf celui qui est employé au chauffage ; pour cet usage, le bois des taillis peut être préférable, mais dans quelques cas seulement.

Or, la valeur des produits étant nécessairement en raison de leur quantité et de leur qualité, il est évident que le revenu des futaies doit être plus grand que celui des taillis simples et des taillis composés, toutes choses étant égales d'ailleurs, et, par la même raison, le revenu des taillis sous futaie doit, à son tour, être plus élevé que celui des taillis simples.

639. Posée ainsi, la question, comme on le voit, est facilement résolue. Cependant, cette solution ne saurait convenir qu'à un propriétaire tel que l'Etat, par exemple, qui ne périt point, et qui, en raison de sa perpétuité même et de la stabilité de possession qui en est la conséquence, doit considérer les forêts comme un puissant élément de prospérité publique et comme une source constante de revenus qu'il importe de rendre aussi féconde que possible. A ce dernier point de vue, la futaie convient également aux communes.

Pour le propriétaire particulier, au contraire, une forêt est un capital qu'il conservera sous sa forme actuelle, s'il lui paraît convenablement placé, ou



dont il changera l'emploi, *en tout ou en partie*, si cette opération doit lui procurer des bénéfices. Or, la mesure de ces bénéfices se trouve exactement donnée par le taux de placement du capital producteur; et comme la partie de ce capital comprise dans la superficie (1) peut être constituée très-diversement, suivant l'âge auquel les bois sont exploités [410 bis], c'est *surtout* dans le rapport qui existe entre le revenu d'une forêt et la valeur de toute la superficie qu'il faut chercher la solution du problème qui nous occupe.

De ce point de vue, la question devient donc celle-ci :

Quel est le mode d'exploitation qui, *proportionnellement au capital superficiel*, produit le revenu le plus élevé?

Nous examinerons premièrement les futaies sous ce rapport, en recherchant si l'intérêt particulier

---

(1) En langage forestier, on nomme *superficie* l'ensemble des bois qui couvrent une étendue donnée de forêt, par opposition avec le sol ou le *fonds*, pris abstractivement des végétaux qu'il nourrit. Lors donc qu'il s'agit, comme ici, de considérer une forêt au point de vue de la spéculation, on est amené à distinguer :

*Le capital superficiel*, ou la valeur des bois sur pied;

*Le capital foncier*, ou la valeur du fonds de terre proprement dit;

*Le capital producteur*, c'est-à-dire, la valeur réunie du fonds et de la superficie, augmentée de la somme capable de fournir, en intérêts, les frais de garde, d'entretien et d'impôt.

Et enfin,

*Le revenu*, ou la valeur du bois parvenu au terme d'exploitabilité.

permet de les conserver, ou si, au contraire, il ne conseille pas de les dénaturer et d'en placer la valeur d'une autre manière (1). Les faits que constatera cette recherche nous serviront ensuite pour considérer, sous le même rapport, les taillis simples et les taillis composés.

640. Afin de rendre notre argumentation plus simple, servons-nous d'un exemple et choisissons-le tel qu'il présente les circonstances les plus favorables à la production d'un revenu soutenu, et, par conséquent, à l'intérêt du propriétaire.

Soit une futaie de chêne, d'une contenance de 140 hectares, située sous un climat et dans un sol de fertilité moyenne; soit son peuplement entièrement normal [415], et la révolution de 140 ans; soit enfin le commencement des éclaircies périodiques fixé à 20 ans, et leur marche réglée de 20 en 20 années.

Dans cette forêt que nous pouvons nous représenter partagée en quatorze affectations décennales de 10 hectares chacune, le produit annuel se composera :

---

(1) Dans le deuxième livre [410 bis], il a été établi que ce sont les courtes révolutions qui profitent le plus à l'intérêt privé; il nous suffirait donc de nous appuyer sur ce qui a été dit à cet égard, pour conclure que les taillis seuls peuvent être possédés avec avantage par les particuliers. Mais comme, dans le paragraphe précité, on a dû se borner à traiter cet objet d'une manière tout à fait générale et succincte, sans entrer dans les développements qu'il comporte, nous croyons qu'il ne sera pas inutile de l'examiner de nouveau ici, vu son importance.

1° De la coupe d'un hectare de chênes parvenus à l'âge d'exploitabilité (1) ;

2° De 6 hectares d'éclaircies périodiques à faire dans les bois âgés de 120, 100, 80, 60, 40, et 20 ans.

D'après les calculs et les expériences de la plupart des auteurs allemands, le produit des éclaircies périodiques, dans une futaie normale, est au produit principal, comme 1 est à 4 ou à 5 ; au contraire, les auteurs français ont établi ce rapport comme 1 est à 2. Bien que, selon nous, les données des forestiers allemands se rapprochent davantage de la vérité, nous admettrons néanmoins celle de nos auteurs nationaux, afin de nous placer sur le terrain le plus favorable à l'intérêt privé (2). Dans cette hypothèse, le produit matériel de la forêt proposée équivaldra donc annuellement à celui de 1 hectare 50 ares de futaie exploitable.

Or, pour apprécier ce produit annuel par rapport au capital superficiel, il est nécessaire de se rendre compte de la composition de celui-ci.

641. Le tableau ci-après fait connaître le volume des bois existant sur l'hectare moyen de chaque affectation décennale, et par suite le volume total de

---

(1) Pour plus de facilité dans les calculs, nous exprimons ici la possibilité des coupes de régénération *par contenance*.

(2) Il est évident, en effet, que faire le revenu annuel plus grand, quand le capital reste le même, c'est améliorer les conditions de placement.

la forêt. Les données contenues dans la quatrième et la cinquième colonne, et qui ont servi à former la sixième et la septième, ont été puisées dans des tables que l'on doit à Cotta sur l'accroissement des bois dans les futaies régulières (1). Nous pensons que, pour le climat de la plus grande partie de la France, ces données sont loin d'être assez élevées ; cependant nous n'hésitons pas à nous en servir, parce que nous les considérons principalement comme un moyen de rendre plus clairement nos idées, et que, d'ailleurs, les conclusions que nous nous proposons de tirer des faits qu'elles constatent ne seraient que plus frappantes encore, dans la supposition d'une végétation plus productive.

---

(1) Ces tables, qui sont généralement estimées en Allemagne, ont été converties en mesures françaises par feu M. de Salomon, directeur de l'Ecole forestière, et publiées par lui à la suite de son *Traité de l'aménagement des forêts*.

de fructifier de nouveau, soit en bois, soit par d'autres cultures, si la faculté de défricher existe (1).

643. En présence de tels faits, il semble difficile de soutenir que l'exploitation conservatrice des futaies puisse trouver une garantie suffisante dans les exigences de l'intérêt particulier ; cependant, cette opinion, qui a été défendue par des agronomes du plus éminent mérite, trouve encore aujourd'hui des partisans. Voici le raisonnement sur lequel ils se fondent :

« Tant qu'une futaie debout aura plus de valeur  
» pour celui qui voudra la conserver pour en attendre  
» les produits, qu'elle n'en aurait actuellement pour  
» celui tenté d'y mettre la cognée, on peut être assuré  
» qu'il y a dix chances contre une pour qu'elle ne  
» soit pas abattue ; car, s'il se rencontre un proprié-  
» taire pressé d'en réaliser la valeur, il se trouvera  
» aussi des acheteurs disposés à spéculer sur sa con-  
» servation. *Mais il est évident qu'il faut pour cela*  
» *que les bois de fort équarissage acquièrent une*

---

(1) On comprend que si, au lieu de passer de la culture forestière à la culture agricole et d'exploiter immédiatement tout le capital superficiel réalisable pour le placer dans un autre ordre de spéculation, le propriétaire veut simplement chercher à constituer le capital producteur de façon à en tirer le revenu le plus avantageux *comme produit forestier*, un calcul analogue, à celui qui vient d'être présenté le conduira encore à réaliser la valeur des bois les plus âgés et à réduire la révolution au terme où le rapport du revenu au capital producteur cessera d'être inférieur au taux des placements en biens-fonds dans la localité.

» valeur qui se trouve dans un certain rapport avec  
» ceux de moindre dimension ; c'est cette proportion  
» que l'on doit considérer comme le nivellement  
» entre les bois de service de divers genres ; la con-  
» currence seule suffira pour l'établir, et c'est de ce  
» nivellement que l'on doit attendre toute sécurité  
» pour les approvisionnements en bois des âges à  
» venir. » (*De l'Industrie forestière en France*, par  
M. de Dombasle, Annales de Roville, 8<sup>e</sup> livraison,  
1832.)

644. D'après le passage qu'on vient de lire, c'est une juste proportion entre les prix des bois, selon leur âge et leurs dimensions, qui assurera la conservation des futaies de la part des particuliers.

Pour vérifier l'exactitude de cette assertion, supposons un propriétaire *presser de réaliser la valeur de sa futaie*, et examinons si, au moyen de prix proportionnés comme nous venons de le dire, les acheteurs les plus offrants seront plutôt *disposés à spéculer sur la conversion* de cette futaie que sur sa destruction. A cet effet, conservons l'exemple de la futaie normale dont nous nous sommes servi plus haut, et ajoutons au tableau des bois qui la composent, des prix gradués de la manière suivante :

Pendant les 40 premières années, le prix du mètre cube augmentera tous les dix ans de 5 francs.

Depuis l'âge de 40 ans jusqu'à celui de 100, cette augmentation sera, chaque dix ans, de 10 fr. ; et enfin :

A partir de 100 ans jusqu'à 140, chaque décennie augmentera la valeur du mètre cube de 20 francs, de sorte que, dans les bois parvenus à l'âge d'exploitabilité, cette valeur sera portée au taux excessif et, pour ainsi dire, imaginaire de 160 francs (1).

Voici, avec ces données, le tableau du capital superficiel, exprimé dans la 4<sup>e</sup> colonne en mètres cubes, et dans la 6<sup>e</sup> en argent.

---

(1) On a fait observer que ce prix de 160 fr. par mètre cube était souvent payé, pour des pièces de choix, par les arsenaux de la marine, de la guerre et par d'autres consommateurs encore, et que, en l'adoptant comme maximum, ce n'était pas faire une hypothèse tellement exagérée qu'elle autorisât, dans tous les cas, la conclusion *a fortiori* que nous en tirons. On se serait dispensé de l'objection, si l'on avait réfléchi qu'il s'agit, dans notre exemple, non de bois de choix équarris à vive arête, ou tout au moins au 5<sup>e</sup> déduit, comme ceux que les arsenaux recherchent et paient fort cher, mais de la *totalité* du matériel sur pied dans une futaie exploitable, ce qui constitue une différence tout au moins du simple au double ou au triple.

Affectations décennales.	AGE des Bois.		VOLUME absolu de l'hectare moyen.	VOLUME absolu de toute l'affectation décennale.	PRIX du mètre cubo.	VALEUR de toute l'affectation décennale.
1.	2.		3.	4.	5.	6.
	ans.		mèt. cub.	mèt. cub.	fr.	fr.
14°	1	à 10	7	70	5	350
13°	11	20	22	220	10	2200
12°	21	30	42	420	15	6300
11°	31	40	65	650	20	13000
10°	41	50	90	900	30	27000
9°	51	60	118	1180	40	47200
8°	61	70	147	1470	50	73500
7°	71	80	178	1780	60	106800
6°	81	90	211	2110	70	147700
5°	91	100	245	2450	80	196000
4°	101	110	280	2800	100	280000
3°	111	120	314	3140	120	376800
2°	121	130	346	3460	140	484400
1°	131	140	376	3760	160	601600
TOTAUX...			»	24410	»	2362850

645. Il résulte du tableau ci-dessus que les coupes de régénération à faire annuellement dans la futaie produiront :



$$389^{\text{m.c.}},5 \times 160^{\text{fr.}} = 62320^{\text{fr.}}$$

Quant aux éclaircies périodiques, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails pour en fixer la valeur.

Nous avons admis, plus haut, que le produit annuel en matière de ces opérations équivalait, dans la futaie normale proposée, à la moitié du produit des coupes de régénération, savoir :

$$\frac{389,5}{2} = 194,8 \text{ soit } 195 \text{ mètres cubes.}$$

Mais comme ces 195 mètres cubes doivent s'obtenir par six éclaircies, à faire sur six hectares, dont le plus jeune a 20 ans et le plus âgé 120, nous avons besoin de connaître séparément le produit matériel de chaque éclaircie, afin d'en déterminer le prix conformément à la 5<sup>e</sup> colonne du tableau, et d'obtenir ainsi la somme pour laquelle ces exploitations contribueront au revenu annuel.

Or, il est d'expérience que les produits matériels des éclaircies périodiques vont en augmentant, jusqu'à l'âge de 80 ans à peu près, pour les essences longévives, et surtout pour le chêne, et qu'ensuite ils diminuent brusquement. C'est d'après plusieurs auteurs forestiers estimés, et d'après les données pratiques que nous avons eu l'occasion de recueillir nous-même, que nous avons adopté les nombres suivants comme représentant cette échelle de production avec une exactitude suffisante pour l'exemple que nous discutons :

DE CONVERSION.

439

1 <sup>re</sup> éclaircie, bois de 20 ans, fournira 10m. cub., à 10fr. l'un, ci.	100 fr.
2 <sup>e</sup> — bois de 40 ans, — 20 — 20 —	400
3 <sup>e</sup> — bois de 60 ans, — 42 — 40 —	1,680
4 <sup>e</sup> — bois de 80 ans, — 64 — 60 —	3,840
5 <sup>e</sup> — bois de 100 ans, — 32 — 80 —	2,560
6 <sup>e</sup> — bois de 120 ans, — 27 — 120 —	3,240

TOTAL... 195 m. cub. 11,820fr.

Ajoutant à cette somme la valeur des coupes de régénération

qui est de, ci..... 62,520

On trouve pour revenu de la forêt, ci..... 74,140 fr.

646. Si nous rapprochons ce revenu de 74,140 fr. de la valeur du capital superficiel, qui est de 2,362,850 fr., nous voyons que, malgré les prix excessifs attribués aux bois de fort équarrissage, on n'obtient encore qu'un placement à 3 pour cent environ, et toujours sous la condition expresse de négliger la valeur du fonds.

Mais après tout, ces prix, que nous pourrions presque appeler calamiteux, nous garantiront-ils du moins que la futaie ne passera qu'entre les mains d'un acheteur *disposé à spéculer sur sa conservation*? Nullement. Cet acheteur sans doute se présentera, puisque c'est au taux de 3 p. 0/0 environ que se font ordinairement les placements en biens-fonds ; mais il se trouvera certainement en concurrence avec celui qui spéculera sur la destruction, et qui pourra offrir au vendeur un prix bien plus considérable, parce que, industriel ou commerçant, il fait travailler ses capitaux et en retire 4, 5 et même 6 pour cent,

au lieu de se contenter de 3 comme le premier. On peut donc être assuré qu'il y a dix chances contre une, pour que toute futaie mise en vente soit acquise par des spéculateurs ayant intérêt à ce qu'elle soit promptement abattue. Le calcul, d'ailleurs, prouvera facilement ce que nous avançons.

En effet, supposons, comme nous l'avons fait dans le premier exemple, que l'on abatte toute la futaie, moins le bois de 1 à 20 ans ; on réalisera le capital suivant :

2,362,850 fr. — 2,550 fr. = 2,360,300 fr. ;

lequel placé à 4 pour cent seulement, rapportera par an..... 94,412 fr.

Mais le revenu, en spéculant sur la conservation, n'est que de..... 74,140

Le bénéfice réalisé équivaut donc à 20,272 fr. de rente, sans compter la valeur considérable du terrain déboisé et du jeune bois de 1 à 20 ans.

Et que l'on ne dise pas que ces sortes d'affaires présentent, dans la réalité, des difficultés et des chances qui en détournent les spéculateurs ; elles sont aujourd'hui fort connues et fort recherchées même, par suite des nombreuses ventes de bois faites depuis quarante et quelques années par l'Etat. Que l'entreprise soit ou non considérable, elle trouvera des amateurs : si elle est peu importante, elle conviendra à des individus ; si elle est plus vaste, ce seront des compagnies qui s'en empareront, et, dans tous les

cas, le capitaliste qui voudrait conserver sera écarté du marché.

647. Il nous semble donc démontré que le prix des bois de fortes dimensions, quelque élevé qu'on le suppose, ne saurait assurer la culture et la conservation des futaies de la part des particuliers. Il est évident, au contraire, qu'avec l'augmentation de ces bois en valeur, doit croître aussi l'appât de les détruire, surtout si l'on tient compte de la puissance des intérêts composés, que, dans l'état actuel de l'industrie, il n'est plus possible de nier pour un grand nombre de cas.

648. Après avoir considéré les futaies dans leurs rapports, avec l'intérêt particulier, il nous reste à examiner les taillis simples et les taillis composés sous le même point de vue.

Peu de mots suffiront.

Si les futaies, surtout celles à longues révolutions, ne peuvent convenir à l'intérêt privé, la cause, comme on l'a vu, en est principalement dans le capital trop élevé, qu'il est nécessaire d'engager dans la superficie, pour se procurer un revenu soutenu ; capital qui, joint à la valeur du fonds, fait descendre le taux de l'argent bien au-dessous de celui des placements ordinaires.

Or, il n'en est pas de même pour les taillis simples ou composés qui, s'exploitant à des époques bien plus rapprochées, n'exigent qu'un capital superficiel peu élevé comparativement au revenu qu'ils procu-

rent (1), et offrent, par conséquent, le placement de ce capital à un taux avantageux. Le régime du taillis convient donc spécialement aux forêts possédées par les particuliers, et, sauf le cas où le sol serait d'une qualité tout à fait supérieure pour un genre de culture plus lucratif, le défrichement de ces propriétés serait une fausse spéculation, dès que, dans la contrée, le prix des bois est à peu près nivelé avec celui des autres denrées.

Quant à la question de savoir lequel, du taillis simple ou du taillis composé, présente le plus d'avantages à l'intérêt particulier, il faut distinguer :

Si le taillis est en mauvais fonds et constitué de façon à ne produire que du bois de chauffage ou de petite industrie, les particuliers n'ont aucun intérêt à y élever des réserves, et la méthode du taillis simple doit être préférée ;

Si, au contraire, le sol est apte à l'éducation des essences d'élite, ils trouveront le plus ordinairement avantage à adopter des révolutions assez longues et à élever des arbres de réserve jusqu'aux dimensions requises pour la charpente, le sciage ou le merrain.

(1) Voici quelques données à cet égard, que nous fournit un auteur allemand très-estimé (Hundeshagen) :

Le peuplement du taillis étant supposé normal, et le revenu en matière égal à l'unité, le capital superficiel sera :

pour une révolution de 30 ans — 14 à 16.

—	20	— 10 à 12.
—	10	— 5.
—	5	— 3.

649. En résumé, la discussion du revenu des trois principales méthodes d'exploitation constate les faits suivants :

Pour l'Etat, pour les communes et pour tout propriétaire impérissable qui, *par essence*, n'est point apte aux spéculations commerciales, la futaie offre les plus grands avantages; le taillis composé tient le second rang, et le taillis simple occupe le dernier.

Il n'en est pas de même pour les particuliers dont la possession est précaire et qui, par suite de la division indéfinie des fortunes, sont forcés, soit à la première, soit à la deuxième, ou au plus tard à la troisième génération, de rechercher des placements élevés et des spéculations mercantiles auxquelles ne saurait résister le capital engagé dans les futaies. Pour eux, suivant les circonstances [648], c'est tantôt le taillis simple, tantôt le taillis composé, qui doit être mis en première ligne, et la futaie ne peut occuper que le dernier rang.

#### ARTICLE V.

De l'influence des différentes méthodes d'exploitation sur la fertilité du sol.

650. Les bois influent sur le sol qu'ils occupent de deux manières distinctes :

1° Par le couvert ;

2° Par l'amendement qu'ils procurent.

Le premier effet est produit par le massif plus ou moins serré et par l'épaisseur de feuillage propre à chaque essence ; le second effet dépend des mêmes causes, et, en outre, de l'abondance des feuilles et des circonstances qui hâtent ou retardent leur décomposition après leur chute (1).

651. Dans les futaies en général, la méthode du réensemencement naturel et des éclaircies établit un couvert constant et complet qui garantit le sol du desséchement et y maintient la fraîcheur favorable à la végétation des bois. Un détritus abondant, composé de feuilles, de menues branches, et qui trouve toutes les circonstances favorables à sa prompte décomposition, augmente chaque année la couche de terreau dans ces forêts, et restitue ainsi abondamment à la terre les substances nourricières que s'assimilent les arbres. Ce n'est que quand les révolutions sont très-longues que cette restitution devient moins complète : le massif alors, s'éclaircissant de plus en plus, permet l'action trop directe du soleil et de l'air sur la surface du sol ; les vents dispersent le lit de feuilles ; et le terreau, formé pendant de longues années, se dessèche, diminue peu à peu, et finit par perdre toutes ses qualités fertilisantes. Mais, hors ce

---

(1) On sait que les causes d'une prompte décomposition ou putréfaction sont : l'humidité, une chaleur modérée et l'air stagnant ou du moins calme. Au contraire, la sécheresse, une forte chaleur et des courants d'air violents retardent et entravent même la putréfaction.

cas qui n'est qu'une rare exception, il est incontestable que tout, dans l'exploitation des futaies régulières, concourt à conserver et à augmenter constamment la fertilité du terrain (1).

652. Par la méthode du taillis simple, le sol est à peu près complètement dénudé à chaque coupe. S'il est fertile, situé en plaine ou en pente douce, les rejets s'y élèvent rapidement après la coupe et forment, dès les premières années, un nouveau fourré assez épais pour préserver le terrain des influences nuisibles de l'atmosphère. Si le sol est médiocre, peu profond, mais cependant plat, la méthode du taillis simple, quoique ne l'amendant que faiblement, ne l'expose pas néanmoins à se détériorer, pourvu que le peuplement soit formé d'essences fertilisantes. Mais, quand ce mode d'exploitation est pratiqué dans un terrain sec, fortement incliné et exposé aux ardeurs du soleil, il est impossible qu'il ne produise pas de fâcheux résultats. En effet, à chaque coupe, les rejets nouveaux, manquant de vigueur, sont très-longtemps avant de couvrir le terrain, ce qui fait que la faible couche de terreau, formée pendant la révolution écoulée, est promptement torréfiée, puis lavée par les pluies; en second lieu, l'élément minéralogique lui-même, n'étant plus recouvert, se désagrège, devient pulvérulent et

---

(1) Voir les notes des nos 487 et 514, pages 256 et 280.



est entraîné dans les bas-fonds. C'est ainsi, par exemple, que, dans les formations de grès et de calcaires qui sont entièrement dépourvus d'argile, il suffit souvent de quelques révolutions de taillis, pour mettre le roc à nu, et exclure toute végétation autre que celle de quelques chétifs arbrisseaux et arbustes.

653. Quant à la méthode du taillis sous futaie, considérée sous le rapport de son influence sur la fertilité du sol, elle participe naturellement des deux méthodes examinées plus haut, et ses effets se rapprochent de ceux de la futaie ou de ceux du taillis simple, selon que, par le nombre et l'âge des baliveaux, le couvert est plus ou moins épais après la coupe.

654. Les considérations que nous venons de présenter font voir que la méthode de la futaie ne s'applique pas exclusivement aux bas-fonds, ainsi qu'on le pense communément. On peut et en doit même l'employer dans les terrains médiocres pour les améliorer, et dans les terrains secs ou pauvres [60 et 65], si l'on veut empêcher qu'ils ne s'appauvrissent davantage ; mais, dans ce cas, il faut cultiver des essences traçantes donnant beaucoup de couvert. En ne les soumettant pas à des révolutions trop longues, les bois se maintiendront en massif serré et procureront ainsi au sol la fraîcheur et l'amendement qui, seuls, peuvent assurer sa fertilité (1).

---

(1) Pour atteindre un tel but, le *hêtre*, parmi les essences feuillues,

L'ancienne opinion de n'exploiter qu'en taillis les bois situés en terrain médiocre, mauvais ou dénué de profondeur, doit donc être considérée comme mal fondée; car, dans l'intérêt de l'amélioration du sol et, par conséquent, de la production, dès qu'on a la faculté de choisir le régime d'exploitation, nous pensons qu'il n'y a pas à hésiter et que la futaie doit être préférée.

## ARTICLE VI.

## Conclusion.

655. Des faits démontrés dans le présent chapitre, on peut déduire les considérations et les principes généraux suivants, sur l'application des divers modes d'exploitation dans les forêts de l'Etat, des communes et des particuliers.

---

et l'épicéa, parmi les résineuses, mériteraient sans doute la préférence, s'il ne devenait souvent difficile et quelquefois même impossible de les faire réussir dans les sols de mauvaise qualité dont il s'agit ici. On pourra employer avec avantage le *pin sylvestre* et le *pin d'Autriche* dans les régions tempérées de la France, le *pin à crochets* aux plus grandes altitudes; dans les régions plus douces de l'Ouest et du Midi, le *pin maritime* et le *pin d'Alep* rendront des services analogues. Souvent ces essences pourront être cultivées qu'à titre transitoire: elles donnent, dans la jeunesse, un couvert et des détritus abondants, à la faveur desquels les sols dégradés se restaurent suffisamment pour qu'il devienne possible d'y introduire, au bout d'une révolution, par exemple, des bois résineux ou feuillus (épicéa, sapin, hêtre, etc.) plus profitables au propriétaire.

observer, cependant, que pour apprécier l'opportunité des conversions en futaie à ce dernier point de vue, il ne faut pas toujours considérer, dans leur abstraction, les forêts que l'on y destine; on doit, au contraire, les regarder comme faisant partie d'un certain ensemble de forêts, dont les produits alimentent une localité déterminée; ou s'il est permis de s'exprimer ainsi, un *bassin de consommation*.

Placé à ce point de vue plus élevé, on reconnaîtra souvent qu'un taillis composé peut être converti immédiatement, quoique cette opération doive amener, pour un certain temps, une baisse dans les produits particuliers de ce taillis; car, pendant le même temps, les produits d'une autre forêt pourront être mis en hausse, et ainsi, en définitive, la possibilité de la localité, tant en matière qu'en argent, ne se trouvera point altérée (1).

Mais, quelle que soit la marche adoptée, ces transformations ne pouvant s'accomplir que successivement, après de sérieuses études, il faudra, pendant un temps plus ou moins long, maintenir sous le régime du taillis composé des forêts destinées à être ultérieurement converties, et se contenter, en attendant, de *préparer pour l'avenir les moyens*

---

(1) Il est, en général, de cette manière qu'un grand propriétaire de bois, tel que l'Etat, devrait entendre la possibilité, qui, prise dans un sens trop étroit, devient souvent une véritable entrave à la plus grande production.

*d'exécuter cette importante amélioration. Dans ce but, on conservera et l'on multipliera les essences précieuses, tant par un balivage abondant que par les travaux indiqués dans le 3<sup>e</sup> chapitre du 4<sup>e</sup> livre de ce cours.*

659. Peu de mots suffiront quant à l'application que peuvent recevoir, dans les forêts domaniales, les autres genres de conversion mentionnés plus haut [631].

Il est difficile de prévoir le cas où la conversion d'une futaie en taillis pourrait être justifiée dans l'intérêt public. Quant aux autres combinaisons, elles ne se rattachent point, comme les conversions en futaie des taillis composés, à des considérations administratives d'un ordre supérieur, attendu qu'elles ne sont pas susceptibles d'acquérir ce caractère de généralité dont il importait, pour celles-ci, de discuter la portée théorique et pratique. La conversion des taillis simples en futaie semble seule devoir participer, dans certains cas, de l'importance de celle des taillis composés; mais ce mode de traitement ne se rencontre que rarement, et, pour ainsi dire, par exception seulement, dans les bois de l'Etat; nous en avons indiqué la cause plus haut [605].

660. Les motifs qui doivent faire préférer, en principe, la méthode de la futaie, dans les forêts de l'Etat, se reproduisent, en grande partie, au sujet des forêts communales. Les communes, en effet, sont

perpétuelles comme l'Etat, et, en raison de cette perpétuité, elles doivent chercher à administrer leurs domaines *dans l'intérêt du plus grand usufruit*. Pour toute commune, donc, qui possède des futaies, il est de la plus grande importance de les conserver; les convertir en taillis (sauf dans quelques circonstances tout à fait exceptionnelles), ce serait consommer une véritable spoliation envers les générations futures.

Cependant, une commune doit-elle, comme l'Etat, chercher à *convertir* en futaie ses taillis composés ? — Oui, si elle est assez riche pour que, par quelque combinaison temporaire dans l'ensemble de l'exploitation de ses bois, elle trouve à couvrir les dépenses que pourrait entraîner la conversion.

Mais, telle n'est pas, en général, la position des communes en France : le plus grand nombre ne possède que des forêts peu étendues, dont les ressources sont à peine suffisantes pour faire face, soit aux dépenses d'utilité publique qui se reproduisent périodiquement, soit aux besoins d'une population toujours croissante. On ne peut donc guère espérer de créer des futaies dans les forêts communales; tant que les conversions effectuées dans les bois domaniaux n'auront pas rendu bien manifestes les avantages et les facilités de ces transformations.

664. La majorité de ces forêts est traitée aujourd'hui en taillis composé, mode qui, s'il est bien conduit, réunit une partie des avantages de la futaie

à ceux du taillis simple [583]. Cette méthode d'exploitation intermédiaire semble d'ailleurs convenir assez bien à un propriétaire tel que la commune, qui, par sa perpétuité et comme corporation, participe de l'essence de l'Etat; mais qui, en raison de ses besoins presque toujours pressants et de ses ressources bornées, est très-souvent forcé, par la nécessité, de calculer comme un particulier.

Nous pensons donc, vu ces circonstances, que l'on doit, dans les forêts communales en général, se borner à conserver soigneusement les futaies existantes et maintenir du reste, le mode du taillis composé en s'attachant à le rendre rationnel et à corriger son application qui, trop généralement, laisse beaucoup à désirer.

662. Quant aux forêts particulières, leur traitement, comme nous l'avons vu [639], est déterminé par la condition dominante *d'élever le plus possible le rapport entre le revenu et le capital producteur*; il est donc évident que le propriétaire particulier devra préférer à la futaie, soit la méthode du taillis composé, soit celle du taillis simple, suivant les circonstances dans lesquelles la forêt se trouvera placée, et selon la valeur des produits qu'il en pourra tirer. Enfin, il est un genre de forêts, les résineuses, qui exclut absolument le mode du taillis et commande celui de la futaie; mais alors le particulier devra nécessairement choisir la révolution la plus courte possible, parce que, comme nous

L'avons prouvé ailleurs [642-646], les longues révolutions exigent un capital superficiel tellement considérable, comparativement aux intérêts qu'on en retire, que le taux du placement finit par descendre au-dessous de tous ceux que l'on trouverait dans toute autre spéculation, même la plus sûre.

---

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### CONVERSION DES FUTAIES.

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Conversion d'une futaie en taillis simple.

**663.** La conversion d'une futaie en taillis simple ne présente en général aucune difficulté. Il suffit de déterminer, d'une part, les parties de la forêt dont les souches promettent encore une reproduction certaine ; de l'autre, les parties où cette circonstance n'existe pas. Dans les premières, l'exploitation en taillis peut commencer immédiatement ; dans les secondes, il est nécessaire de créer d'abord un nouveau peuplement, soit par des coupes de régénération, soit par des travaux de semis ou de plantation, afin de pouvoir ensuite passer au régime du taillis.

Soit, par exemple, une futaie soumise jusqu'alors à une révolution séculaire, destinée à être convertie en un taillis de 25 ans. Si, dans la localité, on peut compter avec certitude sur la reproduction des sou-



l'avons prouvé ailleurs [642-646], les longues révolutions exigent un capital superficiel tellement considérable, comparativement aux intérêts qu'on en retire, que le taux du placement finit par descendre au-dessous de tous ceux que l'on trouverait dans toute autre spéculation, même la plus sûre.

sion d'une futaie en taillis composé est absolument semblable à celle que nous venons d'indiquer dans l'article précédent, sauf les dispositions à prendre pour le balivage.

On commence donc par fixer la révolution du taillis à créer, et l'on détermine les parties de forêt qui pourront être tout de suite exploitées d'après ce mode et celles qui, préalablement, sont à régénérer par la semence; puis on règle, d'après les principes que nous connaissons, le degré de couvert à répandre sur le taillis, et l'on arrête le nombre et les différentes catégories de baliveaux dont devra se composer la réserve [589-591].

665. Dans les parties à exploiter tout de suite en taillis, cette réserve ne pourra se composer, pour la première révolution, que de baliveaux de l'âge dont le nombre sera tel que, parvenus à la qualité de *modernes*, ces arbres donnent le couvert voulu. A la 2<sup>e</sup> révolution, on ne conservera de ces *modernes*, que la quantité fixée par le balivage adoptée, et l'on complétera le couvert par des tiges de l'âge. A la 3<sup>e</sup> révolution, on réservera le nombre prescrit d'*anciens* et de *modernes*, et l'on complétera encore le couvert par des baliveaux de l'âge; et ainsi de suite, de révolution en révolution, jusqu'à ce que toutes les catégories d'arbres, dont doit se composer la réserve, soient établies sur le taillis.

666. Dans les parties qu'il faut d'abord régénérer par la semence, on laissera sur pied, lors de la coupe

définitive, un certain nombre d'arbres, donnant le couvert jugé convenable. Quand on coupera le sous-bois pour la première fois, on réservera le nombre de tiges de l'âge que prescrit le balivage adopté, et l'en réquera les vieux arbres dans le rapport du couvert que donneront ces jeunes baliveaux lorsqu'ils seront devenus modernes. Et ainsi de suite, jusqu'à l'entier établissement du balivage adopté.

---

## CHAPITRE QUATRIÈME.

---

### CONVERSION DES TAILLIS SIMPLES.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Conversion d'un taillis simple en taillis composé.

667. Cette opération, qui ne consiste qu'à établir successivement, sur le taillis, différentes catégories de baliveaux qui ne s'y trouvent pas, est évidemment semblable, en tout, à celle qui tend à convertir en taillis composé une partie de futaie dont les souches sont encore susceptibles de reproduction; nous venons de la décrire [665].

#### ARTICLE II.

Conversion d'un taillis simple en futaie.

668. La conversion en futaie, d'un taillis simple, ne présente point de difficulté dans l'exécution, dès

que les perches, dont il se compose, sont assises sur des souches assez jeunes encore.

Dans cette opération, on conserve, pour la révolution transitoire, le terme de l'ancienne révolution du taillis, et on laisse subsister, sur chaque coupe, un massif composé des tiges les plus vigoureuses et des baliveaux ayant atteint la qualité de *moderne*.

On fait en sorte de supprimer, outre les perches dominées et les mort-bois, toutes les essences impropres à la futaie, à moins qu'elles ne soient indispensables pour maintenir le massif. Ces exploitations ont reçu le nom de *coupes préparatoires*, parce qu'elles ont, en effet, pour objet de préparer l'état de futaie, en parcourant la forêt une ou plusieurs fois, jusqu'au moment fixé pour commencer les coupes de régénération.

Soit un taillis aménagé à 30 ans, et que l'on se propose de convertir dans le même délai, on aura, au bout de ce temps, en opérant comme nous venons de le dire, une forêt qui présentera, dans la partie la plus âgée, des bois de 60 ans et un certain nombre de 90, et dans la partie la plus jeune, des bois de 30 et de 60 ans. Dès lors on pourra commencer l'exploitation en futaie et ce sera même à conseiller, le peuplement se composant généralement de rejets. En raison de cette circonstance, on devra aussi abréger, au moins d'un tiers, la révolution qu'il eût été d'ailleurs convenable d'adopter pour la futaie.

669. Mais cette manière de procéder, fort simple

il est vrai, présente le grave inconvénient d'imposer au propriétaire une privation presque absolue de produits, pendant toute la révolution transitoire où les coupes se bornent à l'extraction de quelques tiges dominées ou inutiles. Aussi n'est-elle guère admissible que théoriquement ou dans quelques cas exceptionnels. Dans les circonstances ordinaires, on ne peut entreprendre la conversion qu'à la condition *de ne pas abaisser trop sensiblement l'ancienne production*. La méthode suivante a pour objet d'atteindre ce but.

670. On détermine immédiatement la révolution qui convient à l'essence que l'on veut faire prédominer dans les nouveaux peuplements. Prenons pour exemple le même taillis que précédemment, c'est-à-dire, aménagé à 30 ans; supposons que cette révolution doive être fixée à 90 ans, et partagée en trois périodes de 30 ans chacune; sur le terrain, les affectations de ces périodes seront composées, savoir :

La 1<sup>re</sup>, des bois de 1 à 10 ans ;

La 2<sup>e</sup>, des bois de 11 à 20 ;

La 3<sup>e</sup>, des bois de 21 à 30.

Ces premières dispositions prises, on détermine le temps nécessaire pour préparer les éléments d'une régénération naturelle avant le début de la révolution de futaie.

Au cas particulier, on adoptera dans ce but une révolution transitoire de 60 ans, partagée en deux

périodes égales, pendant lesquelles les exploitations à faire dans chacune des affectations seront :

PREMIÈRE PÉRIODE.

- 1<sup>re</sup> affectation :** Coupe de nettoisement, plusieurs fois répétée, s'il est nécessaire, pendant la première moitié de la période; coupe préparatoire, par quinzième de surface, pendant la seconde moitié.
- 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> affectations réunies.** Coupe de taillis, par trentième de surface, en commençant par la troisième affectation.

La coupe de taillis ne comprenant que les deux tiers de l'étendue précédemment livrée à l'exploitation, il y aura baisse de produits au commencement de la période; mais cette coupe entrera, au début, dans les bois de 30 ans et passera successivement à des parties plus âgées, pour terminer par des bois de 40 ans; il est donc permis d'espérer que, avec la deuxième quindécennie, la production, renforcée par la coupe préparatoire de la 1<sup>re</sup> affectation, atteindra, non pas entièrement sans doute, mais à peu de chose près, celle de l'ancien taillis.

A l'expiration de la première période, le peuplement sera :

- 1<sup>re</sup> affectation :** Perchis de 31 à 40 ans, avec sous-bois dominé, provenant des souches exploitées dans les coupes préparatoires;

**2° affectation : Taillis de 15 à 1 ans ;**

**3° affectation : Taillis de 16 à 30 ans.**

#### DEUXIÈME PÉRIODE.

**1° affectation : Seconde coupe préparatoire ou d'éclaircie, par quinzième de surface et par quinz-décennie.**

**2° affectation : Coupe de nettoyage, plusieurs fois répétée, s'il est nécessaire, pendant la première moitié de la période ; première coupe préparatoire, par quinzième de surface, pendant la seconde moitié.**

**3° affectation : Coupe de taillis par trentième de surface (1).**

A l'expiration de la deuxième période, le peuplement sera :

**1° affectation : Perchis de 70 à 61 ans ;**

**2° affectation : Perchis de 45 à 31 ans ;**

**3° affectation : Taillis de 30 à 1 an.**

**671. Le perchis sur souches de 61 à 70 ans étant susceptible de se régénérer par la semence, on voit**

---

(1) Si les souches cessaient d'être productives à 40 ans, il faudrait exploiter cette affectation par 24° de surface. En pareil cas, on combinerait la marche des coupes préparatoires des 1<sup>re</sup> et 2° affectations, de manière à doubler leur étendue pendant les six dernières années de la période, afin de compenser la suspension des coupes de taillis.



que le but de la conversion se trouve en quelque sorte atteint à la fin de la révolution transitoire de 60 ans, et cela, sans que le propriétaire ait eu à s'imposer de trop fortes privations sur son revenu. De plus, la série présente une gradation d'âge presque normale, avantage évident qui fait défaut dans la première méthode de conversion, et dont l'absence peut, dans certains sols et pour certains taillis, devenir une cause d'embarras telle que, dans le cours de la révolution de futaie, tout le succès de l'opération s'en trouve compromis. — Enfin, le traitement des deux dernières affectations donne toute latitude d'améliorer le peuplement, en extirpant les souches usées et les essences impropres à la futaie pour y introduire les essences d'élite : 30 ans dans la deuxième affectation, et 60 ans dans la troisième sont, à coup sûr, un délai plus que suffisant pour réaliser ce résultat, tout en ne faisant chaque année qu'une faible dépense.

672. Que si l'on avait à convertir trois ou quatre séries contiguës qui dussent plus tard, ramenées en futaie, n'en former qu'une, on pourrait procéder d'une manière tout à fait analogue. Cette réunion rendrait même l'opération d'une exécution plus facile. En effet, dans ce système, chaque affectation comprenant une série entière, présenterait la succession de tous les âges du taillis ; on pourrait donc, dès le début et chaque année, sans interruption, pratiquer une coupe préparatoire dans la première

affectation et une coupe de taillis, à l'âge de 30 ans, dans chacune des deux ou trois autres. En outre, les peuplements seraient régénérés moins prématurément, au début de la révolution de futaie.

673. Quand il s'agira de convertir des taillis exploités à un âge moindre que 30 ans, à 20 ou 25 ans par exemple, la transformation s'effectuera d'une manière analogue ; mais le nombre des coupes n'étant plus divisible par celui des périodes de la révolution de futaie, il faudra en scinder quelques-unes pour former les affectations, et l'âge des perchis en tour de régénération sera un peu moins avancé.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

---

### CONVERSION EN FUTAIE DES TAILLIS COMPOSÉS (1).

---

#### ARTICLE PREMIER.

##### Généralités.

674. Les taillis sous futaie soumis au régime forestier, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, sont loin de se trouver dans un état normal [586 et 597].

Faute d'une culture suffisamment soignée, les bois blancs y sont nombreux et occupent la place d'essences plus précieuses, et, par suite du mode de balivage institué par l'ordonnance de 1669 et consa-

---

(1) Nous passons sous silence la conversion d'un taillis composé en taillis simple. Il est évident que cette opération se borne, d'une part, à la coupe de toutes les réserves, pour ne plus laisser subsister que des baliveaux de l'âge; et, de l'autre, à quelques repeuplements artificiels, afin de regarnir les clairières causées dans le taillis par l'enlèvement des arbres.

cré par l'ordonnance réglementaire du code forestier, la réserve en baliveaux anciens et en vieilles écorces y est généralement considérable [605].

A la vérité, les dispositions de ces deux ordonnances n'ont pas toujours été rigoureusement suivies; beaucoup d'agents forestiers ont cru pouvoir se permettre d'y déroger et sont souvent alors tombés dans un excès contraire.

Dans les forêts de l'Etat néanmoins, on s'est plus généralement astreint à satisfaire au vœu de l'ordonnance, ce qui fait que la grande majorité des taillis composés domaniaux est encore richement pourvue d'anciennes réserves; on pourrait même dire que bon nombre d'entre eux en sont tout à fait surchargés. Cette surabondance se remarque surtout dans les bois qui sont situés en bon fonds et dans lesquels dominant ou dominaient jadis les essences les plus précieuses. Il importe donc, lorsqu'il s'agit d'en entreprendre la conversion, de se rendre un compte exact des différents états de peuplement auxquels l'ancien traitement a donné naissance, afin de les faire concourir le mieux possible au but qu'on se propose. Il serait difficile toutefois, et en tous cas beaucoup trop long, de donner ici une description de tous ces peuplements divers. L'arbitraire qui a régné dans le nombre et dans le choix des réserves, joint à l'absence totale ou à l'insuffisance de travaux d'entretien [597] pour régénérer le sous-bois, a produit sous ce rapport la plus grande

variété, non-seulement de forêt à forêt, mais souvent dans la même série d'exploitation. Cette bigarrure, lorsqu'elle se présente, est, on le comprend, une des plus sérieuses difficultés que rencontre l'opération des conversions.

Quoi qu'il en soit, on peut diviser nos taillis composés en deux grandes catégories, savoir :

1° Les taillis sous futaie *réguliers*, c'est-à-dire, ceux qui présentent un sous-bois bien venant, assis généralement sur des souches d'âge moyen, composé en majorité d'essences propres à croître en futaie, et que surmonte une réserve nombreuse d'arbres de toutes catégories, assez convenablement répartis.

2° Les taillis sous futaie *irréguliers*, dont les peuplements divers peuvent, tous à peu près, être ramenés aux suivants :

a. Anciens et vieilles écorces, plus ou moins nombreux constituant, seuls à peu près, la réserve, et dominant un sous-bois incomplet, composé presque exclusivement de bois blancs et de morts-bois ;

b. Une réserve abondante de toutes catégories, avec sous-bois en grande partie impropre à la futaie, soit par l'essence, soit par l'état de végétation ;

c. Un taillis en bon état, mais presque entièrement dépourvu de réserves, et enfin,

d. Quelques parties régulières.

Selon que, *considéré dans son ensemble*, un taillis sous futaie devra être qualifié de *régulier* ou d'*irrégulier*, il y aura lieu de lui appliquer l'une des trois

méthodes de conversion dont nous allons nous occuper.

## ARTICLE II.

## Conversion des taillis sous futaie réguliers.

675. Pour ramener en futaie un taillis composé régulier, la méthode des *coupes préparatoires* que nous avons donnée plus haut pour la conversion des taillis simples [668] pourra être employée. Seulement, il faudra tenir compte ici d'un élément nouveau très-important; nous voulons parler des anciennes réserves qui n'existent pas dans les taillis simples, et qu'il s'agit d'associer aux perches du taillis pour constituer la futaie à venir.

L'opportunité de conserver, à peu près généralement, dans les coupes préparatoires, les baliveaux modernes d'essences longévives, est évidente. Quant aux anciens, ils devront être maintenus, toutes les fois qu'ils seront nécessaires pour assurer l'état de massif; mais il faudra éviter de choisir des pieds trop branchus, et surtout de vieilles écorces déjà sur le retour, à moins que leur présence ne parût tout à fait indispensable pour empêcher qu'il n'y eût clairière, ou pour assurer, par la suite, le repeuplement en bonnes essences.

Toutes les fois que des arbres, modernes ou anciens, feront partie de la futaie préparatoire, l'éla-

gage, tel que nous l'avons indiqué [555 et 602], sera de la plus grande utilité, afin d'accorder le mieux possible les cimes de ces arbres avec celles des perches environnantes, et de détourner, en outre les causes apparentes de dépérissement qui pourraient les menacer.

Une dernière et importante précaution à apporter dans le choix des anciennes réserves, c'est d'examiner dans combien d'années le massif dont elles font partie reviendra en tour d'exploitation. Mais cet objet ne peut se raisonner qu'après avoir tracé la marche des coupes préparatoires, opération d'ailleurs indispensable pour assurer régulièrement le succès de la conversion.

**676. MARCHE DES COUPES PRÉPARATOIRES.** Le premier point à arrêter, pour établir cette marche, est la révolution transitoire. Cette révolution doit satisfaire à deux conditions principales :

1° Il faut, à son expiration, que les parties les plus âgées de la forêt puissent être mises en coupe de régénération, c'est-à-dire que les arbres fournissent bonne et abondante semence ;

2° A la même époque, les parties les plus jeunes doivent, eu égard à leur âge et à leur végétation, être en état de prospérer jusqu'à la fin de la révolution de futaie qui succèdera à la révolution transitoire.

Les taillis composés, dans lesquels on trouve d'ordinaire le plus de ressources pour la conversion en

futaie, sont ceux qui s'exploitent à 30, 35 ou 40 ans ; or, pour atteindre, dans de tels bois, le double but que nous venons d'indiquer, il suffit, en général, de donner à la révolution transitoire une durée égale à l'ancienne révolution du taillis.

Supposons, par exemple, qu'on ait à convertir en futaie un taillis composé exploité jusqu'alors à 40 ans. Si l'on adopte ce même terme de 40 ans pour la révolution transitoire, on trouvera, généralement, à l'expiration de cette révolution :

Dans la partie la plus âgée, un perchis de 80 ans qui sera parfaitement en état d'ensemencer le terrain, quelle que soit l'essence, d'autant plus qu'il renfermera des réserves de 120 et 160 ans ;

Dans la partie la plus jeune, des bois de 40 ans, surmontés d'arbres de 80 et 120 ans, susceptibles de prospérer jusqu'à la fin de la révolution de futaie, attendu que cette révolution sera nécessairement abrégée, à cause de l'âge des souches.

677. La possibilité des exploitations de conversion doit, comme celle des taillis en général, être basée sur l'étendue ; seulement, afin de remédier à la forte diminution que ce genre d'opération ne peut manquer d'occasionner sur les produits, il convient de partager la révolution transitoire en deux périodes ou sous-révolutions, pendant chacune desquelles les coupes préparatoires auront à parcourir la totalité de la forêt. Par ce moyen, la coupe annuelle s'étendant sur une contenance double de celle qu'avait la



coupe ordinaire en taillis sous futaie, il s'établit naturellement une chance favorable pour que les produits de la révolution transitoire se rapprochent de ceux que procurait l'ancien mode.

Outre cet avantage, la mesure en présente encore d'autres qui ne sont pas moins importants. D'abord, elle favorise l'accroissement des bois, en rendant plus fréquentes les exploitations préparatoires ; en second lieu, elle donne de grandes facilités pour le choix des réserves parmi les arbres anciens [675], surtout si l'on prend le parti, très-convenable selon nous, d'asseoir et de délimiter, sur le terrain, toutes les coupes, dès le début de la révolution transitoire. En effet, la disposition dont il s'agit permet de réserver, pendant la première sous-révolution, certains arbres anciens, utiles encore malgré leur âge et leur état de décroissance, parce qu'on sait qu'on pourra les faire abattre vingt ans plus tard, lorsque leur présence ne sera plus nécessaire. Dans la seconde sous-révolution, on trouve non moins de facilité sous ce rapport, car on connaît les coupes préparatoires qui, selon toutes les probabilités, seront régénérées soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin de la révolution de futaie ; on est donc mis à même d'apprécier si les arbres anciens ou modernes, qu'on voudrait conserver, présentent des chances suffisantes de durer jusqu'au moment probable de leur abatage.

678. Mais, si favorable que soit l'expédient qui

vient d'être indiqué, il est facile d'entrevoir cependant (et l'expérience d'ailleurs en a donné la preuve) qu'il ne suffit pas pour balancer la production du régime nouveau avec celle de l'ancien. Ce résultat ne saurait être obtenu qu'à l'aide d'une combinaison analogue à celle que nous avons exposée à propos de la conversion des taillis simples [670], et qui consiste à faire marcher des exploitations de taillis parallèlement aux coupes préparatoires.

On déterminera donc immédiatement la révolution de futaie ; on la partagera en périodes égales auxquelles on fera correspondre, sur le terrain, des affectations composées comme nous l'avons dit [670]. La différence consiste dans la présence des arbres de réserve qui concourront à la régénération avec les rejets de souches. Cette ressource qui fait défaut dans les taillis simples, permettra souvent de réduire à une seule période la durée des coupes préparatoires de chaque affectation, et même, dans certains cas [672], de commencer immédiatement les coupes de régénération.

L'ordre successif de ces dernières coupes se trouvant déterminé à l'avance par le plan général d'exploitation, il devient facile de régler le balivage des coupes de taillis sous futaie, suivant le rang des affectations où elles sont assises. C'est ainsi qu'on s'attachera à multiplier partout les baliveaux et les modernes, à supprimer un certain nombre d'anciens, et à ne point laisser subsister de vieilles écor-

ces hors de l'affectation de la 2<sup>e</sup> période. On conçoit dès-lors que, dans bien des cas, les produits se maintiendront au niveau de ceux de l'ancien taillis sous futaie.

Entre les deux modes que nous venons d'indiquer pour la conversion des taillis sous futaie, la préférence paraît devoir être donnée au dernier, parce que son application permettra d'étendre immédiatement ces transformations à de grandes surfaces, et de préparer au pays les ressources les plus précieuses, sans cependant lui imposer de privations. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que, pour se guider dans ce choix, il faudra tenir compte des considérations que nous avons développées plus haut [658].

679. A l'expiration du temps consacré soit aux coupes préparatoires, soit à l'entière régénération des peuplements, nos successeurs trouveront évidemment la forêt dans un état plus riche et plus prospère que celui où nous l'avons prise. C'est à eux qu'il appartiendra de régler le mode de jouissance de ces richesses, en fixant définitivement la révolution de la futaie, la nature et l'ordre des exploitations à y faire, etc.

## ARTICLE III.

## Conversion des taillis sous futaie irréguliers.

680. Le mode de conversion indiqué dans l'article précédent [678] peut s'appliquer aux taillis irréguliers, sauf quelques modifications consistant principalement dans la nécessité d'effectuer ou de compléter la régénération successive des affectations, par voie de repeuplements artificiels.

Mais ces taillis se présentent quelquefois dans des conditions particulières qui commandent de recourir à des procédés de conversion plus expéditifs.

En effet, nous avons essayé plus haut [674] de caractériser leur état en faisant connaître la cause de cette irrégularité, et nous avons ramené les divers peuplements qu'ils présentent à quatre cas principaux, savoir :

a. Anciens et vieilles écorces plus ou moins nombreux constituant, seuls à peu près, la réserve, et dominant un sous-bois incomplet, composé presque exclusivement de bois blancs ou de morts-bois ;

b. Une réserve abondante de toutes catégories, avec sous-bois en grande partie impropre à la futaie, soit par l'essence, soit par l'état de végétation ;

c. Un taillis en bon état, mais presque entièrement dépourvu de réserves, et enfin,

d. Quelques parties régulières.

Il suffit de considérer un tel ensemble pour reconnaître que le seul moyen de le régulariser et de le restaurer, c'est de le régénérer le plus promptement possible par la semence, de manière à y ramener les essences d'élite en profitant, pour cela, des ressources qu'offre encore la réserve.

Toutefois, il s'agit ici, comme dans les méthodes de conversion que nous avons précédemment étudiées [676 à 678], de réaliser, en les conciliant, deux conditions essentielles : il faut d'abord éviter un abaissement trop brusque des produits, et, en second lieu, constituer une gradation d'âge en rapport avec le traitement et la révolution auxquels, *régénérée*, la forêt doit être soumise.

681. Pour atteindre ce double but, on déterminera immédiatement la révolution de futaie. Supposons, comme plus haut [670], qu'elle soit fixée à 90 ans et partagée en trois périodes de 30 ans. Sur le terrain, on chercherait à constituer les affectations ainsi qu'il suit :

1<sup>re</sup> *affectation*. Les peuplements désignés sous la lettre **a**;

2<sup>e</sup> *affectation*. Les peuplements désignés sous la lettre **b**;

3<sup>e</sup> *affectation*. Les peuplements désignés sous les lettres **c** et **d** (1).

---

(1) On conçoit qu'il ne sera pas toujours possible d'arriver à un tel résultat et qu'il faudra souvent modifier la composition des affectations,

Les exploitations à faire dans chacune de ces affectations seront :

PREMIÈRE PÉRIODE.

**1<sup>re</sup> affectation.** Coupes de régénération, en faisant intervenir le repeuplement artificiel partout où les bois existants ne suffiront pas pour assurer le repeuplement naturel.

**2<sup>e</sup> affectation.** Coupe par trentième de surface, du sous-bois, avec extraction des vieilles écorces dépérissantes et avec réserve, dans le taillis, de toutes les perches de bonnes essences susceptibles d'être associées à la futaie, dans l'intérêt du repeuplement futur.

**3<sup>e</sup> affectation.** Coupes préparatoires, à commencer immédiatement ou à une année quelconque de la période, selon l'âge des taillis qui composeront cette affectation. Dans ces coupes, il sera procédé, à l'égard des réserves, comme il est dit plus haut [675 et 677].

---

soit en raison de la situation respective des divers peuplements, et pour éviter le morcellement de la surface affectée à chaque période, soit parce qu'une ou plusieurs natures de peuplement (a, b, c, d,) occuperont des contenances ou trop grandes ou trop petites, comparativement aux autres. Aussi, n'entendons-nous donner ici qu'un exemple, en choisissant le cas le plus simple, afin de ne pas compliquer inutilement la démonstration, et de mieux faire comprendre la méthode.

A l'expiration de la première période, le peuplement se composera comme il suit :

- 1<sup>re</sup> *affectation*. Gaulis et fourrés ;
- 2<sup>o</sup> *affectation*. Futaie irrégulière, plus ou moins clair-plantée, mais susceptible d'être mise en coupe de régénération ; — taillis dominé ;
- 3<sup>o</sup> *affectation*. Perchis avec vieux arbres.

#### DEUXIÈME PÉRIODE.

1<sup>re</sup> *affectation*. Coupes d'amélioration.

2<sup>o</sup> *affectation*. Coupes de régénération, avec essouchement du taillis, à moins qu'on ne juge utile de le conserver (hêtre, par exemple), pour protéger le jeune repeuplement. Dans ce cas, il sera extrait, après la réussite de celui-ci, par forme de nettoyage.

3<sup>o</sup> *affectation*. Eclaircie, avec extraction, s'il y a lieu, de quelques vieux bois.

A l'expiration de la deuxième période le peuplement sera :

- 1<sup>re</sup> *affectation*. Perchis ;
- 2<sup>o</sup> *affectation*. Gaulis et fourrés ;
- 3<sup>o</sup> *affectation*. Massif de futaie sur souches.

Ainsi, dès la troisième période, la futaie sera constituée avec une gradation d'âge convenable, et il est évident, d'un autre côté, que, pendant les deux pre-

mières périodes, qui, de fait, forment seules la révolution transitoire, la production n'aura pas été sensiblement abaissée.

682. Quand le mode de conversion que nous venons d'exposer devra s'appliquer à une forêt comprenant plusieurs séries de taillis composés, on trouvera la plupart du temps plus de facilité à en réunir deux ou trois pour former une même série de futaie [672], parce qu'il y aura, dans ce cas, d'autant plus de chance de rencontrer les différentes natures de peuplement que nous avons décrites, sur des surfaces assez étendues pour constituer les affectations dans lesquelles il est convenable de les faire entrer (1).


---

(1) On peut consulter avec fruit sur la question de la conversion des taillis, un très-bon mémoire inséré dans le tome 3<sup>e</sup> des *Annales forestières*, page 476.





## LIVRE SIXIÈME.



---

## LIVRE SIXIÈME.

---

### DES REPEULEMENTS ARTIFICIELS.

---

#### DÉFINITIONS.

---

683. On entend par *semis* l'opération par laquelle on met en terre des semences, et principalement des semences d'arbres, pour en obtenir de jeunes sujets.

684. La *plantation* consiste à extraire un jeune arbre du lieu où il croît, et à le replacer dans un autre lieu pour l'y faire croître.

685. On donne le nom de *bouture* à une jeune branche qui, séparée de l'arbre et mise en terre, pousse des racines et des rejets et devient ainsi un nouvel individu.

686. La *marcotte* est une branche que l'on couche en terre, à une certaine profondeur, sans la détacher de l'arbre dont elle fait partie ; de telle sorte que celui-ci la nourrit jusqu'à ce qu'elle ait pris suffi-

samment de racines, après quoi elle peut former un individu isolé.

687. On dit que les semences *s'échauffent*, lorsque, mises en tas, elles commencent à fermenter en dégageant de la chaleur ; ce qui réagit sur le germe et en détruit la vitalité.

688. Un semis est fait *en plein*, quand toutes les parties d'un terrain, sans aucune exception, sontensemencées ; au contraire, le semis est *partiel*, si le terrain est préparé de manière qu'entre les espacesensemencés il y en ait d'autres en friche.

689. *Repiquer* est synonyme de planter, et s'applique aussi bien aux graines qu'aux plants.

---

## CHAPITRE PREMIER.

---

### CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

---

690. Bien que la culture des bois n'admette, en principe, d'autre régénération que la *régénération naturelle*, il se présente cependant, dans les forêts, des cas nombreux où l'action seule de la nature ne saurait suffire pour atteindre le but que l'on se propose, où il devient indispensable de recourir à des moyens artificiels (1). On doit donc considérer l'art d'opérer des repeuplements de main d'homme comme l'auxiliaire plus ou moins obligé de toute méthode d'exploitation, et comme devant former,

•

---

(1) Nous avons indiqué les principaux de ces cas, en traitant, dans le 2<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup> livre, des différentes méthodes d'exploitation et de leur application aux diverses essences. (Voyez les nos 462, 482, 489, 507, 511, 516, 526, 531, 534, 557, 559, 597, 598, 622.)

par conséquent, une partie essentielle de l'instruction du forestier.

Cette branche de la sylviculture mérite d'ailleurs une attention plus particulière en France, où le reboisement de plusieurs contrées importantes (les Alpes, les Pyrénées, la Sologne, les Landes, etc.) est devenu une question vitale pour les habitants et qui préoccupe à juste titre le Gouvernement (1). En outre, un grand nombre de nos forêts présentent des clairières, des vides nombreux, causés par l'abus du pâturage, par les incendies ou même par des exploitations mal entendues, et qui ne peuvent désormais être rendus à la production qu'à l'aide de repeuplements artificiels. — Enfin, ces sortes de travaux trouvent encore leur application lorsque, par suite de la dégradation soit du sol, soit du peuplement, ou par quelque autre motif économique; il y a lieu de substituer une essence nouvelle à celles qui composent actuellement la forêt.

691. Des quatre modes de repeuplement artificiel dont nous avons donné plus haut la définition, les plus généralement usités sont le semis et la

---

(1) Voir à ce sujet : *Etude sur les torrents des Hautes-Alpes*, par M. Surell, ingénieur des ponts et chaussées, et le *Rapport*, déjà cité, sur les plantations de la Sologne, par M. A. Brongniard, de l'Institut (*Annales forestières*, tome X). V. aussi le rapport à l'Empereur, par S. Exc. le Ministre des Finances, concernant le reboisement des montagnes (*Moniteur* du 3 février 1860).

plantation. Le semis est considéré, par beaucoup de forestiers, comme principalement applicable en grand, à cause des procédés par lesquels il s'exécute, et qui semblent à la fois plus naturels, plus simples et moins coûteux que ceux de la plantation. Cependant la pratique tend chaque jour de plus en plus à établir la supériorité de celle-ci. Non-seulement on est parvenu à atténuer singulièrement la dépense qu'elle occasionne en plantant des sujets très-jeunes que l'on élève en pépinière, à très-peu de frais ; mais il est incontestable qu'une plantation *bien faite* présente, la plupart du temps, des chances de réussite plus assurées que le semis préparé avec le plus de soin, — parce que celui-ci a, de plus que l'autre, à lutter contre des dangers nombreux qui menacent la graine d'abord et ensuite le plant naissant. Ainsi, il vaudra toujours mieux planter que semer dans les localités exposées aux dégâts, soit du bétail, soit du gibier ; dans les terrains où la crue des herbes, ou d'autres plantes nuisibles, est trop abondante ; dans ceux où les jeunes plants sont exposés à être déracinés par la gelée [697] ; sur les grandes sommités, et enfin, dans les lieux exposés aux inondations. Il en sera de même quand il s'agira de repeupler un terrain entièrement nu par une essence qui, dans sa première jeunesse, réclame beaucoup de couvert, comme le hêtre par exemple ; ou bien lorsqu'on voudra établir le mélange de deux essences dont l'une occupe déjà le terrain [489]. Enfin, la planta-



tion est surtout convenable pour compléter les repeuplements naturels dans les coupes de futaie [462], ainsi que pour assurer la conservation des bonnes essences et remplacer les souches manquantes dans les taillis [597].

---

## CHAPITRE SECOND.

---

### DES SEMIS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Des connaissances qu'il faut posséder.

692. Outre la connaissance des climats et des sols convenables aux différentes essences, telle qu'elle a été enseignée dans le premier livre de ce Cours, il faut encore, pour opérer des semis avec succès, posséder plusieurs autres notions, savoir :

1° La manière de récolter et de conserver les semences ;

2° Les moyens à employer pour s'assurer de leur qualité ;

3° La préparation à donner au terrain ;

4° La saison la plus convenable pour semer ;

5° La quantité de graine à employer.

6° Enfin, la manière de répandre et de recouvrir les semences.

## ARTICLE II.

De la récolte et de la conservation des semences.

693. L'âge et l'état de végétation des arbres sur lesquels on récolte les graines ne sont point indifférents. Les sujets qui fournissent les meilleures semences sont ceux d'âge moyen qui croissent isolés ou à peu près et présentent une cime parfaitement saine et bien développée ; tandis que les bois trop vieux ou dépérissants, de même que les tiges trop jeunes, donnent en général des graines mal conditionnées ou vaines qu'il faut, par conséquent, se garder d'employer. On doit éviter également de se servir de semences provenant d'arbres rabougris et dont le tempérament s'est plus ou moins abâtardi en raison des circonstances locales défavorables dans lesquelles ils ont crû. De tels bois forment, pour ainsi dire, des variétés ou races dégénérées du type primitif et qui n'y retournent, la plupart du temps, qu'après avoir été cultivées, dans de meilleures conditions, pendant plusieurs générations.

La récolte des semences doit, autant que possible, se faire par un temps sec ou qui, du moins, ne soit point pluvieux, les graines trop humides étant plus exposées à s'avarier. Pour recueillir les semences lourdes, si l'on n'aime mieux attendre leur chute naturelle, on fait gauler les arbres et tendre des toiles

pour les recevoir ; quant aux semences légères des essences feuillues, il faut, en général, les faire cueillir, et il en est de même des cônes de bois résineux.

694. Aussitôt récoltées, les graines des essences feuillues, quelle que soit leur nature, doivent être étendues, en couches minces, dans un lieu sec et aéré, et remuées souvent afin de les laisser ressuyer et d'empêcher ainsi qu'elles ne s'altèrent. Les cônes d'arbres résineux peuvent, sans trop d'inconvénient, être entassés davantage, quand les quantités récoltées ne sont pas très-considérables ; néanmoins il est toujours préférable de les étendre. C'est surtout après que la semence a été extraite des cônes, qu'il devient nécessaire de prendre des précautions pour la conserver en bon état.

Selon leur nature particulière, les semences sont plus ou moins sujettes à germer, à pourrir, à s'échauffer ou à se dessécher ; il faut donc, lorsqu'il s'agit de les conserver pendant un certain temps avant de les mettre en terre, savoir les garantir contre ces différents dangers.

Les moyens à employer pour empêcher, soit une germination prématurée, soit la pourriture, consistent d'abord à placer les graines dans un lieu frais sans être humide, tel qu'une cave, par exemple, où elles soient, autant que possible, à l'abri des variations de l'atmosphère, et ensuite à les mêler avec un corps qui puisse se charger de l'humidité qu'elles laissent échapper, comme du sable sec, de la paille,

des feuilles sèches, etc. Le desséchement peut être prévenu par des procédés analogues, c'est-à-dire, en préservant la semence le plus possible du contact de l'air et en la mettant dans un endroit frais. Quant aux graines en danger de s'échauffer, il faut les placer dans des lieux secs et aérés, éviter de les entasser et les faire remuer souvent à la pelle.

En traitant plus bas du semis des principales essences, nous donnerons, pour chaque espèce de graine, les procédés de conservation que l'expérience a démontré être les meilleurs.

---

ARTICLE III.

Des moyens de reconnaître la qualité des semences.

695. Avant d'effectuer un semis, il est de règle de s'assurer de la qualité des graines dont on dispose, surtout lorsque c'est par la voie du commerce qu'on se les est procurées. Cet examen ne doit jamais être négligé ; il est indispensable pour déterminer exactement la quantité de semence à employer, et l'on conçoit aisément l'importance d'une telle détermination. En effet, si la quantité de semence est trop considérable, il en résulte non-seulement un surcroît inutile de frais, mais encore une surabondance de jeunes plants qui se nuisent et s'affament réciproquement. Si, au contraire, la graine est trop épargnée, le semis se trouve nécessairement incomplet ; on est

forcé d'y revenir pour le compléter, et l'on augmente ainsi la dépense pécuniaire, tout en perdant du temps et en établissant une certaine inégalité dans l'âge des jeunes bois.

Le moyen le plus sûr pour vérifier la qualité des graines, est d'en prendre, au hasard, dans la provision que l'on doit éprouver, un certain nombre (plus ou moins, selon l'importance de la provision), de les semer dans une caisse, ou dans tout autre vase quelconque, rempli d'une terre substantielle et légère; puis, de placer cette caisse dans un lieu tempéré, et d'arroser souvent avec de l'eau tiède afin d'accélérer la germination. En comparant ensuite le nombre de plants levés avec le nombre de graines qui avaient été semées, on pourra apprécier la qualité de la provision entière. Si, dans cette épreuve, on reconnaît que les deux tiers ou les trois quarts des graines ont levé, la semence peut être considérée comme étant de bonne qualité.

Le moyen que nous venons d'indiquer est surtout à conseiller lorsqu'il s'agit de semis considérables; autrement on peut se contenter de prendre quelques graines, de les ouvrir, soit avec un canif, soit avec tout autre instrument, et d'examiner si l'amande et le germe sont frais et en bon état. Cette opération peut, en général, se faire sur les petites graines comme sur les grosses, mais c'est surtout sur celles-ci qu'elle se pratique aisément.

Selon l'essence, les graines doivent présenter,

dans leur aspect et dans leur consistance, des caractères particuliers qui en font reconnaître la bonté; nous indiquerons ces caractères dans le chapitre suivant, en traitant séparément du semis de chaque essence.

696. C'est ici le cas de signaler quelques manœuvres frauduleuses des marchands de graines forestières, contre lesquelles il est utile de se précautionner.

Les semences légères, surtout les semences résineuses, étant celles qu'on achète le plus ordinairement au poids, les marchands les humectent quelquefois au moment de la vente. On fera bien de ne consentir à la pesée des graines qu'après qu'elles auront été sorties des sacs à leur arrivée, et étendues, pendant une quinzaine de jours, dans un grenier ou dans une chambre aérée. Cette précaution est d'autant plus utile que, quelquefois aussi, les fournisseurs, pour en augmenter le poids, mêlent à la semence un sable très-fin. Au surplus, quand même on ne peut stipuler cette condition avec les marchands, il ne faut pas moins s'empresser, à l'arrivée de la semence, de la répandre, de la remuer, et d'opérer son desséchement; car, toute fraude à part, elle peut avoir été, pendant le transport, mouillée par la pluie ou imprégnée de l'humidité de l'atmosphère.

Une autre fraude, à laquelle les marchands ont souvent recours pour augmenter leurs profits, consiste dans le mélange des graines d'épicéa avec celles

de pin sylvestre ; le prix de la dernière étant ordinairement double du prix de l'autre. Comme la semence de pin est généralement noire, tandis que celle de l'épicéa est brun-rougeâtre, ils teignent celle-ci en noir, par un procédé qui n'altère point sa faculté germinative. On peut y être trompé, parce que ces deux graines ne diffèrent essentiellement que par la couleur. Sans doute, en y regardant de près, on finirait par distinguer la semence de pin sylvestre d'avec celle d'épicéa : la première est plus arrondie et plus luisante ; la seconde, plus allongée et plus anguleuse, prend par la teinture un éclat mat. Mais il serait toujours extrêmement difficile de reconnaître dans quelle proportion ces deux graines sont mélangées, surtout lorsque les quantités de semences reçues sont considérables. La seule épreuve exacte est donc d'en prendre au hasard quelques pinces et de les semer dans une caisse, comme nous l'avons expliqué plus haut. La levée des jeunes plants donnera la mesure de la fraude (1).

On conçoit qu'indépendamment du trop payé, ce mélange puisse entraîner de graves inconvénients. Ce sont ordinairement les pentes méridionales, entièrement dégarnies, que l'on destine à être repeuplées en pin sylvestre [294] ; or, si les semences

---

(1) Les pins sylvestres lèvent avec une tigelle rougeâtre portant de cinq à six feuilles séminales ; les épicéas naissants, au contraire, ont la tigelle jaunâtre et presque toujours neuf feuilles séminales.



mêlées sont employées, sans examen préalable, dans de pareils terrains, on peut être assuré que tous les jeunes plants d'épicéa périront, aussitôt levés, par l'ardeur trop vive du soleil. Mais quand bien même, par suite d'une exposition moins défavorable à l'épicéa, les jeunes plants de cette essence résisteraient pendant les 2 ou 3 premières années, ils ne finiraient pas moins par être étouffés par le pin sylvestre qui a, dès sa naissance, une végétation beaucoup plus rapide que l'épicéa et le surmonterait complètement dès avant la dixième année. — Dans tous les cas dont le mélange des deux graines ne saurait produire qu'un semis manqué ou du moins très-incomplet.

#### ARTICLE IV.

##### De la préparation du terrain.

697. La préparation du terrain a pour but de le nettoyer, en tant que cela est nécessaire, des herbes et arbustes qui y croissent, et de le rendre assez meuble pour que la semence puisse y germer, les plants naissants y étendre leurs racines et s'y nourrir [435].

A cet égard, il est d'expérience que des labours profonds, qui auraient pour résultat de ramener à la surface des couches de terre dépourvues de principes assimilables, ne sont pas favorables aux semis. Mais il en est autrement d'une culture, même profonde,

dont le but est d'ameublir le sol en y mélangeant le terreau. Ainsi préparée, la terre est dans les meilleures conditions pour recevoir les graines, qu'il s'agisse de semis de végétaux forestiers ou agricoles.

En effet, la couche superficielle est rendue plus perméable aux eaux pluviales ; poreuse et inégale, elle condense et absorbe plus de rosée ; ne faisant plus corps avec les couches inférieures, elle les protège et les garantit contre l'évaporation, comme le ferait une couverture de feuilles mortes. D'un autre côté, les racines des jeunes plants se développant davantage et s'enfonçant plus rapidement dans une terre profondément cultivée, le chevelu se trouve d'autant plus sûrement soustrait à l'action des sécheresses. — Au contraire, dans une terre peu ou point cultivée, les racines restent grêles, superficielles, et, quand survient l'été, elles se trouvent encore dans la couche qui se durcit et se dessèche complètement ; si les plants ne succombent pas toujours, ils restent du moins chétifs pendant longtemps.

La culture a donc pour résultat de maintenir et d'accroître la fraîcheur du terrain et de contribuer à fortifier le tempérament des jeunes plants.

Elle permet encore, en raison de la perméabilité du sol, d'enterrer les graines plus profondément, et de leur assurer ainsi l'humidité nécessaire à la germination. Enfin on prévient, par la culture, le déchaussement des plants, sous l'action des gelées ; car il est évident qu'un plant bien enraciné y est moins exposé que celui qui l'est peu.

Dans les terres fortes ou substantielles, où l'on peut avoir à redouter l'envahissement des herbes, il sera prudent de faire précéder le semis d'une ou de plusieurs cultures agricoles.

Malgré les avantages incontestables qui résultent d'une culture complète, on ne doit pas oublier cependant que cette opération exige toujours des dépenses assez considérables. Toutes les fois donc qu'il ne s'agira pas de reboiser des sols dénudés depuis longtemps, mais qu'on aura simplement à compléter des semis existants, ou à repeupler des clairières ou des vides, on ne perdra pas de vue que la végétation forestière a dû maintenir le terrain suffisamment meuble, et, dans ce cas, on pourra se borner à donner une culture légère. Nous ajouterons même que dans le cas où le sol serait, par sa composition, naturellement frais et meuble (certains terrains granitiques, par exemple), une culture légère suffira presque toujours pour assurer la réussite des semis.

698. D'après ce que nous venons de dire, on voit qu'il est de la plus haute importance de bien examiner le terrain qu'on se propose d'ensemencer, afin de lui donner la préparation convenable, tant en raison de sa nature même, que par rapport à l'essence que l'on veut y cultiver. Les modes de labour conseillés par les différents auteurs forestiers sont en grand nombre ; toutefois nous n'en décrirons que trois, parce que jusqu'alors ils sont les seuls réellement consacrés par la pratique, et que d'ail-

leurs, selon nous, ils peuvent satisfaire à toutes les conditions. Ces trois modes sont :

1° Le labour entier ou le labour en plein ;

2° Le labour par bandes alternées ;

3° Le labour par places, trous ou pots.

Selon la nature du sol, selon l'essence que l'on veut cultiver, il devient souvent utile de faire précéder le labour, soit de l'écobuage, soit de quelques travaux d'assainissement ; nous donnerons donc, sur ces deux objets aussi, les explications nécessaires (1).

699. LABOUR EN PLEIN. — Le labour en plein consiste à retourner la totalité du terrain à ensemer ; il s'exécute à la charrue ou à la houe.

Le labour à la charrue est moins coûteux que le labour à la houe, et donne en outre la facilité de joindre la culture des céréales à celle du bois. Cet avantage est considérable, car souvent le produit des céréales peut couvrir entièrement les frais de culture. Toutefois, la charrue ne peut être employée que dans les terrains plats ou légèrement inclinés, dans lesquels, d'ailleurs, son action n'est pas em-

---

(1) Si nous ne parlons pas de l'épierrement du sol, c'est qu'il est reconnu que des pierres de moyenne grosseur, lorsqu'elles ne sont pas trop nombreuses, favorisent plutôt qu'elles n'entravent la réussite des semis forestiers. D'une part elles forment un abri pour les plants qui naissent dans leur voisinage, de l'autre elles affermissent les sols trop légers, et y maintiennent plus longtemps la fraîcheur.

pêchée par des pierres ou des racines trop fortes. C'est surtout dans les terres fortes et profondes, et lorsqu'il s'agit de cultiver des essences dont le pivot s'enfonce très-avant, que la charrue doit être préférée.

La houe (voy. fig. 1<sup>re</sup>) remplacera utilement la charrue, pour opérer des labours en plein, dans les terrains légers ou d'un accès difficile, et particulièrement dans les coupes d'ensemencement, ainsi que dans d'autres parties clair-plantées dont la régénération naturelle est entravée par suite du gazonnement du sol.

Il est entendu que le labour en plein, à la houe comme à la charrue, ne doit jamais être pratiqué dans les pentes rapides, où l'on pourrait craindre l'éboulement des terres.

700. LABOUR PAR BANDES ALTERNÉES. — De tous les modes en usage pour préparer le terrain au semis, le mode par bandes alternées semble réunir le plus d'avantages et être le plus généralement applicable. Il consiste à ouvrir les rayons dans lesquels on sème, et à les alterner avec des bandes qu'on laisse incultes ; celles-ci ayant au moins le double de largeur des autres.

En plaine, ces rayons peuvent être tracés à la charrue, en prenant soin toutefois, dans les sols légers, de ne pas trop enfoncez le soc ; on leur donne une largeur de 30 à 40 ou même 50 centimètres, et on les dirige de l'Est à l'Ouest, de manière à entas-

ser, sur le bord méridional, le gazon et la superficie du terrain.

En montagne, ce labour se fait à la houe ; on donne aux rayons une direction horizontale, et leur largeur varie de 20 à 40 centimètres. Plus le penchant est rapide, plus le rayon doit être étroit ; il faut éviter de laisser à celui-ci de la pente, dans le sens de sa largeur, et relever son bord inférieur en y entassant le gazon et les différentes plantes qu'on en extrait. Cette précaution est très-essentielle afin d'empêcher que les graines ne soient entraînées par les eaux pluviales dans la bande inculte.

L'avantage d'un tel mode de labour est incontestable. En montagne, ces rayons, parallèles à l'horizon, soutenus par des bandes incultes empêchent les terres de s'ébouler ; en toute situation, les semences et les jeunes plants sont abrités par les bords un peu élevés des rayons et par les herbes et les arbustes qui peuvent se trouver dans les bandes voisines. Enfin, les végétaux décomposés, les feuilles sèches s'arrêtent au fond des rayons et les eaux pluviales y sont retenues. Ainsi, l'engrais naturel, l'abri et la fraîcheur assurent bien des chances de succès à un semis fait d'après ce mode. Il est inutile d'ajouter que les dépenses qu'il nécessite, tant pour le labour même que pour l'achat des graines, sont bien moindres que celles d'un semis fait en plein.

Le seul inconvénient auquel ce mode puisse donner lieu, est que, au moyen des bandes incultes,

les herbes et autres plantes nuisibles peuvent se reproduire promptement dans les rayons cultivés et étouffer ainsi les jeunes plants ou au moins les gêner dans leur croissance. C'est au forestier à juger, selon la nature du terrain et des essences, si cet inconvénient peut réellement se présenter au point d'avoir un fâcheux résultat, et à se décider, par suite, pour le mode de préparation qu'il jugera convenable.

701. **LABOUR PAR PLACES, TROUS OU POTS.** — Ce mode de labour s'opère en formant des places ou trous carrés de 50 à 66 centimètres environ de côté, séparés les uns des autres par des intervalles de 66 centimètres à 1 mètre qu'on laisse en friche.

Comme dans le labour par bandes, on entasse les déblais de ces trous sur le bord méridional, lorsqu'ils sont faits en plaine; et, si le sol est incliné, on a soin de les creuser parallèlement à l'horizon et d'en amasser la superficie sur le bord inférieur.

Sur un terrain presque nu, on peut aligner ces trous carrés, de manière à donner au tout, à peu près l'aspect d'un damier; au contraire, on les fait sans ordre déterminé lorsque le sol présente des obstacles tels que des arbres que l'on ne voudrait point couper encore, de vieilles souches, des blocs de rochers, etc. C'est alors, surtout, que le labour par trous est avantageux, parce qu'il serait souvent impossible d'établir des rayons continus.

Les différents modes de labour qui viennent d'être

indiqués peuvent se pratiquer en toute saison, sauf, bien entendu, celle des fortes gelées. Pour les semis du printemps, il convient de faire préparer le terrain dans l'été ou dans l'automne précédent, que sa nature soit d'ailleurs compacte ou légère. Si le sol est léger et que, en raison des plantes parasites qui le recouvrent, il a fallu le remuer assez profondément, il aura le temps de se raffermir suffisamment avant de recevoir la graine [697]; s'il est compacte, les gelées d'hiver en l'attaquant et le soulevant en tous sens, le rendront plus meuble et plus propice par conséquent à la végétation. — Cette distribution des travaux présentera en outre l'avantage de pouvoir se procurer plus aisément et à moins de frais les ouvriers dont on a besoin, ce qui, dans la saison du printemps où les ouvrages de la campagne réclament ordinairement tous les bras, est souvent très-difficile.

**702. ECOBUAGE.** — L'écobuage qui, dans la culture des champs, produit des effets fort avantageux, peut contribuer aussi, dans beaucoup de cas, au succès des cultures forestières. Il consiste ordinairement à enlever, par tranches, à 5 ou 6 centimètres de profondeur la superficie du sol couverte de plantes; à couper ces tranches en morceaux carrés pour en faire de petits fours qu'on allume et qu'on brûle à feu étouffé; puis à répandre les cendres obtenues sur le terrain.

Les résultats de cette opération sont : 1° de dé-



truire les mauvaises herbes et leurs semences, ainsi que les œufs et les repaires d'animaux nuisibles; 2° de brûler les acides végétaux qui se trouvent en excès dans le sol et sont contraires à la végétation des essences forestières; 3° enfin, de fournir un amendement. Les deux premiers de ces résultats ne sauraient être qu'avantageux, quelle que soit d'ailleurs la nature du terrain; mais il n'en est pas de même du troisième, et il importe, par conséquent, de connaître la manière d'agir des cendres, comme amendement, afin de n'appliquer l'écobuage que dans les sols où il peut avoir de bons effets.

« L'action des cendres sur les terrains cultivés, » dit M. de Candolle (1), est, comme la nature même » de cette matière, complexe et variable. Les cendres tiennent le milieu entre les amendements et les engrais, sous ce rapport, qu'outre les matières terreuses qui en constituent la masse, elles contiennent toujours une certaine quantité de sels et de débris organiques. Considérées comme amendement, leur action est variable, selon que, fournies par divers combustibles, elles peuvent contenir des quantités très-diverses de matières terreuses différentes et de sels différents. On peut dire, en général, que : 1° elles agissent mécaniquement en divisant les sols trop compactes, et, sous ce rapport, plus elles sont siliceuses, plus elles ont d'action;

---

(1) *Physiologie végétale*, tome III, page 1267.

» 2° elles ont une action hygroscopique, en absorbant  
 » l'humidité ; 3° elles paraissent accélérer la décom-  
 » position du terreau ; et 4° enfin, peut-être agissent-  
 » elles à titre d'excitants. »

« Il est donc évident, dit plus loin le même au-  
 » teur (1), et la pratique confirme cette théorie, que  
 » l'écobuage est utile : 1° dans les terrains trop ar-  
 » gileux, pour les diviser et les rendre moins hy-  
 » groscopiques ; 2° dans les terrains très-chargés de  
 » mauvaises herbes et en même temps très-humides ;  
 » 3° dans les climats où l'humidité de l'air est très-  
 » continue ; 4° dans les terrains marécageux, tour-  
 » beux ou froids, couverts de mousses, de joncs, de  
 » lichens, etc., pour les exciter par les molécules  
 » alcalines des cendres, et accélérer leur décompo-  
 » sition. »

703. Dans les cultures forestières, l'écobuage ne se pratique pas toujours comme nous l'avons expliqué plus haut ; souvent on se borne à brûler, sur pied, les herbes et les arbustes qui recouvrent le sol. Cette opération, qui se fait à peu près comme le sarage à feu courant qui a été décrit dans le quatrième livre [620], est avantageuse, d'abord, en ce qu'elle épargne les frais de main-d'œuvre ; en second lieu, parce qu'elle peut être employée même dans des terrains inclinés ou d'une nature assez légère. En

---

(1) *Physiologie végétale*, tome III, page 1277.

effet, le sol, dans ce cas, n'étant point remué, conserve toute sa compacité, et si, entre le moment de l'écobuage et celui du semis, on laisse s'écouler quelque temps (1), les cendres, demeurant à la surface, seront, en très-grande partie, dispersées par les vents, de telle sorte qu'en définitive, les résultats de l'opération se réduiront, à peu de chose près, à la destruction des plantes nuisibles. Ajoutons que les jeunes plants, en grandissant, fourniront, par leurs dépouilles et par l'ombrage qu'ils procurent, une fraîcheur et un engrais salutaires qui tendront nécessairement à neutraliser les effets des cendres.

On pourra donc écobuer à *feu courant* pour détruire les fortes herbes, les bruyères, les myrtilles, etc., pourvu que le terrain ait quelque compacité, comme les sables gras, par exemple, et que la pente ne soit pas trop rapide. Au contraire, on devra s'interdire cette opération dans les versants escarpés, dans les sables mouvants, dans les pierrailles soit siliceuses, soit calcaires, dans les sols crayeux et, en général, dans tous les terrains qui, par leur peu de consistance, se dessèchent très-facilement.

704. ASSAINISSEMENT. — Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'assainissement d'un terrain, soit marécageux, soit aquatique, il faut rechercher d'abord d'où proviennent les eaux surabondantes qu'il s'agit de

---

(1) On peut écobuer en automne pour semer au printemps.

faire disparaître. Ordinairement elles sont produites par le débordement d'une rivière ou d'un ruisseau ; ou bien par des sources, apparentes ou souterraines, qui se trouvent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du terrain détrempe. Souvent aussi les eaux pluviales ou de neige, ne pouvant s'infiltrer, à cause d'un banc d'argile situé à peu de profondeur, sont maintenues dans la couche de terre végétale et s'accumulent dans les lieux les plus bas, au point de les submerger.

705. Quand ce sont les débordements d'une rivière qu'il s'agit de combattre, c'est au creusement de son lit, à l'endigage de ses rives qu'il faut avoir recours. Mais de tels ouvrages, d'ordinaire très-considérables, difficiles d'ailleurs sous le rapport de l'art, et qui intéressent le plus souvent un grand nombre de propriétés riveraines, ne sont plus à compter au nombre des travaux de simple amélioration forestière ; leur exécution ne peut être confiée qu'à des hommes spéciaux.

Le cas qui rentre dans les attributions du forestier, c'est quand des accidents analogues sont causés par un simple ruisseau, soit qu'il emplisse ou exhausse son lit entier par les matières qu'il charrie, soit qu'il s'obstrue seulement sur quelques points, soit enfin qu'il se gonfle outre mesure à certaines époques de l'année. Redresser le cours de l'eau, en coupant les nombreuses sinuosités qu'il forme, par un fossé suffisamment profond ; ouvrir, dans le ter-

rain inondé, d'autres fossés de moindre dimension, qui débouchent dans le premier ; enfin, s'il en était besoin, creuser des saignées ou rigoles plus petites encore, aboutissant dans les fossés secondaires : tels sont ordinairement les moyens à employer.

706. Lorsque les marécages sont formés par des eaux de source sans écoulement, il importe de distinguer si elles sourdent dans le marais même, ou si, au contraire, elles sont fournies par une source placée à l'extérieur, dans une situation plus élevée.

Dans le premier cas, on ouvrira, dans le sens de la pente du sol, un fossé qui traverse la partie la plus détrempée du marais ; puis on observera, sur les parois de ce fossé, les points d'où les eaux suintent avec le plus d'abondance. Là on creusera de nouveaux fossés que l'on poursuivra de manière à finir par mettre les sources à découvert. Ajoutant ensuite, à ces fossés, des saignées plus petites, le terrain sera facilement assaini.

Dans le second cas, lorsque les eaux viennent de l'extérieur, il convient d'ouvrir d'abord, immédiatement au-dessus du marais, un fossé transversal pour recueillir les eaux ; puis, on en ajoutera deux autres, sur les côtés, pour les écouler. Si, malgré cela, le terrain à assainir conserve encore trop d'humidité, quelques fossés ouverts dans l'intérieur ne tarderont pas à procurer le résultat désiré.

C'est d'après le même procédé que l'on pourra assainir, dans les forêts assises sur des couches d'ar-

gile, les parties basses, périodiquement inondées par les eaux de pluie ou de neige,

On peut aussi, dans ces sortes de terrains, lorsqu'ils manquent de pente, avoir recours aux bétoures ou puits-perdus artificiels, pourvu toutefois que la couche d'argile sur laquelle le sol végétal repose ne soit pas d'une grande puissance; autrement les frais de l'opération, on le conçoit, deviendraient hors de proportion avec l'utilité qu'elle doit procurer.

707. Il ne faut pas trop se hâter de repeupler les terrains qui viennent d'être assainis. Il convient, au contraire, de les laisser ressuyer et tasser complètement pendant une ou deux années.

## ARTICLE V.

De la saison la plus convenable au semis.

708. Il est naturel de penser, en général, que la saison la plus convenable au semis de nos essences forestières nous est indiquée par l'époque de la dissémination naturelle de leurs graines. C'est un principe que l'on peut admettre, sauf les cas d'exception.

Pour les semis de glands, de faïnes et de châtaignes, par exemple, on préfère ordinairement le printemps à l'automne, quoique ce soit dans cette

dernière saison que ces fruits tombent des arbres. Les motifs de cette exception sont dans les circonstances particulières que les graines rencontrent dans un semis artificiel, et qui sont toutes différentes de celles qui, d'ordinaire, se présentent dans un semis naturel. En effet dans les semis naturels, les semences se répandent surabondamment, et, pourvu que la moindre partie réussisse, le repeuplement se trouve complet; les arbres qui ont produit les graines, le lit de feuilles sèches, les mousses, etc., leur fournissent d'ailleurs un couvert précieux pour résister aux froids de l'hiver. Au contraire, dans les semis artificiels, il n'est pas possible de semer avec autant de profusion, et souvent même le prix de la semence oblige, sous ce rapport, à beaucoup d'économie; en second lieu, les semis se font d'ordinaire dans des terrains entièrement nus ou du moins fort peu couverts; les graines sont donc bien plus exposées à geler ou à se gâter; enfin, plusieurs animaux, les sangliers et les mulots surtout, trouvant peu de nourriture pendant le mauvaise saison, se jettent quelquefois sur les semis artificiels et les ravagent totalement.

Les graines résineuses, quelle que soit d'ailleurs l'époque de leur dissémination naturelle, doivent aussi, en général, se semer plutôt au printemps qu'en automne; les oiseaux, principalement ceux de passage, y causent souvent des dommages considérables dans cette dernière saison. Un inconvénient non moins réel, et qui existe surtout dans les climats un

peu rudes, c'est que les graines semées en automne lèvent trop tôt au retour du printemps suivant, pour que les jeunes tiges, tendres et presque toujours peu abritées, ne soient pas souvent victimes des gelées tardives de cette époque de l'année.

## ARTICLE VI.

Des quantités de semence à employer.

709. Ainsi que nous l'avons dit plus haut [695], il est très-important de connaître les quantités de semence qu'il convient d'employer dans les semis. Ces quantités dépendent de la fertilité du sol, de sa déclivité, du climat local et des dangers qui, par suite, peuvent menacer les jeunes plants dans les premières années ; mais elles varient surtout selon la grosseur de la graine, selon sa qualité et selon le mode de labour adopté.

Plus la graine sera grosse, plus il en faudra, en poids ou en volume, pour ensemer une étendue déterminée ; si l'on a des doutes sur sa qualité, si les dégâts d'animaux sont à craindre ou si, en général, les circonstances sont peu propices à sa réussite, la quantité à employer dans les cas ordinaires devra être augmentée ; enfin, le labour en plein absorbera plus de semence que le labour partiel, soit celui



par bandes, soit celui par pots. Nous ferons observer, toutefois, qu'avec ces deux derniers modes de labour, il est nécessaire d'employer proportionnellement plus de semence qu'avec le labour en plein. On conçoit, en effet, qu'il est important, dans un semis par places, par exemple, que toutes les places soient bien peuplées; car si quelques-unes seulement restaient vides, leur surface, ajoutée à celle des parties environnantes demeurées en friche, formerait des espaces trop considérables, pour que, de longtemps, le massif pût se former. Aussi emploie-t-on toujours, dans un semis partiel, les deux tiers à peu près de la semence nécessaire pour un semis en plein, quoique, cependant, il n'y ait à ensemer que le tiers ou la moitié tout au plus du terrain.

En traitant, plus bas, du semis de chaque essence en particulier, nous indiquerons les quantités de graine que l'expérience a démontré devoir être employées par hectare, selon les différents modes de labour, en supposant la graine de qualité moyenne et les circonstances extérieures ordinaires.

## ARTICLE VII.

## De la manière de semer.

710. Dans l'opération du semis proprement dit, il faut porter son attention sur deux objets principaux : le premier, de répandre la graine le plus également possible ; le second, de la recouvrir convenablement (1).

711. Lorsque le terrain à ensemençer est considérable, il est bon de le diviser en parcelles d'égale contenance (de 20 ou 25 ares, par exemple), et de partager aussi la semence en un même nombre de parts égales. Sans cette précaution, il serait difficile de régler le travail des ouvriers semeurs, ou de le

---

(1) Lorsque la graine que l'on doit semer est vieille ou qu'elle a naturellement une enveloppe que l'humidité pénètre difficilement, on fera bien de la mettre tremper dans de l'eau vingt-quatre heures avant de la répandre. Un procédé plus efficace, en usage chez beaucoup d'agriculteurs et qu'on a souvent imité avec succès en sylviculture, consiste à immerger la graine, pendant quarante-huit heures, dans du purin. Cette pratique, qui réussit pour les graines lourdes aussi bien que pour les légères, hâte singulièrement leur germination et permet, par suite, dans les localités où les gelées tardives sont à craindre, de retarder l'époque du semis sans risquer de différer la levée du plant jusqu'au moment des chaleurs ; il prévient aussi l'envahissement du semis par les herbes et autres plantes nuisibles.

corriger à temps, s'il était fautif. Dans un semis en plein, les ouvriers peuvent semer à la volée, comme on sème les céréales; mais lorsque le terrain est préparé par bandes alternées ou par pots, ils doivent, pour répandre la graine uniformément, imprimer au bras un mouvement de va et vient, et ne laisser échapper les semences, la main étant fermée, qu'entre le pouce et l'index. Plus la semence est légère, plus il faut rapprocher la main du sol.

712. Aussitôt semées, les graines doivent être recouvertes. Cette opération se fait, dans les semis en plein, avec une herse dans laquelle, s'il y a lieu, on entrelace des branchages, afin d'empêcher qu'elle ne s'enfonce trop; pour les semences qui n'ont besoin d'être enterrées que très-légèrement, on peut aussi employer un fagot d'épines ou le rouleau. Dans les semis partiels, les semences lourdes se recouvrent à la houe, et les semences légères à l'aide d'un râteau en bois ou en fer (voy. fig. 2), selon que le sol est plus ou moins meuble. On se trouvera bien, pour ces dernières, surtout dans les sols légers, de raffermir la terre avec les pieds, ce que les jardiniers appellent *trippler*, afin de mieux unir la graine aux parcelles terreuses qui l'entourent immédiatement.

Le degré d'épaisseur dont il convient de recouvrir les graines, dépend, à la fois, de leur nature particulière et de la nature du sol. Les semences légères, ayant l'amande petite, et dont le plant, en levant, est très-ténu, ne doivent être enterrées que

fort peu, tandis que les fruits lourds, ou à noyau dur, ont besoin de l'être davantage, afin d'obtenir l'humidité qui leur est nécessaire pour germer. Dans un sol compacte, les graines doivent être peu couvertes; au contraire, dans un sol léger, prompt à se dessécher, il faut les enterrer plus profondément.

713. Il nous reste à parler d'une manière de semer, avantageuse surtout pour exécuter des semis partiels de semences lourdes, c'est le *repiquement*. Cette opération consiste à ouvrir, à la houe, de petits trous assez rapprochés, dans chacun desquels on place un ou plusieurs fruits, et que l'on recouvre ensuite avec le même instrument, ou seulement avec le pied, si le sol est bien meuble. Non-seulement ce procédé permet d'économiser beaucoup la semence, mais encore chaque graine se trouve, en général, mieux enterrée et plus convenablement placée pour prospérer. Dans les lieux clairiérés, dans les coupes d'ensemencement dont le sol est gazonné [482], lorsqu'il s'agit d'établir un mélange d'essences [489], le repiquement est souvent préférable à tout autre mode de semis, parce qu'il peut s'exécuter sans labour préalable.

Outre la houe, on se sert encore, pour cette opération, de plusieurs autres instruments. Le plantoir ordinaire peut être employé; toutefois, dans les sols argileux, il a l'inconvénient de trop tasser la terre et de mettre obstacle, par là, au développement du jeune plant. On a inventé, en Allemagne, un plan-

toir qui lève et inconvénient. Cet instrument est en fer, rond, d'une longueur de 15 centimètres environ, pointu par le bas, large au milieu de 3 à 6 centimètres, selon la grosseur de la graine qu'il doit servir à repiquer, et partagé par quatre nervures saillantes, le tout surmonté d'un manche (v. fig. 4). Lorsqu'on enfonce le plantoir, on tourne et retourne le fer, ce qui émiette et divise la terre; ainsi fait, le trou se remplit en partie de cette terre émiettée et conserve précisément la profondeur convenable pour y placer une graine, telle qu'un gland, par exemple.

Il est évident, comme nous venons de le dire, que ce plantoir n'est réellement avantageux que dans les terres fortes; car, dans un sol très-léger, ce n'est plus à diviser la terre qu'il faut s'appliquer, mais bien à la raffermir. Pour obtenir ce résultat, on a construit, encore en Allemagne, un *plautoir-massue* (v. fig. 5). Cet instrument se compose d'un cylindre en bois de chêne de 33 centimètres environ de hauteur sur 16 à 18 centimètres de diamètre, cerclé en fer aux deux extrémités et surmonté d'un manche. Au centre de la base inférieure est fixé un boulon de 3 à 6 centimètres de longueur, sur 2 à 4 centimètres de large. Ces dimensions varient suivant la grosseur de la graine qu'on veut repiquer; et, afin de pouvoir modifier l'instrument selon qu'il est besoin, on a des boulons de différentes grosseurs qui se vissent après le cylindre en chêne.

Pour faire usage du plantoir-massue, on l'éleve

verticalement et on le laisse retomber de même sur le sol. Il en résulte d'abord la cavité formée par le boulon dans laquelle on place la graine; ensuite, la terre est raffermie par le poids du cylindre et tassée au point de présenter un renforcement de plusieurs centimètres, dans lequel l'humidité s'accumule, et dont les bords abritent le plant naissant (1).

---

(1) Cotta conseille de repiquer aussi les semences légères. Il n'existe aucun motif raisonnable, dit-il, pour ne pas le faire, si ce n'est que le maniement des petites graines est moins aisé, et que, par conséquent, la main-d'œuvre peut revenir trop cher. Mais, comme on peut employer, à cette opération, des femmes, et même des enfants, dont les doigts sont plus déliés et dont le salaire est moindre, cette objection n'est pas fondée.

## CHAPITRE TROISIÈME.

---

### APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES

—  
AU

SEMIS DES ESSENCES LES PLUS IMPORTANTES.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Semis du chêne.

714. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — La manière de récolter les glands et de les soigner immédiatement après qu'ils ont été amassés, a été expliquée plus haut [693 et 694]. Nous ajouterons seulement qu'il faut éviter de faire amasser les premiers tombés, parce qu'ils sont ordinairement de mauvaise qualité et piqués des vers.

On connaît, pour conserver les glands pendant l'hiver, différents moyens, plus ou moins applicables, selon les circonstances dans lesquelles on se trouve :

1° Dans un jardin, ou en tout autre lieu clos, on choisit une place bien sèche que l'on garnit d'un lit de feuilles, sèches aussi, de la hauteur de 33 centimètres environ. Sur ce lit de feuilles, on place les glands, par tas coniques d'un mètre de haut; on les recouvre d'une couche de feuilles mortes de 33 centimètres d'épaisseur, puis on ajoute encore 16 centimètres de mousse sèche, et 16 centimètres de paille. Sur le tout on établit une couverture en paille comme celles que l'on voit sur les meules de grain ou de foin; enfin, pour mieux garantir le sol de toute humidité, on ouvre un fossé circulaire autour de la place de dépôt.

2° On établit des silos ou fosses. S'ils ne sont que temporaires, on se contente d'en soutenir les parois par des pieux entre lesquels on tresse de la paille; s'ils doivent servir pendant longues années, on les construit en maçonnerie. Dans le fond de la fosse, on met un lit de paille, les glands y sont répandus par couches de 33 centimètres d'épaisseur, alternant avec des couches aussi épaisses de menue paille et de feuilles sèches. Ainsi remplie, la fosse est recouverte de planches, par-dessus lesquelles on élève une butte de terre bien tassée, afin d'empêcher le froid et l'humidité d'y pénétrer.

3° On peut remplir de glands des tonneaux ou des caisses, qu'on perce de petits trous et qu'on plonge dans l'eau pour les y laisser jusqu'au printemps. Le séjour des glands dans l'eau les conserve et ne leur ôte rien de leur faculté germinative.



4° On prend de grandes caisses qu'on élève sur des liteaux, dans une cave, de même qu'on place les tonneaux. On remplit ces caisses de couches alternes de sable et de glands. Il faut avoir soin d'employer du sable de rivière bien sec et éviter surtout un sable terreux. La couche supérieure de glands, ayant toujours plus de disposition à germer, doit être recouverte de 22 à 27 centimètres de sable. Il n'est pas nécessaire de donner d'autre couverture à la caisse.

Ces quatre modes de conservation du gland sont donnés par Hartig. D'après l'expérience qu'il en a faite, le premier lui paraît préférable; nous pouvons indiquer le quatrième comme nous ayant toujours parfaitement réussi, alors même que les glands n'étaient extraits des caisses qu'à une époque assez avancée du printemps. Le gland ne peut se conserver que jusqu'au premier printemps.

715. EXAMEN DE LA GRAINE. — Le gland doit remplir complètement son enveloppe extérieure; en le séparant par le milieu dans le sens de sa longueur, il doit être blanc, frais et luisant; le germe qui se trouve à la partie supérieure doit être intact. Si, au contraire, le fruit est desséché, d'une couleur bleuâtre ou noirâtre intérieurement, s'il a une odeur de moisi, ou s'il est piqué, sa faculté germinative est détruite.

Un autre moyen de juger de la bonté des glands consiste à en jeter un nombre déterminé dans un

vase rempli d'eau; ceux qui tombent au fond sont bons pour la plupart, ceux qui surnagent sont mauvais. Enfin, on les juge aussi par le poids : un litre de glands de bonne qualité doit peser environ de 550 à 600 grammes.

746. EXÉCUTION DU SEMIS. — Lorsque le terrain à repeupler est en plaine, d'une nature compacte, entièrement découvert, mais garni cependant d'arbustes et de gazon, il convient de le préparer en y cultivant, soit des céréales, soit des pommes de terre, pendant une ou deux années selon qu'il sera plus ou moins facile de le nettoyer et de l'ameublir. Ce résultat obtenu, on donne un dernier labour à la charrue, et l'on répand les glands avec une demi-semaille de seigle, si c'est en automne, et d'avoine ou d'orge, si c'est au printemps.

Le semis ne doit être recouvert que de 3 ou 4 centimètres au plus. La herse est l'instrument le plus convenable pour cette opération. A la récolte des céréales, il faut avoir soin de couper les chaumes à une certaine hauteur, afin de ne pas endommager les jeunes chênes.

Dans les sols légers ou en pente, le labour partiel, soit par bandes, soit par places, doit être préféré; et, selon les circonstances, on répand les glands pour les recouvrir ensuite avec la houe, ou bien on les repique. Si les herbes ou les arbustes sont peu nombreux, ce dernier mode peut même être pratiqué sans aucun labour préalable.

Dans les terres légères, le gland doit être recouvert de 5 à 6 centimètres.

Semé en automne (1), il lève au bout de cinq à six mois ; semé au printemps, après quatre ou six semaines. Cette dernière saison est toujours préférable, ainsi que nous l'avons dit plus haut [668] ; mais quand on a des semis très-considérables à faire et qu'on ne peut, par divers motifs, garder jusqu'au printemps toute la quantité nécessaire de glands, il convient de partager son semis entre les deux saisons, en prenant la précaution de semer en automne avec plus d'abondance, afin de faire la part des intempéries et des animaux.

Quoique le jeune chêne soit d'un tempérament très-robuste et ne réclame en général aucun abri [72], on se trouvera bien cependant, dans les départements de l'ouest et du midi, de lui adjoindre, dans la proportion d'un quart ou d'un cinquième, une ou plusieurs essences ayant une croissance rapide dès les premières années, telles que bouleau, pin sylvestre ou maritime, etc. Dès que ces bois auront atteint les dimensions propres à faire de menus fagots, et que les chênes d'ailleurs se montreront suffisamment vigoureux, on s'empressera de débar-

---

(1) On fera bien de ne pas semer avant la mi-novembre, et même plus tard dans les climats doux, afin d'empêcher chez le gland la germination d'automne qui le rendrait victime des gelées de l'hiver.

rasser ceux-ci des essences auxiliaires, en les enlevant par forme de nettoitement.

Les quantités de glands à employer par hectare sont :

Pour un semis en plein,	15 à 16	hectolitres ;
Pour un semis partiel,	10 à 12	id.
Pour le repiquement,	6 à 7	id.

#### ARTICLE II.

##### Semis du hêtre.

717. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — La faîne se récolte et se conserve comme le gland (1). Hartig indique, en outre, pour la conservation de cette semence, un procédé très-simple et qu'il dit avoir souvent employé avec un entier succès.

Après avoir étendu les faînes dans un endroit aéré, et les avoir journellement retournées, pour en laisser évaporer toute l'humidité [694], il suffit de les entasser, à une hauteur de 33 à 66 centimètres, sur le plancher d'une chambre close et de les recouvrir de 33 centimètres environ de paille, afin de les garantir du froid.

La faîne, à moins de précautions minutieuses et impossibles à pratiquer en grand, ne peut se garder que de l'automne au printemps.

---

(1) Cotta dit que la faîne ne se conserve pas dans l'eau.

**718. EXAMEN DE LA GRAINE.** — La qualité de la faîne s'apprécie, en général, d'après les mêmes caractères que celle du gland. On peut, en outre, en juger par le goût du fruit; il doit être agréable et rappeler celui de l'amande ou de la noisette. Une saveur rance indique la mauvaise qualité.

Un litre de faînes doit peser de 405 à 425 grammes.

**719. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le tempérament très-délicat du jeune hêtre rend, en général, impraticable le semis en plein de cette essence, sur un terrain entièrement nu. Quand bien même on mélangerait une forte quantité de céréales à la faîne, on ne remédierait pas à cette difficulté, puisque l'abri est nécessaire pendant plusieurs années; aussi faut-il, pour réussir dans une opération de ce genre, préparer, quelque temps à l'avance, l'abri indispensable.

Dans ce but, après que le terrain est convenablement labouré, on le partage par bandes dont, sur deux, on en sème une d'essences ayant une végétation rapide, telles que bouleaux, ormes, pins, etc.; on peut aussi, pour plus d'économie, employer, selon le climat, le genêt ou l'ajonc. Si l'on veut gagner du temps, il faut planter ces essences au lieu de les semer; car ce n'est que quand elles auront atteint une certaine hauteur, qu'on pourra répandre la faîne dans les bandes intermédiaires restées vides. L'abri créé de cette manière doit être conservé au jeune

hêtre jusqu'à ce qu'il en éprouve quelque gêne, ou du moins jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour résister aux influences atmosphériques; alors les essences auxiliaires pourront être extraites par forme de nettoielement.

Toutefois, le mode d'opérer que nous venons d'indiquer ne saurait être suivi dans les terrains fortement inclinés, où le défrichement total du sol pourrait amener l'éboulement des terres. Dans ce cas, il faudrait, comme à l'ordinaire, diviser la superficie en bandes horizontales de 66 centimètres à 1 mètre de largeur, dont l'une resterait inculte et dont l'autre serait préparée à l'ensemencement projeté. Celle-ci serait elle-même partagée en deux portions; dans la première, on planterait ou l'on semerait à l'avance, comme nous venons de l'expliquer, et l'autre, en temps opportun, recevrait la faîne.

Les difficultés d'exécution dont est entouré le semis de la faîne en terrain découvert, les frais qu'il entraîne et les nombreuses chances auxquelles il est exposé rendent cette opération peu avantageuse, et doivent, en général, faire choisir d'autres essences pour le repeuplement des terres vagues; ou, si l'on tenait expressément au hêtre, faire préférer la plantation comme plus sûre [691]. C'est plus particulièrement dans les futaies clairiérées, dans certains taillis entièrement épuisés, ou bien dans d'autres parties totalement envahies par les bois blancs ou les

morts-bois que l'on pourra semer la faîne avec succès [557]. Dans de telles circonstances, le repiquement sera surtout convenable ; on fera bien de jeter plusieurs semences dans le même trou, parce qu'il s'en trouve souvent qui sont vaines. Lorsque les jeunes plants de hêtre auront acquis suffisamment de force, les autres essences devront être extraites par forme de nettoisement.

La faîne ne doit être recouverte que de 15 à 30 millimètres, suivant la nature plus ou moins compacte du sol. Il faut faire en sorte que la terre soit bien divisée à sa surface ; autrement, le jeune plant qui lève avec deux lobes séminaux très-amples ne pourrait la percer.

La faîne, semée en novembre, lève au bout de cinq à six mois ; semée au printemps, qui est la saison préférable, les plants lèvent au bout de trois à six semaines.

Pour un semis en plein, il faut, par hectare,  
de..... 8 à 10 hectolitres ;  
pour un semis partiel, de..... 6 à 7 id.  
et pour le repiquement, de.... 3 à 4 id.

720. Cotta indique, dans son traité de la culture des bois, un mode particulier de semer la faîne sans donner aucun abri au jeune plant, mode qui, dit-il, lui a parfaitement réussi. Voici en quoi il consiste.

Le terrain étant partagé par bandes alternées, on creuse, dans le milieu de la bande cultivée, une rigole de 10 à 12 centimètres de large, sur autant

de profondeur environ ; c'est dans cette rigole qu'on sème la faine. Immédiatement après la levée des plants, on comble la rigole, en y tirant les terres voisines, de manière à en entourer complètement les petites tiges jusqu'à fleur des feuilles séminales. Il paraît, ajoute Cotta, que c'est surtout la tige des jeunes hêtres qui souffre des influences atmosphériques, et, qu'en la préservant d'une manière quelconque, les jeunes plants peuvent se passer d'ombrage.

L'auteur que nous citons mérite la plus grande confiance, et nous sommes d'autant plus porté à croire bon le procédé qu'il recommande, que nous connaissons un fait qui en confirme entièrement l'efficacité.

Dans la forêt de Compiègne, appartenant au domaine de la Couronne, on exécute, chaque année, des plantations très-considérables de différentes essences et entre autres de hêtre. Ordinairement, les sujets plantés proviennent de semis faits en pépinière et ne sont définitivement mis en place qu'après avoir subi, dans la pépinière même, une première transplantation. Mais, pour le hêtre en particulier, comme on connaît les difficultés de le semer en terrain découvert, on se procure les jeunes plants, qui doivent subir cette première transplantation, dans les massifs de futaie où ils lèvent en abondance. Ce sont les plants naissants, munis encore de leurs feuilles cotylédonaire, que l'on choisit de préfé-



rence; on les extrait de terre avec un couteau, puis, dans la pépinière, on les place, à ciel ouvert, dans des rigoles semblables à celles dont parle Cotta, en prenant aussi la précaution de les enterrer entièrement jusqu'aux feuilles séminales. Quand l'été est très-chaud, on perd néanmoins beaucoup de ces plants; mais ceux qui résistent, et en général c'est le très-grand nombre, deviennent, dès lors, suffisamment robustes pour supporter les intempéries de tout genre.

Cette pratique du *buttage* des semis de hêtre en terrain découvert est aujourd'hui généralement admise en Allemagne, et les meilleurs auteurs la recommandent, tout en reconnaissant, cependant, que la plantation reste toujours le moyen le plus sûr et le plus facile pour établir le hêtre sur un sol entièrement dénudé.

#### ARTICLE III.

##### Semis du châtaignier.

721. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — Les châtaignes se récoltent et se conservent comme le gland. Le moyen de conservation qui nous a toujours le mieux réussi est la stratification dans le sable, telle que nous l'avons décrite plus haut; on peut aussi les garder assez longtemps, en les laissant dans leur enveloppe extérieure appelée communément hérisson. La châtaigne ne se conserve que pendant un hiver.

722. **EXAMEN DE LA GRAINE.** — La qualité des châtaignes se reconnaît par les mêmes caractères que celle des glands et des fâines. La châtaigne doit avoir une saveur agréable, quoique légèrement acerbe. On a prétendu que la grosseur du fruit devait être prise en considération, et qu'il fallait éviter de semer de petites châtaignes, parce qu'elles produisent des plants d'une faible végétation. C'est une erreur. Quelle que soit leur grosseur, les châtaignes produisent de bons plants, pourvu qu'elles proviennent d'arbres bien portants, qu'elles soient saines, fermes, bien remplies, et que le germe soit intact.

723. **EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le châtaignier demande, plus que toute autre essence, un sol bien nettoyé. On doit, à cet effet, donner un labour convenable, soit à la charrue, soit à la houe ; puis disposer le terrain par bandes alternées. Dans l'une, de 16 centimètres de large, on repique les châtaignes ; dans l'autre, d'une largeur d'un mètre environ, on cultive, pendant plusieurs années, des pommes de terre, des betteraves, etc., afin d'empêcher la crue des plantes nuisibles.

Le repiquement des châtaignes se fait ordinairement assez dru, en raison des ennemis qu'elles ont à redouter et des différentes chances auxquelles elles sont exposées [708]. Si les plants levaient trop épais en certains endroits, on aurait toujours la facilité d'en extraire une partie pour garnir les places où le semis aurait moins bien réussi.

Le mode de semis dont nous venons de parler, s'emploie plus particulièrement pour élever le châtaignier en massif de futaie. Quand il s'agit d'un taillis, on prépare le terrain de même, mais, au lieu de semer en rigoles, on établit communément des trous ou pots peu profonds, espacés d'un mètre à un mètre et demi, dans chacun desquels on repique deux ou trois châtaignes. Comme il suffit de laisser, dans chaque trou, une seule tige, on dispose des plants superflus au bout de deux ans. A l'âge de cinq ou six ans, et même plus tôt, selon sa végétation, on recèpe le jeune plant avec soin, après avoir donné, jusqu'à cette époque, au moins deux cultures à la terre.

On a prétendu qu'il était à propos d'abriter les jeunes châtaigniers par des bouleaux, des saules marceaux, ou par d'autres bois d'une croissance rapide. Cette précaution est au moins inutile dans l'Est et le Nord de la France où le jeune châtaignier, s'il occupe les expositions qui lui conviennent, n'a pas besoin d'abri. Dans les régions plus chaudes, un tel mélange pourra être mieux à sa place.

La châtaigne ne s'enterre que de 3 à 6 centimètres au plus, selon la nature du sol. Quand on la sème en automne, elle lève après cinq ou six mois ; si elle n'est semée qu'au printemps, le plant paraît au bout de trois à six semaines. Cette dernière saison doit en général être préférée.

Pour semer en rigoles, ainsi que nous l'avons

indiqué plus haut, il ne faut que 9 ou 10 hectolitres de châtaignes, par hectare; quand on repique par pots ou trous, on conçoit que la quantité doit être de beaucoup inférieure; 2 ou 3 hectolitres, au plus, doivent suffire.

## ARTICLE IV.

## Semis de l'orme.

**724. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — On récolte les semences d'orme en en dépouillant les rameaux à la main. Aussitôt qu'elles sont cueillies, il est essentiel de les étendre, en couches minces, dans un lieu bien aéré et de les remuer souvent. Pour peu qu'on les laisse en tas, elles s'échauffent et perdent leur faculté germinative. En continuant à leur donner les mêmes soins, on peut rigoureusement les conserver jusqu'au printemps suivant; mais il est préférable, sous tous les rapports, de les semer immédiatement après leur maturité.

**725. EXAMEN DE LA GRAINE.** — La semence qui est placée au centre de la membrane doit être un peu élevée et ferme au toucher; en la coupant transversalement et en l'écrasant sur l'ongle, il faut qu'elle soit farineuse en même temps qu'humide; en outre, elle doit dégager une odeur fraîche, agréable et avoir une saveur oléagineuse prononcée.

Un litre de semence d'orme doit peser environ 40 grammes.

**726. EXÉCUTION DU SEMIS. —** Le labour par bandes alternées ou par trous carrés est le plus avantageux pour le semis de l'orme. Comme il est convenable de semer la graine de suite après sa maturité qui a lieu au commencement de juin, on fera bien de chercher à donner un premier abri aux jeunes plants, afin qu'ils résistent mieux aux chaleurs de l'été. A cet effet, si le sol est en plaine ou en pente douce, on pourra, dès le printemps, tracer les bandes destinées à la graine d'orme et ensemençer le reste du terrain en orge ou en avoine. De cette manière, l'abri sera assuré aux jeunes plants sitôt qu'ils lèveront, et l'on obtiendra en même temps un produit en céréales, ce qui n'aurait pu avoir lieu si on ne les avait semées qu'avec la graine d'orme. Lorsque le terrain sera fortement incliné, on pourra ou subdiviser la bande cultivée [719], ou se contenter de mélanger la graine d'orme aux céréales, sauf à faire le sacrifice de celles-ci.

La semence d'orme doit être très-légèrement recouverte; elle n'a même besoin de l'être que pour empêcher le vent de la disperser. Semée aussitôt après sa maturité, elle lève au bout de quinze jours ou de trois semaines (1), et, dès l'automne, les jeunes

---

(1) Quand les étés sont très-chauds et secs, il arrive assez souvent que le semis ne lève que partiellement. Mais d'ordinaire, le succès n'est que retardé et se produit au printemps suivant.

plants atteignent une hauteur de 16 à 22 centimètres.

Pour effectuer un semis d'orme en plein, il faudrait employer, par hectare, de 28 à 30 kilogrammes de semence; pour le semis partiel, 18 à 22 kilogrammes peuvent suffire.

## ARTICLE V.

## Semis du frêne.

**727. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — Le meilleur moyen pour récolter la semence du frêne est de la cueillir à la main; si l'on voulait employer la gaule, il faudrait choisir, pour cette opération, un temps parfaitement calme.

Cette graine est sujette à se dessécher, et se conserve, en général, assez difficilement; il est bon de la mélanger avec du sable et de la placer dans un endroit frais: Ce qui vaut mieux, c'est d'ouvrir, dans quelque terrain, des rigoles ou fosses de 33 à 50 centimètres de profondeur, sur une longueur et une largeur proportionnées à la quantité de graines recueillies, d'y jeter cette graine en amas, puis de la couvrir de 12 à 16 centimètres de terre. Comme la semence de frêne ne germe que la seconde année, après avoir été mise en terre, on pourra, si l'on veut semer en automne, la laisser dans les rigoles pendant un an, et même jusqu'au printemps suivant, si

c'est dans cette dernière saison seulement que doit s'effectuer le semis. Ce procédé a l'avantage de conserver la semence en très-bon état, et de plus, on sait, dès la première année, à quoi s'en tenir sur la réussite du semis.

**728. EXAMEN DE LA GRAINE.** — Pour juger des semences de frêne, on en coupe plusieurs transversalement. Si l'intérieur présente une substance d'un blanc bleuâtre et de la consistance de la cire, la graine est bonne ; elle est mauvaise si cette substance est entièrement desséchée.

Le litre de cette semence doit peser à peu près de 170 à 180 grammes.

**729. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le labour par bandes alternées ou par trous carrés est, en général, le meilleur pour les semis de frêne. Il faut faire en sorte que les jeunes plants soient un peu abrités, au moins la première année, et, dans ce but, leur adjoindre des céréales, lorsque la nature du terrain le permet. On devra éviter de laisser prendre le dessus à la mauvaise herbe qui fait beaucoup de tort aux jeunes frênes.

Sous ce dernier rapport, il est très-avantageux que la semence ait été préparée dans des fosses, parce qu'alors elle lève tout de suite, sans laisser le temps aux plantes nuisibles d'envahir le terrain.

Les semences de frêne ne doivent être enterrées que de 15 à 20 millimètres. Préparées comme nous venons de l'indiquer plus haut, et semées en au-

tomne, elles lèvent au commencement du printemps suivant ; quand elles sont semées au printemps, les plants paraissent au bout de quatre à six semaines.

Les quantités de semences de frêne à employer par hectare, sont :

Pour le semis en plein, de 40 à 45 kilogrammes ;  
et, pour le semis partiel, de 27 à 30 id.

#### ARTICLE VI.

##### Semis de l'érable.

730. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — La récolte des semences d'érable a lieu comme celle des semences de frêne. Quant à la conservation, il suffit, après les avoir laissées ressuyer dans un lieu aéré, de les mettre en tas, dans un appartement clos, et de les retourner de temps en temps ; on peut aussi les mélanger avec du sable. Traitées de la sorte, leur faculté germinative peut se conserver jusqu'au second printemps, mais il est toujours bien préférable de les semer dès le premier.

731. EXAMEN DE LA GRAINE. — Pour vérifier les graines d'érable, on en ouvre plusieurs. Elles sont bonnes lorsque, sous les capsules qui les enveloppent, on les trouve fraîches, flexibles, et d'une couleur verte. Le vert seul, cependant, ne suffit pas pour décider de la qualité ; il existe souvent quand déjà il y a desséchement. Il faut donc qu'indépendamment de la couleur, la graine présente du moelleux et de la fraîcheur.



Un litre de semence d'érable de bonne qualité doit peser de 120 à 130 grammes.

732. EXÉCUTION DU SEMIS. — Ce que nous avons dit, à cet égard, du semis de frêne s'applique aussi à celui de l'érable.

Le printemps est la saison la plus propice pour semer, les jeunes plants étant assez délicats et craignant les gelées printanières.

Pour ensemençer un hectare en plein, il est nécessaire d'employer de 60 à 65 kilogrammes de semence d'érable ; et, pour un semis partiel il en faut, sur la même superficie, de 40 à 45 kilogrammes.

#### ARTICLE VII.

##### Semis du bouleau.

733. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — Comme la semence du bouleau se dissémine très-promptement, il faut saisir à point l'époque de sa maturité pour la récolter. On cueille les chatons à la main. Un procédé plus facile, mais qui ne peut s'exécuter que sur des bouleaux destinés à être abattus prochainement c'est de couper les rameaux qui portent la graine. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'attendre l'entière-maturité ; en suspendant les rameaux coupés dans un endroit sec et aéré, la graine y achèvera de mûrir.

La semence de bouleau est très-difficile à conser-

ver, et il est à conseiller d'en faire le semis l'année même de la récolte. Néanmoins, si l'on était forcé de la garder jusqu'au printemps suivant, il faudrait l'étendre en couches minces, dans un grenier, la garantir des froids de l'hiver et la remuer très-souvent.

**734. EXAMEN DE LA GRAINE.** — L'examen des graines de bouleau se fait comme celui des semences d'orme. En en ouvrant quelques-unes, avec la pointe d'un canif, par exemple, la petite amande doit être farineuse; écrasée sur l'ongle, elle doit laisser quelques traces d'un suc laiteux.

Un litre de cette graine doit peser de 90 à 100 grammes.

**735. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le labour partiel convient plus particulièrement pour les semis de bouleau. Ce qu'il faut craindre surtout, c'est de trop enterrer la graine. On se contentera donc, pour établir les bandes ou les pots, de lever le gazon et d'extraire les arbustes; il suffira même, si le terrain n'est pas très-gazonné, de racler la superficie avec les dents d'un râteau en fer (voy. fig. 2).

En semant, il faut tenir la main le plus près possible de terre (1), afin d'empêcher que le vent

---

(1) Une bonne précaution pour faciliter l'opération du semis de la graine de bouleau, comme de toute graine très-légère en général, consiste à ne la répandre que mêlée à une certaine proportion de terre très-fine.

n'emporte la graine. Le temps le plus favorable, pour cette opération, est le temps pluvieux, parce qu'alors on peut se dispenser d'enterrer la semence ; mais si l'on sème par un temps sec, on devra faire en sorte de mêler seulement la graine à la terre, en promenant légèrement un râteau en bois dans les parties semées ou bien en les *tripplant* [712] avec les pieds.

Semée en automne qui, comme nous l'avons dit, est la saison la plus convenable, la semence de bouleau lève dès le commencement du printemps.

Si l'on voulait faire un semis en plein, il faudrait employer, par hectare, de 36 à 40 kilogrammes de semence ; pour les semis partiels, il suffira de 24 à 30 kilogrammes. En général, la graine de bouleau ne doit pas être épargnée, parce qu'elle est rarement de très-bonne qualité.

#### ARTICLE VIII.

##### Semis du robinier faux accacia.

736. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — Les gousses du robinier se cueillent à la main. En les étendant sur un grenier, elles s'ouvrent d'elles-mêmes pendant l'hiver ; il suffit ensuite de les remuer légèrement avec un râteau pour détacher les semences [179]. On sépare les graines des gousses, à l'aide du crible.

Cette semence peut se garder deux et même trois

ans; on la conserve en tas, dans des greniers, en ayant soin de l'aérer de temps à autre.

**737. EXAMEN DE LA GRAINE.** — La graine du robinier doit être brun foncé; l'intérieur doit être blanc; farineux et frais.

**738. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le semis partiel mérite la préférence. Un sol bien nettoyé favorise la végétation des jeunes plants.

Il convient de recouvrir la semence de 5 à 10 millimètres; et comme le plant, au moment de sa naissance, redoute les froids, on fera bien, quand ce sera possible, de garnir le sol d'une couche de mousse ou de feuilles mortes.

Cette susceptibilité du jeune plant doit faire préférer le printemps pour les semis de robinier. Mise en terre dans cette saison, la graine lève après trois ou quatre semaines; semée en automne, au contraire, le plant ne paraît qu'au bout de cinq ou six mois.

Quatorze à seize kilogrammes de semence de robinier seraient nécessaires, par hectare, pour un semis par bandes ou par pots; si l'on voulait semer en plein, il faudrait employer, sur la même superficie, de 20 à 25 kilogrammes.

#### ARTICLE IX.

##### Semis du charme.

**739. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — Les semences de charme se cueillent à la main; on peut aussi,

mais seulement par un temps très-calme, faire gauler les arbres en tendant des toiles pour recevoir la graine. Les moyens de conservation sont absolument les mêmes que ceux que nous avons indiqués pour la semence de frêne [727]; comme celle-ci, la graine de charme se conserve difficilement, et, mise en terre, elle ne germe que la seconde année.

740. EXAMEN DE LA GRAINE. — En ouvrant la graine de charme, on doit trouver une amande blanche et fraîche; cette amande doit remplir complètement le noyau qui lui sert d'enveloppe. Un litre de semence de charme ailée doit peser de 50 à 60 grammes; si la semence est désailée, la même capacité pèsera de 410 à 420 grammes.

741. EXÉCUTION DU SEMIS. — Ce qui a été dit pour l'exécution du semis de frêne [729] s'applique entièrement au semis de charme; seulement, la graine de cette dernière essence pourra, dans les sols légers, être enterrée jusqu'à 3 centimètres de profondeur.

Les quantités de semence de charme à employer par hectare sont :

*Semence ailée,*

pour un semis en plein, 50 à 55 kilogrammes;  
pour le semis partiel, 33 à 38 id.

*Semence désailée,*

pour un semis en plein, 45 à 50 kilogrammes;  
pour le semis partiel, 30 à 33 id.

## ARTICLE X.

Semis de l'alisier, du sorbier et du micocoulier.

742. Ces essences ne sont pas ordinairement cultivées en grand ; mais il est intéressant d'en faire des semis en pépinière, pour les répandre ensuite, par la plantation, dans les forêts.

Les fruits se cueillent à l'arrière-saison ; on les sème en rigoles, en évitant de trop les rapprocher, et on les recouvre de bonne terre bien émiettée. Les semences de sorbier demandent à être enterrées de 6 à 8 millimètres seulement ; celles de micocoulier de 10 à 15 millimètres, et les alises de 3 à 4 centimètres. Ces deux dernières graines ne lèvent, en général, que le second printemps après avoir été semées, à moins que, par des arrosements fréquents, on ne hâte leur germination.

Le micocoulier, ainsi que nous l'avons dit plus haut [246], redoute les froids dans ses premières années, et a besoin, dans le Nord et dans l'Est de la France, d'être recouvert de paille, de feuilles mortes ou de mousse pendant l'hiver.

Lorsque les plants de ces trois essences ont deux ans à peu près, on leur fait subir une première transplantation en pépinière, afin de favoriser le développement de leurs racines ; à cet effet, on les espace de 22 à 33 centimètres.

Parvenus à 66 centimètres ou à 1 mètre de haut, on les plante alors dans les lieux pour lesquels on les destine.

#### ARTICLE XI.

##### Semis de l'aune.

**743. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — On cueille les petits cônes à la main, dès qu'ils commencent à brunir ; il faut se hâter, car la semence se dissémine très-promptement. Cette récolte peut aussi se faire, comme celle des semences de bouleau [733], en coupant les branches qui portent graine sur les arbres destinés à être prochainement abattus ; nous avons indiqué les avantages de ce procédé.

Pour obtenir la graine, il suffit d'étendre les cônes sur un plancher bien aéré et de les remuer souvent ; les écailles s'entr'ouvrent peu à peu et la semence s'échappe. Mais si l'on voulait semer dès l'automne, il faudrait exposer les cônes à une chaleur tempérée, afin de les faire ouvrir plus vite. Pour séparer la graine d'avec les cônes, on se sert du crible.

La semence d'aune ne se conserve que de l'automne au printemps. On la met ordinairement en tas sur un grenier ; on peut aussi la plonger dans l'eau.

**744. EXAMEN DE LA GRAINE.** — La semence d'aune doit présenter à peu près les mêmes caractères que

celle d'orme ou de bouleau. Ouverte et écrasée sur l'ongle, l'amande doit être farineuse, légèrement humide, et dégager une odeur fraîche et agréable. La couleur de la graine est brun-marron.

Un litre de cette semence, lorsqu'elle est de bonne qualité, pèse de 320 à 340 grammes.

745. EXÉCUTION DU SEMIS. — Les sols humides, aquatiques, ou même marécageux, dans lesquels l'aune prospère plus particulièrement, offrent des difficultés pour le semis. La grande quantité d'herbes dans les premiers, une crue d'eau dans les autres, s'opposent souvent, soit à la germination de la graine, soit au développement du jeune plant. Aussi a-t-on plus généralement recours à la plantation pour établir une aunaie [691]. Cependant, comme les inconvénients que nous venons de signaler ne se présentent pas toujours, on pourra aussi, dans certains cas, employer la voie du semis.

Le labour en plein pourra être pratiqué, lorsque le sol le permettra et qu'on n'aura pas d'ailleurs besoin d'épargner la graine ; toutefois, le labour partiel sera généralement préférable. La principale précaution à prendre, pour préparer le terrain, consiste à le remuer le moins possible, tout en le débarrassant de la mauvaise herbe. Souvent il sera très-avantageux d'écobuer, et, dès lors, il suffira de gratter la terre, soit à la herse, si l'on veut semer en plein ; soit avec le râteau en fer, s'il s'agit de cultiver par bandes ou par pots. Dans certains terrains, on pourra



même se contenter de faire parcourir des bêtes à cornes ou des moutons. Il n'est pas rare en effet de voir, dans les prairies, des semis naturels d'aune très-bien réussis dans les pas des bestiaux ou dans les rigoles d'irrigation.

La semence ne doit pour ainsi dire pas être enterrée. Dans les semis en plein, on pourra se contenter de passer le rouleau pour la raffermir contre la terre, à moins qu'on ne redoute les dégâts des oiseaux, auquel cas il faudrait employer le fagot d'épines. Dans les semis partiels on se servira, le plus légèrement possible, du râteau de bois. Semée en automne, qui est la saison la plus favorable, la graine lève au mois d'avril suivant ; semée au printemps, elle produit des plants au bout de cinq ou six semaines.

Pour un semis en plein, il faut, par hectare, de 10 à 12 kilogrammes de semences d'aune ; pour le semis partiel 6 à 8 kilogrammes suffisent.

#### ARTICLE XII.

##### Semis du sapin.

746. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — On cueille les cônes à la main, dès la fin de septembre ou le commencement d'octobre. Il suffit de les étendre sur un grenier et de les remuer de temps en temps au râteau, pour faire tomber les écailles et les graines ;

on sépare ensuite les unes d'avec les autres au moyen du crible.

Si l'on veut dépouiller la semence de l'aile dont elle est garnie, il faut la frotter entre les mains ou dans un sac seulement rempli au quart. Quoi qu'en fasse, on ne pourra que briser une partie de l'aile ; il est impossible de l'enlever entièrement, parce qu'elle est très-adhérente.

La graine de sapin ne se conserve guère au delà de 18 mois ; si donc on ne l'emploie pas au printemps qui suit sa maturité, il faut, au plus tard, la semer un an après. Le meilleur moyen de conservation est de la mettre en lieu sec, à l'abri du froid, et de l'entasser le moins possible. D'abord il faut avoir soin de la retourner souvent et ensuite seulement de temps à autre, jusqu'au moment de l'employer.

747. EXAMEN DE LA GRAINE. — En ouvrant les petites amandes du sapin, on doit les trouver pleines, fraîches et d'une couleur blanchâtre ; elles doivent dégager une odeur prononcée de térébenthine, et le germe doit être vert. La couleur extérieure est brune.

Un litre de cette semence, munie de son aile, pèse ordinairement de 200 à 215 grammes ; lorsque la graine est désailée, le poids de la même capacité est de 265 à 275 grammes.

748. EXÉCUTION DU SEMIS. — Tout ce que nous avons dit plus haut [719] sur les procédés à employer pour semer le hêtre, et sur les difficultés que

cette opération présente, s'applique entièrement au semis du sapin, à cause de l'extrême délicatesse du jeune plant. Le mode indiqué par Cotta, pour semer le hêtre sans abri [720], n'a encore réussi qu'en petit pour le sapin, et la plantation ne peut guère suppléer au semis ; car cette essence résineuse, surtout en terrain découvert et aux expositions chaudes, est d'une reprise fort difficile. C'est principalement pour remettre en état des parties de forêts ruinées, couvertes de bois blancs, de morts-bois ou de broussailles quelconques, que l'on peut employer le semis du sapin (1). Comme le hêtre, dans ce cas, on sèmera le sapin par places, à l'ombre de ces broussailles ; ou même on repiquera la graine, si elle est rare, mais en ayant soin de ne remuer la terre que le moins possible (2).

La semence doit être recouverte, avec le râteau, d'une épaisseur de 6 à 9 millimètres.

Il est difficile d'indiquer la quantité de semence

---

(1) Toutes les fois qu'on pourra abriter les semis de sapin, de manière à préserver les jeunes plants des gelées tardives du printemps, on fera bien de répandre la graine dans l'automne même de sa maturité. Il est certain qu'une quantité notable de semences, quelques précautions que l'on prenne pour la conserver, perd sa faculté germinative dès le premier hiver.

(2) Pour repiquer des graines légères, telles que celles du sapin, ou pour les semer, par places, sous des bois blancs ou sous des broussailles, l'instrument le plus commode est la *houe-râteau* dont nous donnons le dessin à la fin du volume (voy. fig. 3). Les dimensions à lui donner peuvent varier selon la nature des terrains dans lesquels elle doit fonctionner.

nécessaire, par hectare, pour un semis fait de la sorte.

En général, il faut semer abondamment, car la graine n'est pas toujours de très-bonne qualité, surtout lorsqu'elle a été conservée pendant quelque temps ; et d'ailleurs les jeunes plants, fort tendres, ont plusieurs chances à courir. Pour un semis par bandes ou par pots, on peut employer de 40 à 45 kilogrammes de semence ailée, et de 36 à 40 kilogrammes de semence désailée, par hectare.

Ordinairement on sème depuis la fin de l'hiver jusque vers la fin du mois de mai, selon que les gelées printanières sont plus ou moins à craindre. Dans ce cas, les jeunes plants paraissent au bout de quatre à six semaines.

#### ARTICLE XIII.

##### Semis de l'épicéa.

749. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — La récolte des cônes d'épicéa peut avoir lieu depuis le mois de novembre jusqu'au mois de mars. Quand on doit faire de grands approvisionnements en semences, il faut s'y prendre aussitôt après la maturité [287] ; dans le cas contraire, il est préférable de ne cueillir les cônes qu'après les froids, parce que plus on rapproche cette opération de l'époque de la dissémination naturelle, plus on extrait ensuite la graine avec facilité.

L'extraction des graines a lieu, soit à l'aide de la chaleur artificielle d'un fourneau, soit à l'aide de la chaleur du soleil. Quoique ce dernier moyen mérite d'être préféré, en ce sens qu'on en obtient généralement des graines d'une qualité supérieure, le premier est cependant le plus employé, parce qu'il est beaucoup plus expéditif, et qu'il permet mieux de pourvoir à des approvisionnements considérables.

Hartig décrit les appareils à établir pour l'un et l'autre mode ; nous donnons ci-après ces descriptions telles qu'elles sont traduites dans le *Dictionnaire des Forêts* de Baudrillard :

« 1<sup>o</sup> On se sert d'une chambre dans la partie inférieure d'un bâtiment en maçonnerie ; s'il est possible, on place dans cette chambre un ou plusieurs poêles pourvus de grils, afin de pouvoir les échauffer avec les cônes vides ; ou bien on y établit circulairement des canaux de chaleur, comme dans une serre chaude, afin que le local puisse être échauffé dans toutes ses parties à un assez haut degré de température. Dans cette étuve, on fait construire, contre les murs et dans le milieu de la pièce, des échafaudages sur lesquels on puisse placer des claies en bois ou en fil de fer de 1 mètre 66 centimètres à 2 mètres de long sur 82 centimètres de large, et en former des étages de 15 centimètres environ d'intervalle. Sous la dernière rangée de claies, on fait pratiquer des tiroirs pour recevoir la graine. Ces premières disposi-

» tions prises, on charge les claies de cônes et on  
 » chauffe l'étuve de manière qu'un homme en puisse  
 » difficilement supporter la chaleur (20 à 25 degrés  
 » Réaumur) (1) ; on entretient cette température  
 » jusqu'à ce que les cônes se soient ouverts. Alors  
 » on les remue fortement sur toutes les claies, en  
 » commençant par les étages supérieurs, de manière  
 » que les semences tombent d'étage en étage, jus-  
 » qu'aux tiroirs placés sous les claies inférieures (2).

» Lorsque tous les cônes sont ouverts aussi com-  
 » plètement que possible, on les retire et l'on cher-  
 » che à obtenir encore la semence qui a pu y rester.  
 » À cet effet, on les place dans un vaisseau dont la  
 » disposition est semblable à celle d'une baratte à  
 » battre le beurre. Dans ce vaisseau, qui doit avoir  
 » le fond à claire-voie serrée, afin que les semences  
 » seules puissent y passer et être reçues dans un vase  
 » placé au-dessous, on agite fortement les cônes jus-  
 » qu'à ce qu'ils soient totalement dépouillés de grai-  
 » nes. On peut alors employer les cônes à chauffer  
 » les fourneaux.

» 2<sup>e</sup> Pour employer la chaleur du soleil, on éta-

(1) Cotta dit que la température peut s'élever jusqu'à 30 et même 35° Réaumur, sans que la faculté germinative de la graine ait à en souffrir.

(2) Pour plus de facilité on a rendu les claies mobiles, en les faisant glisser sur roulettes dans deux coulisses. De cette manière en poussant et tirant la claie, on agit aisément tous les cônes qui s'y trouvent.

» blit des échafaudages contre le mur d'un bâtiment  
» exposé au midi. On y place des claies à une telle  
» distance les unes des autres, que le soleil puisse  
» donner sur les rangées les plus reculées et sur les  
» inférieures. Sous la dernière claie se trouve un  
» tiroir dont le fond est en toile grossière, afin que,  
» si la pluie vient à y tomber, elle la traverse faci-  
» lement et que les graines puissent sécher. L'appa-  
» reil entier est recouvert d'un petit toit dont la pente  
» est dirigée vers le Nord.

» Lorsqu'il fait un beau soleil et une chaleur forte,  
» on remue les cônes en commençant par les claies  
» des étages supérieurs et en continuant jusqu'en  
» bas ; on rassemble alors les graines tombées dans  
» le tiroir. Enfin, quand on juge que les cônes se  
» sont ouverts autant que possible, on les enlève, et  
» on les place dans l'espèce de baratte dont nous  
» avons parlé, pour en tirer les semences qui pour-  
» raient y être restées. »

L'appareil décrit en dernier a été perfectionné en pratiquant sur chaque claie un couvercle mobile, qu'on ferme pendant la nuit et quand il pleut, et que l'on ouvre lorsqu'il fait beau, plus ou moins, suivant la hauteur du soleil. Afin que ce couvercle renvoie mieux les rayons calorifiques sur les cônes, on en peint la face inférieure d'une couleur blanche au vernis.

L'extraction des semences par la chaleur artificielle a lieu encore, d'après un autre système, dans

des bâtiments construits exclusivement pour cet objet. On trouvera la description d'un établissement de ce genre, avec des détails intéressants sur les manipulations auxquelles donnent lieu l'extraction, le désailement et la conservation des graines résineuses, dans les *Annales forestières*, tome II, année 1843, page 505. Nous renvoyons le lecteur à cet article qui est de M. Rich, Sous-Inspecteur des forêts et gérant de la sécherie de graines forestières que l'Administration des forêts a établie à Haguenau (Bas-Rhin).

Lorsqu'on veut désailer les graines d'épicéa, on les humecte, et, après les avoir mises dans un sac qu'on ne remplit qu'au quart, on les frotte fortement jusqu'à ce que les ailes s'en détachent (1). Ensuite, après les avoir étendues dans un lieu très-aéré, afin de hâter leur dessiccation, on les nettoie entièrement au moyen du van.

Le désailement de la graine est avantageux parce qu'il en rend le transport plus facile, en lui faisant occuper un moindre volume et en diminuant son poids ; en second lieu la semence désailée se sème et se recouvre mieux, et l'on ne risque pas autant de la voir dispersée par les vents. Mais, en général, les graines qui ont subi cette opération, surtout quand

---

(1) On peut éviter d'humecter la graine (ce qui vaut toujours mieux) en étendant les sacs, remplis comme il est dit, sur l'aire d'une grange et les frappant avec des fléaux à battre le grain.



on se les procure par le commerce, se conservent moins bien que celles qui sont munies de leurs ailes. Dans les établissements (principalement dans ceux d'Allemagne) où il se prépare de grandes quantités de semence pour la vente, on met quelquefois la graine en tas, après l'avoir bien humectée, et on la laisse ainsi jusqu'à ce que, en y enfonçant la main, on sente une légère chaleur; c'est alors que les ailes s'en détachent avec le plus de facilité. On conçoit aisément qu'un tel procédé prédispose les graines à la germination, et que, si le semis est retardé, il puisse s'en trouver un grand nombre qui perdent leur faculté germinative.

La graine d'épicéa peut, rigoureusement, se conserver trois ou quatre ans, en lui donnant les mêmes soins qu'à celle du sapin.

750. EXAMEN DE LA GRAINE. — La graine d'épicéa de bonne qualité, comme celle de sapin, est ferme et bien remplie; son odeur, en l'ouvrant, est fraîche, résineuse, et, écrasée sur l'ongle, la petite amande y laisse une substance grasse, d'une odeur résineuse. La couleur de cette graine est brun rougeâtre.

Un litre de semence d'épicéa ailes doit peser de 125 à 140 grammes; désailée, cette graine pèse, par litre, de 400 à 430 grammes.

751. EXÉCUTION DU SEMIS. — Le labour par bandes alternées ou par pots convient, en général, au semis d'épicéa comme au semis de sapin. Quoique le

jeune plant ne soit pas aussi délicat que celui de cette dernière essence, il a besoin, cependant, surtout aux expositions chaudes, de quelque ombrage ; le couvert au contraire lui est très-défavorable. Quand le terrain se trouvera garni de myrtilles, de bruyères, etc., il suffira de les conserver dans les bandes ou dans les places qu'on laisse en friche ; dans le cas contraire, c'est-à-dire, si le terrain était entièrement nu, il faudrait mêler une demi-semaille d'avoine ou d'orge à la graine.

Le jeune plant, restant très-petit dans les premières années, a souvent beaucoup à souffrir des herbes qui envahissent les semis. Quand on aura à combattre cet inconvénient, on devra d'abord augmenter la largeur des bandes ou des pots et ensuite faire enlever les herbes avant l'automne, soit en les arrachant, soit en les fauchant, toutes les fois qu'on le pourra sans trop de frais. Parfois la conservation du semis est à ce prix.

La graine n'a besoin d'être enterrée que de 4 à 6 millimètres ; on peut même se contenter de la mêler à la terre avec un râteau en bois. Semée au printemps, qui est la saison préférable, elle lève au bout de cinq ou six semaines.

Pour le semis partiel, 13 à 15 kilogrammes de semences ailées, et 10 à 12 kilogrammes de semences désaillées, suffiront par hectare. Pour un semis en plein, il faudrait ajouter moitié en sus.

## ARTICLE XIV.

## Semis du pin sylvestre.

**752. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — Ce qui a été dit de la récolte des cônes d'épicéa s'applique entièrement à la récolte des cônes de pin sylvestre.

L'extraction des semences se fait à l'aide des appareils qui ont été décrits dans l'article précédent ; mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on a aussi construit des bâtiments exclusivement destinés à cet objet, auxquels on a donné le nom de sécheries de graines forestières. L'administration des forêts possède, dans la forêt de Haguenau (Bas-Rhin), un établissement de ce genre qui lui fournit tous les ans les semences de pin qu'elle fait répandre dans les forêts de l'Etat.

On se sert plus particulièrement, pour la préparation des graines de pin sylvestre, de sécheries par la chaleur artificielle dont nous avons parlé plus haut, en renvoyant, pour la description d'un tel établissement, aux *Annales forestières*. Nous renouvelons ici ce même renvoi.

Le désailement de la graine de pin a lieu tout à fait comme nous l'avons expliqué pour la graine d'épicéa.

La semence de pin sylvestre peut aussi se con-

server pendant trois et quatre ans ; mais, dans ce cas, il ne faut pas la désaïler. Elle se conserverait encore plus sûrement si on la laissait enfermée dans les cônes, et si on ne récoltait ceux-ci qu'à la fin de l'hiver.

**753. EXAMEN DE LA GRAINE.** — Les caractères qui indiquent la bonne qualité des semences sont absolument les mêmes pour le pin sylvestre que pour l'épicéa. Les semences de pin sont noires ou blanches ; parmi ces dernières il s'en trouve un plus grand nombre de vaines que parmi les autres. On fera donc bien, lorsqu'on achètera des graines, et que les blanches seront en majorité, de les éprouver avec d'autant plus de soin.

La semence de pin sylvestre doit peser, par litre, de 120 à 140 grammes, si elle est ailée ; et de 440 à 500 grammes, si elle est dépouillée de ses ailes.

**754. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Le labour à donner au terrain pour le semis du pin sylvestre est le même que celui qui convient pour le semis de l'épicéa, sauf qu'il n'est pas nécessaire de ménager autant l'abri. Dans les pentes méridionales couvertes de bruyères, où souvent on sème le pin, il est essentiel de prendre une précaution particulière, en préparant le sol ; c'est de creuser les bandes ou les trous jusqu'à la couche de terre inférieure au terrain noir qui se trouve à la surface, et que l'on nomme communément terre de bruyère. En répandant la graine dans ce terreau sans aucune consistance, impropre à re-

tenir l'humidité, et qui, par sa couleur, s'échauffe à un haut degré, les semis manquent presque toujours. Souvent d'ailleurs la terre de bruyère contient un principe acide qui fait avorter complètement la germination (1).

Comme les graines d'épicéa, celles du pin sylvestre ne doivent être recouvertes que de 4 à 6 millimètres; il suffit même de les mêler à la terre avec le râteau. Ordinairement les jeunes plants paraissent au bout de quatre à six semaines, lorsque le semis a été fait au printemps, ainsi que cela est à conseiller; mais souvent aussi, quand les graines ont été trop recouvertes ou trop chauffées dans l'extraction, elles ne germent que la seconde année.

Dans quelques parties de l'Allemagne, où les semences de pin sont très-abondantes, on est dans l'usage de semer tout simplement les cônes dans les bandes ou dans les trous préparés à cet effet; puis, dès qu'au printemps la chaleur commence à agir sur les écailles, on remue fortement les cônes avec un

---

(1) Ce principe est l'acide acétique. On a proposé, pour le neutraliser, d'employer l'écobuage qui par les cendres qu'il produit, atteindrait ce but. Ce procédé peut-être suffisant pour certaines plantes qui exigent peu d'humidité et pour la culture desquelles on retourne entièrement la terre, de manière à mêler la couche de terreau à l'élément minéralogique du sol. Mais, pour les semis d'essences forestières, il ne saurait en être de même; car, tout en enlevant au terreau un principe nuisible, les cendres ajouteraient d'ailleurs à son trop de légèreté et à son défaut d'hygroscopicité [702].

râteau, afin d'en faire tomber les graines et de distribuer celles-ci le plus également possible. Ce procédé a d'abord l'avantage d'économiser les frais d'extraction et de désaillement des semences ; en second lieu, celles-ci sont généralement de meilleure qualité ; et enfin, les cônes qui recouvrent le sol peuvent donner quelque abri aux plants naissants. Mais, d'un autre côté, on perd une partie des graines, parce qu'on ne réussit jamais à les faire sortir toutes des cônes ; elles ne sont pas aussi également réparties sur le terrain, et, pour le transport, les cônes sont plus encombrants.

Les quantités de semences de pin sylvestre à employer, par hectare, pour un semis partiel sont :

Semences ailées..... 12 à 14 kilog.

Semences désailées... 9 à 11 id.

Cônes..... 18 à 20 hectolitres.

#### ARTICLE XV.

##### Semis du pin maritime.

755. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — Ce que nous avons dit, sous ce rapport, de l'épicéa et surtout du pin sylvestre, s'applique entièrement au pin maritime.

756. EXAMEN DE LA GRAINE. — La graine de ce pin est beaucoup plus grosse que celle du précédent ; sa couleur est grise ou brun mat sur une face, et d'un

noir luisant sur l'autre ; elle doit d'ailleurs présenter les mêmes caractères que la graine du pin sylvestre.

757. EXÉCUTION DU SEMIS. — Les différents modes de labour que nous connaissons sont tous applicables au pin maritime. On se sert assez généralement de la charrue pour la façon à donner à la terre, et de la herse pour recouvrir le semis. — La graine, d'ailleurs, étant plus grosse, a besoin d'être enterrée davantage.

La quantité de semences à employer par hectare varie. — En Sologne, par exemple (voir le rapport déjà cité de M. A. Brongniart), on emploie pour un semis en plein, depuis 10 jusqu'à 20 kil., sans doute, selon la bonté de la graine et aussi selon que l'on a en vue la création d'un bois plus touffu. Nous pensons que 15 à 18 kil. de semence ailée et 12 à 14 kil. de semence désailée doivent suffire, attendu que la graine du pin maritime est généralement de très-bonne qualité. Pour les semis partiels, il y aurait lieu de diminuer ces quantités d'un tiers.

La culture du pin maritime a pris, dans plusieurs contrées de l'ouest et du centre de la France (notamment dans le Maine et la Sologne), une très-grande extension, par suite des produits particuliers que fournit cet arbre [319]. Mais c'est surtout dans les Landes et dans la Gironde qu'elle acquiert une importance de premier ordre. On sait que, dans ces départements, s'étend sur le littoral de l'Océan, depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à celle de

l'Adour, une région, appelée les *dunes du golfe de Gascogne*, qui occupe un espace d'environ 240 kil. de long sur une largeur moyenne de 5 kilom. Le sol de cette région, exclusivement composé d'un sable quartzeux très-ténu que les marées de l'Océan déposent sur la plage, devient tellement mobile, dès qu'il se dessèche, que les vents le soulèvent et l'emportent au loin. Le plus léger obstacle, tel qu'un petit accident de terrain, un arbre, quelques touffes de genêt ou de gourbet (*arundo arenaria*), suffit souvent pour arrêter les sables dans leur marche ; ils s'accumulent alors d'autant plus vite et forment des amas d'autant plus forts que les dépôts laissés par les lames sont plus considérables, et que les vents soufflent plus longtemps dans la même direction. Telle est la formation des *dunes*, dont la hauteur et la forme diffèrent nécessairement en raison des conditions sous lesquelles elles se sont élevées ; on en rencontre qui ont de 20 à 30 et jusqu'à 50 et même 100 mètres de haut.

C'est par un système mixte de travaux de clayonnage et de reboisement en pin maritime que l'on est parvenu à arrêter, partout à peu près, la marche des sables qui menaçait les communes voisines et leur territoire, et c'est une des gloires du corps des ponts et chaussées à qui le Gouvernement a confié cette grande et belle œuvre, d'avoir pu la conduire à bonne fin et d'avoir successivement amélioré et tellement simplifié les procédés employés, qu'ils sont



aujourd'hui à la portée de toutes les personnes qui peuvent avoir à s'occuper du boisement de sables mouvants.

Mais si intéressante que soit pour le forestier, comme pour l'ingénieur, l'étude approfondie de ces procédés, nous sortirions du cadre que nous nous sommes tracé pour la rédaction de ce cours, si nous entreprenions de les exposer ici avec détail. Nous renvoyons donc le lecteur, curieux d'étudier cette question, aux principaux écrits où elle est traitée, savoir :

1. *Mémoire sur les dunes*, par Brémontier, inspecteur général des ponts et chaussées (réimprimé dans les *Annales des ponts et chaussées*, année 1833, page 145).
2. *Notice sur la fixation des dunes*, par M. Lefort, ingénieur des ponts et chaussées (*Annales des ponts et chaussées*, année 1831, page 320).
3. *Mémoires sur les dunes du golfe de Gascogne*, par M. Laval, ingénieur en chef, directeur des ponts et chaussées (*Annales des ponts et chaussées*, année 1847, page 218) (1).
4. *Notice sur le pin maritime*, par M. Lorentz, administrateur des forêts (*Annales forestières*, année 1842, page 57).

---

(1) Ce mémoire fort remarquable, quoique moins étendu que celui de l'illustre Brémontier, fait parfaitement connaître la formation des dunes et les procédés employés pour les fixer, d'après les perfectionnements les plus récents.

## ARTICLE XVI.

Semis du pin laricio et du pin d'Alep.

**758. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — Les règles données dans les deux précédents articles, concernant cet objet, sont applicables aux deux pins dont il s'agit.

**759. EXAMEN DE LA GRAINE.** — Les graines du laricio et du pin d'Alep sont à peu près d'égale grosseur et tiennent le milieu, sous ce rapport, entre le pin maritime et le pin sylvestre. La première a une couleur jaune terne et la seconde est d'une nuance brun foncé. — Ces semences doivent présenter les mêmes caractères que les précédentes.

**760. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Les procédés de semis de ces deux essences sont les mêmes que ceux que nous avons indiqués pour l'épicéa et le pin sylvestre, sauf à enterrer la graine un peu plus, attendu sa grosseur. — La quantité de semence à employer par hectare ne nous est pas positivement connue par

---

(1) Si nous passons sous silence le semis des pins à crochets et d'Autriche, ce n'est pas (ainsi qu'on a pu s'en convaincre par la description que nous avons donnée de ces deux arbres) que nous en méconnaissions l'importance, mais bien parce que nous ne possédons aucune donnée certaine sur les particularités que pourrait présenter l'opération. Il est très-probable, au surplus, que ce que nous avons dit au sujet du semis du pin sylvestre pourra s'appliquer, d'une manière générale, au semis des deux essences dont il s'agit.

l'expérience; mais on peut à cet égard juger par analogie et en tenant compte de la bonté de la graine que l'on est à même de se procurer.

Il est probable que pour un semis partiel, il suffirait d'employer :

Semences ailées. . . . 14 à 16 kilog.

Semences désailées . 11 à 13 *id.*

#### ARTICLE XVII.

Semis du pin pinier et du pin cembro.

**761. RÉCOLTE ET CONSERVATION.** — Les cônes de ces deux pins se cueillent à la main (1). Pour les faire ouvrir, il suffit de les exposer au soleil ou de les placer dans un appartement tempéré; les amandes s'en échappent facilement.

La faculté germinative de ces graines ne se conserve guère que de l'automne au printemps; elles sont très-exposées à rancir. On peut les étendre, comme les autres graines résineuses, sur des planchers secs et aérés. Si l'on voulait les garder pendant plusieurs années, il faudrait les laisser renfer-

---

(1) Dans les Alpes, on tend quelquefois des toiles sous les pins cembro pour profiter de la dissémination naturelle; ces toiles demeurent à terre pendant tout l'automne et jusqu'à l'entrée de l'hiver, car la dissémination se fait très-lentement.

mées dans les cônes et, pour cela, garantir ceux-ci de la chaleur.

762. EXAMEN DE LA GRAINE. — En cassant le noyau de ces graines on doit le trouver plein ; l'amande doit être blanche, d'un goût et d'une odeur agréables. Si elle sent le rance, la graine est gâtée.

Un litre de semence de cembro pèse de 380 à 400 grammes.

763. EXÉCUTION DU SEMIS. — Le pin pinier et le pin cembro sont trop rares pour en faire des semis en grand. Ordinairement on repique les amandes en pépinière ou en pots, dans une terre de bonne qualité ; on les recouvre de 9 à 13 millimètres et on les arrose souvent. Lorsque les plants ont un ou deux ans, on les transplante une première fois, et ce n'est que trois ou quatre ans plus tard qu'on les met définitivement en place.

Quand le repiquement de la graine se fait en automne, les plants paraissent au printemps ; lorsqu'on sème dans cette dernière saison, ils lèvent au bout de cinq ou six semaines. Souvent, néanmoins, les amandes ne germent que la seconde année.

#### ARTICLE XVIII.

Semis du pin du lord Weymouth.

764. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — Après les avoir cueillis, il suffit d'étendre les cônes dans un lieu sec

et aéré et de les retourner souvent. Les écailles s'entr'ouvrent sans le secours de la chaleur et laissent échapper la graine.

On n'a fait encore que peu d'essais sur la faculté qu'a cette semence de se conserver; aussi est-il à conseiller de l'employer dès le printemps qui suit la maturité. Les moyens de conservation sont les mêmes que pour les autres graines résineuses.

765. EXAMEN DE LA GRAINE. — Ces graines doivent être d'un brun clair et présenter du reste les mêmes caractères que celle du pin sylvestre.

766. EXÉCUTION DU SEMIS. — Ce que nous avons dit à cet égard, dans l'article précédent, du pin pinier et du cembro, s'applique entièrement au pin du Nord. Les graines n'ont pas besoin d'être enterrées à plus de 6 ou 8 millimètres.

#### ARTICLE XIX.

##### Semis du mélèze.

767. RÉCOLTE ET CONSERVATION. — La récolte des cônes, l'extraction des graines et leur désailement se font de la manière qui a été indiquée pour le pin sylvestre et l'épicéa. Lorsqu'on le pourra, il sera préférable d'attendre le printemps pour la récolte.

Dans l'opération de l'extraction, il est essentiel de ne donner qu'une chaleur très-moderée, ce qui nécessite un plus long séjour des cônes sur les claies.

Une chaleur trop élevée fait suinter la résine à travers les écailles, et les rendant au point qu'elles ne peuvent plus s'ouvrir.

Lorsqu'on donne à la semence de mélèze les soins que nous avons déjà indiqués pour les autres graines résineuses, elle peut se conserver plusieurs années, moins cependant que les semences de pin sylvestre et d'épicéa. Aussi est-il préférable de ne pas tarder à l'employer.

**768. EXAMEN DE LA GRAINE.** — Mêmes caractères que la graine du pin sylvestre [753]. La semence de mélèze doit être jaunâtre et peser, par litre, 160 à 175 grammes si elle est ailée, et 500 à 550 grammes si elle est dépouillée de ses ailes.

**769. EXÉCUTION DU SEMIS.** — Les règles que nous avons données à cet égard pour le semis d'épicéa, sont tout à fait applicables au semis du mélèze. Toutefois, comme la graine de cette dernière essence est en général fort chère, et qu'il est assez difficile de s'en procurer des quantités considérables, on préfère, la plupart du temps, semer d'abord en pépinière, et employer ensuite la plantation pour les repeuplements à exécuter en forêt. Souvent aussi on mélange la graine de mélèze avec d'autres graines de bois résineux ou feuillus, ce qui est d'autant plus à propos que le mélange, ainsi qu'on l'a vu plus haut [533], convient particulièrement à cette essence. La semence de mélèze est ordinairement d'assez mauvaise qualité; si l'on voulait en faire un semis par bandes ou par trous,

il ne faudrait pas l'épargner ; 16 à 18 kil. de graine ailée, et 12 à 15 kil. de graine sans aile, seraient nécessaires, par hectare. Semée au printemps, cette graine lève au bout de quatre ou six semaines.

#### ARTICLE XX.

##### Semis du cèdre du Liban.

770. Nous avons fait connaître, dans le premier livre de ce cours [386], l'époque de la dissémination naturelle du cèdre. En cueillant les cônes à la fin d'août ou de septembre (selon que la température reste sèche ou devient pluvieuse), on pourra les conserver à volonté jusqu'au moment où l'on se proposera de semer, car la graine, renfermée dans les cônes, se maintient en parfait état pendant des années. — Pour extraire la semence, il suffit de laisser les cônes séjourner dans l'eau pendant 24 ou 36 heures. Les écailles se détachent alors de leur axe avec une grande facilité, et il n'y a plus qu'à en séparer la graine à l'aide d'un crible.

La semence se trouvant fortement humectée par le procédé d'extraction, il est à conseiller de la semer immédiatement. Toutefois, si l'on voulait différer le semis de quelques semaines, il faudrait faire sécher la graine, au soleil autant que possible, et l'étendre ensuite dans un lieu bien aéré en la faisant retourner fréquemment.

Les semis de cèdre ne se font qu'en pépinière ou en pots ; la dernière manière est préférable, parce qu'elle permet de rentrer les jeunes plants en hiver [387]. Après leur avoir fait subir une première transplantation, on pourra les placer définitivement en forêt. Si, dans ce dernier lieu, on n'a pas la facilité de les garantir du froid, il faudra attendre, pour les y planter, qu'ils aient atteint leur huitième année au moins [384].

## ARTICLE XXI.

## Des semis mélangés.

771. Les semis mélangés deviennent utiles dans différents cas :

- 1° Pour créer des forêts mélangées ;
- 2° Pour élever une essence sous l'abri d'une autre ou pour couvrir promptement le sol afin de l'empêcher de se détériorer ;
- 3° Pour économiser une semence très-chère ou rare.

772. Nous savons que les essences dont le mélange est avantageux sont celles qui ont une croissance sensiblement égale, qui supportent même révolution et même mode de traitement, et dont les racines puisent la nourriture à différentes profondeurs du sol.

Dans le troisième et dans le quatrième livre de ce cours, nous avons indiqué les essences qu'il con-



vient d'élever en mélange, soit pour la futaie, soit pour le taillis ; il suffira donc de consulter, pour cet objet, les parties précitées [487, 497, 498, 504, 513, 533 et 617].

773. La propriété la plus importante des essences destinées à en abriter d'autres dans leur jeunesse ou à couvrir le sol, est d'avoir une croissance très-rapide dès les premières années. Celles qui, dans ce but, conviennent le mieux, sont : parmi les bois feuillus, l'orme, le bouleau, les érables, les saules et les peupliers (1) ; parmi les bois résineux, le pin sylvestre, le pin maritime, le pin laricio, le pin noir et le pin d'Alep. Mais, en général, les graines résineuses sont d'un prix trop élevé pour être employées à un tel usage, tandis qu'on se procure à très-peu de frais, selon les localités, des graines de l'une ou de l'autre essence feuillue.

Ainsi que nous l'avons dit ailleurs [719], le genêt ou l'ajonc peut aussi être employé avec avantage.

Dès que l'essence supplémentaire a atteint son but, il convient de l'extraire. Dans les pays où le bois a de la valeur, le produit de cette extraction est souvent assez considérable pour faire rentrer le propriétaire, en très-grande partie, dans ses avances. Aussi cette considération seule peut-elle, dans beaucoup de cas, justifier le mélange des essences dans un semis.

---

(1) Ces deux dernières ne se multiplient d'ordinaire que par boutures.

774. Lorsque, pour économiser une graine rare ou chère, on la mélange avec une autre plus commune, la seule précaution à prendre, dans le choix de cette dernière, est que les deux essences aient une végétation et des exigences à peu près semblables : pendant les trente ou quarante premières années au moins, si c'est une futaie que l'on veut créer, et pendant une durée moindre, s'il ne s'agit que d'un taillis. En s'attachant ensuite, dans les éclaircies périodiques, à extraire l'essence supplémentaire, on réussira peu à peu à faire dominer entièrement la plus précieuse.

775. La manière d'exécuter des semis mélangés ne présente aucune particularité, si ce n'est que, après avoir déterminé le rapport du mélange, il faut semer et recouvrir d'abord la semence qui demande à être enterrée davantage. Si, au contraire, les deux graines ont, sous ce rapport, les mêmes exigences, on les mélange avant de les semer, et ensuite le semis se fait comme à l'ordinaire.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

---

### DES PLANTATIONS.

---

#### ARTICLE PREMIER.

Des qualités que doivent offrir les plants.

776. Tout plant, quel que soit son âge, doit, pour présenter les meilleures chances de reprise, avoir des racines fraîches, unies, qui ne soient ni rompues, ni écorchées, ni endommagées en aucune manière; plus les racines sont nombreuses, mieux la reprise est assurée.

Si c'est un plant de *haute tige* (1 mètre à 1 mètre 33 centimètres et au-dessus), il est nécessaire que sa grosseur soit proportionnée à sa hauteur, afin qu'il puisse se soutenir seul et résister aux intempéries; il faut en outre, qu'il soit bien droit, sans aucune blessure, que sa tête soit suffisamment développée, et qu'il ait d'ailleurs tous les signes d'une végétation vigoureuse. Si c'est un plant de *basse tige* (au-des-

sous de 1 mètre), sa forme est moins importante ; cependant il doit être droit et présenter surtout de belles racines, des pousses fortes et des bourgeons sains et bien formés.

777. Les plants reprennent d'autant plus facilement qu'ils sont plus jeunes ; aussi les hautes tiges ne sont-elles employées en sylviculture, que dans quelques cas d'exception où elles peuvent seules convenir : par exemple, dans des lieux exposés aux dégâts du pâturage ou des inondations, ou bien encore s'il s'agit, dans certains taillis composés, d'élever des sujets propres au balivage [598]. D'ordinaire, c'est toujours la plantation de basses tiges qui est préférée ; non-seulement parce qu'elle est, comme nous venons de le dire, d'une réussite plus assurée, mais encore parce qu'elle entraîne à bien moins de frais. Cette dernière considération, lorsqu'on fait des repeuplements en grand, est naturellement de beaucoup de poids.

En général, les hautes tiges ne sont propres à la transplantation que quand elles ont été élevées en pépinière ; pour les basses tiges, bien que celles que l'on produit en pépinière méritent de beaucoup la préférence, on peut cependant aussi les tirer des semis naturels ou artificiels qui existent souvent, soit dans la forêt même où il s'agit de planter, soit dans les forêts voisines. Si l'on prend un tel parti, il faut éviter de choisir des plants provenant d'endroits très-fourrés ou très-couverts ; dans les uns,

ils sont rabougris ou au moins très-déliçats et peu propres, par conséquent, à résister lorsqu'on les met en terrain découvert; dans les autres, ils manquent de racines et de branches, ce qui compromet également leur reprise.

L'âge le plus convenable pour la reprise des basses tiges varie d'ailleurs selon les essences. Ainsi, on peut planter avec avantage :

De 1 à 3 ans, les pins sylvestre, maritime et laricio, — l'épicéa et le mélèze, de même que les bouleaux, les aunes et les robiniers;

De 3 à 6 ans, les sapins, les pins du lord Weymouth, les châtaigniers, les ormes, les frênes et les érables;

De 4 à 8 ans, les chênes, les hêtres, les charmes, les fruitiers, etc.

Il est entendu que, pour être générales, ces règles n'ont rien d'absolu, et qu'elles doivent fréquemment se modifier d'après les circonstances locales.

Quand on a des plantations considérables à exécuter, la création d'une pépinière, loin d'être une dépense inutile, est, au contraire, une grande économie; c'est aussi le moyen le plus sûr d'obtenir du plant de bonne qualité.

#### ARTICLE II.

De la culture des plants en pépinière.

778. Il faut éviter d'établir les pépinières dans un terrain très-gras ou humide; les plants y prennent

une texture lâche, leurs racines y sont généralement mal conditionnées, et, lorsque, plus tard, on les transplante dans une terre moins fertile ou plus sèche, ils périssent souvent dès la première année, ou bien, ils sont longtemps avant de reprendre de la vigueur. Un terrain maigre et de mauvaise qualité convient moins encore pour une pépinière, parce qu'on n'y obtient que des brins languissants, dont tous les organes, et surtout les racines, sont faibles et d'une conformation vicieuse; transplantés, de tels sujets sont presque toujours victimes des circonstances plus ou moins défavorables qui sont la suite de la transplantation. C'est dans un terrain de fertilité et de compacité moyennes qu'on élèvera des plants vigoureux et qui, placés en forêt, s'accommoderont le mieux d'un sol quelconque.

Les éléments minéralogiques du terrain n'exercent qu'une très-faible influence sur la réussite des cultures d'une pépinière; les labours de diverses sortes, les arrosages, les amendements au besoin, y combattent et corrigent les défauts que peut présenter le sol. Seulement, quand on en aura le choix, on devra donner la préférence aux sols légers sur les terres fortes, parce que celles-ci, comme on le sait, se durcissent et se crevassent profondément par la sécheresse, et, sous l'influence de labours fréquents surtout, les jeunes plants y sont facilement soulevés et déracinés par les gelées d'hiver.

Autant que possible, on doit établir la pépinière

à proximité du terrain à replanter ; d'abord, afin que les plants s'habituent, dès leur naissance, au climat et au sol auxquels ils sont destinés ; en second lieu, parce qu'il y a économie sur les frais de transport. Toutefois, les grandes élévations, de même que les vallées profondes, doivent être évitées ; un terrain un peu abrité des grands vents, en plaine ou en pente douce, et où les plants soient le moins possible exposés aux gelées tardives du printemps, tel est l'emplacement le plus convenable. S'il se trouve, dans le voisinage, des eaux qui donnent la facilité d'arroser pendant les temps de sécheresse, ce sera un grand avantage.

779. Le terrain destiné à une pépinière, à moins qu'il ne soit tout à fait léger, doit recevoir un labour complet et profond, de manière à y détruire entièrement la mauvaise herbe et à rendre la terre parfaitement meuble.

Ce résultat obtenu, soit par de simples labours, soit par une ou plusieurs cultures de céréales ou de pommes de terre, on divise le terrain en planches ou plates-bandes, en le coupant par des chemins et par des sentiers perpendiculaires les uns aux autres ; enfin, si l'on a à redouter les dégâts du bétail ou du gibier, on le clôt de fossés, de palissades, de haies, etc.

Dans les plates-bandes dont il vient d'être parlé, et parallèlement aux sentiers qui les limitent, on ouvre des sillons ou petites rigoles, séparés entre eux par des intervalles de 20 à 30 centimètres, profonds

de 25 à 30 et d'une largeur de 20 à 25 centimètres, réduite au fond à 12 ou 15 centimètres environ (1). La terre qui provient de ce travail est répartie sur les intervalles demeurés libres. — L'opération terminée, on remplit les sillons d'un terreau provenant, mi-partie, de feuilles mortes et mi-partie de gazons décomposés et qu'il faut avoir soin, à cet effet, de préparer annuellement dans quelque place reculée de la pépinière (2). On tasse ensuite légèrement ce

---

(1) Voyez Charles Heyer, *Traité de sylviculture*.

(2) Pour faire son terreau, on choisit une place ombragée, abritée du midi, mais non recouverte ou surmontée, afin que les influences atmosphériques y aient un libre accès. — On forme, d'une part, un ou plusieurs tas de feuilles mortes, de fougères et autres plantes charnues récoltées avant la maturité de leurs semences; de l'autre, des tas semblables composés de gazons, de la mauvaise herbe provenant des binages de la pépinière, du nettoyage des chemins, etc. — Ces tas doivent être longs, assez étroits et d'une hauteur de 1 mètre à 1 mètre 30 environ. Deux fois par an, au printemps et en automne, on les retourne et, dans les temps de sécheresse prolongée, on les arrose. Les gazons sont d'ordinaire entièrement décomposés au bout d'un an, mais il faut 3 et 4 ans aux feuilles mortes pour être complètement réduites en terre. — Les feuilles de hêtre mélangées, par parties égales, à des feuilles de bois résineux, fournissent une des meilleures qualités de terreau. Pour hâter la pourriture assez lente de ce mélange, on fera bien d'y ajouter des feuilles qui se décomposent plus rapidement, telles que celles de frêne, érable, orme, saule, peuplier, aune, robinier, etc.

Lorsque les sillons d'une pépinière ont été, une première fois, préparés avec ce terreau, comme nous l'expliquons ci-dessus, il suffit d'y apporter chaque année une faible quantité de terreau neuf pour entretenir la fertilité du sol — En prévenant ainsi, par un procédé simple et peu coûteux, l'épuisement de la terre dans les pépinières, on évite la nécessité de les déplacer de temps à autre, à laquelle on ne saurait échapper autrement.



terreau, soit avec une batte ou simplement avec la main, de façon que les intervalles entre les sillons saillissent sur ceux-ci de 3 à 4 centimètres environ. Cette précaution devient très-utile lorsque, dans l'hiver qui suit la levée du semis, les jeunes plantules ont été soulevées par les gelées, et qu'une partie des radicelles se trouvent déchaussées, parce que, si tôt le dégel du printemps, il suffit de les recouvrir de quelques centimètres de terre pour assurer leur reprise.

780. Les semis en pépinière se font de préférence au printemps; il faut semer très-dru de manière que les graines se touchent, pour ainsi dire, et ne recouvrir celles-ci, même les semences lourdes, que d'une couche de terreau, tout juste suffisante pour empêcher que la pluie ne les mette à découvert. — On comprend que des semis aussi drus fournissent le plus grand nombre possible de plants, eu égard à la surface cultivée, et en second lieu, que la mauvaise herbe ne saurait les envahir. L'expérience prouve, d'ailleurs, que les plants qui en proviennent sont abondamment pourvus de racines, surtout de chevelu, et qu'ils ne s'affament point entre eux; même lorsqu'ils atteignent 40, 50 et jusqu'à 70 centimètres de hauteur. Lorsqu'on procède à leur extraction, les

---

L'intérêt qu'il y a, sous tous les rapports, à établir les pépinières à proximité des maisons de gardes et à les y maintenir, doit faire apprécier cette méthode de culture et lui mériter l'accueil des forestiers.

racines, quoique entrelacées, se démêlent et se séparent aisément ; mais un certain nombre de tiges ayant été dominées, surtout vers le milieu du sillon, sont demeurées faibles, et ont besoin de se fortifier avant de pouvoir être mises définitivement en place. A cet effet, on les repique dans des rigoles voisines, ou dans celles mêmes d'où elles proviennent, et on les y laisse jusqu'à ce qu'elles aient atteint les dimensions et la vigueur désirables.

Pour élever une essence qui, comme le chêne, par exemple, pousse un fort pivot dès les premières années, et diminuer l'inconvénient que cette racine présente lors de l'extraction ultérieure des plants, il suffit d'enfoncer, de chaque côté du sillon et obliquement vers le fond de celui-ci, le fer bien acéré d'une bêche, après quoi l'on referme, avec le pied, la section faite par l'instrument dans la terre (1). Le plant ne tarde pas à remplacer le pivot, ainsi retransché, par des racines obliques qui sont moins gênantes et plus utiles lors de la transplantation. Cette opération doit se faire au commencement de l'automne qui suit la levée des plants.

Un autre procédé, pour empêcher le trop grand développement du pivot, est celui que Duhamel indique sous le nom de *pratique de Bretagne* (2),

---

(1) Nous avons vu appliquer avec avantage ce procédé au hêtre qui, quoique traçant à un certain âge, pousse, dans les premières années, un pivot très-développé [128].

(2) Voyez Duhamel. *Des semis et plantations des arbres*, page 127.

et dont il conseille l'emploi. Il consiste à paver en pierres plates le fond des sillons dans lesquels on sème ; ces pierres, en arrêtant le pivot, forcent le plant à pousser des racines latérales.

781. Quand il s'agit d'élever en pépinière des plants de haute tige, on choisit, dans les sillons de semis, les sujets les plus vigoureux et les plus élancés, et on les transplante dans une ou plusieurs plate-bandes à ce destinées, en leur donnant un espacement en tout sens de 33 à 66 centimètres. Lors de cette transplantation, on pourra retrancher le pivot du plant, qui se reproduit souvent, même après avoir été supprimé une première fois, afin de favoriser le développement des racines latérales. On pourrait aussi, dans le même but, placer une ou plusieurs pierres plates au fond de chaque trou.

782. Les arrosements, ainsi que nous l'avons dit, seront très-utiles dans les temps de grande sécheresse ; mais, une fois commencés, il faut les continuer jusqu'à ce que la pluie survienne. Autrement il se forme, à la surface de la terre, une croûte qui nuit à la végétation, en empêchant l'air de parvenir aux racines. — Il est essentiel d'arroser assez abondamment pour détremper le sol jusqu'à la profondeur où plongent les racines les plus longues ; on conçoit que, sans cette précaution, la peine que l'on prendrait serait sans résultat.

De tous les modes d'arrosement, celui qui offrirait le plus d'avantages, sans présenter d'inconvé-

nient, serait l'irrigation, telle qu'on la pratique dans les prairies, en faisant, dans ce cas, servir comme saignées, les sentiers qui séparent les plates-bandes. Mais les pépinières forestières sont trop rarement placées dans des situations qui rendraient applicable un pareil système ; on ne peut donc en parler qu'à titre d'exception.

783. Il faut avoir un soin particulier de ne pas laisser prendre le dessus à la mauvaise herbe. Dans les sillons, il faut l'enlever à la main dès qu'elle paraît, et choisir autant que possible pour cette opération un temps frais. — Si le semis a réussi convenablement, ces sarclages ne seront nécessaires que la première année. — Les intervalles entre les sillons, ainsi que les chemins et sentiers, devront aussi être nettoyés au moins deux fois par an, au printemps et vers la fin de l'été, dès avant l'époque où mûrissent les graines des plantes nuisibles. Les parties de la pépinière occupées par les plants de haute tige devront recevoir chaque année deux binages.

#### ARTICLE III.

De la saison la plus convenable à la plantation.

784. On peut planter depuis le temps de la chute des feuilles jusqu'au moment où les boutons commencent à s'ouvrir ; mais comme, en hiver, la terre est ordinairement ou gelée ou trop molle, on dis-

tingue deux saisons pour planter : l'automne et le printemps.

Quand on plante en automne, les arbres, lors de l'extraction, souffrent moins de se trouver quelque temps hors de terre, parce que l'évaporation est moindre dans cette saison qu'en toute autre ; en second lieu, la terre, par l'humidité dont elle s'imbibé, et par les gelées, se tasse mieux autour des racines ; enfin, il paraît constant que, dans les hivers doux, les arbres poussent du chevelu ; d'où il suit que, dans certains cas, des sujets plantés en automne peuvent être pourvus, dès le printemps, de nouvelles racines (1). On peut donc, en général, considérer l'automne comme la meilleure saison pour les plantations à faire en grand ; cependant il existe aussi des cas où le printemps est préférable. Ainsi on doit choisir cette saison pour les essences qui peuvent avoir à souffrir des fortes gelées d'hiver, et, à cet égard, il faut nécessairement tenir compte du climat local ; elle est encore la plus convenable pour les bois résineux qui, généralement, reprennent moins bien quand ils sont plantés en automne (2). Enfin,

(1) Voyez Duhamel. *Des semis et plantations des arbres*, page 172.

(2) Dans les régions qu'habitent ces bois (au moins les plus importants et les plus répandus), les hivers sont rigoureux. Si l'on plante des sujets très-jeunes (de 1 à 3 ans), ce qui est à conseiller puisqu'on ne peut tailler les résineux [801], il arrive fréquemment que les fortes gelées d'hiver soulèvent les plants et les rejettent, pour ainsi dire, hors des trous. Si l'on plante des sujets plus âgés, on les voit souvent perdre toutes leurs

dans les terrains trop humides, la plantation du printemps mérite souvent la préférence.

## ARTICLE IV.

De l'espacement à donner aux plants.

785. Nos arbres forestiers, comme on le sait, prospèrent surtout lorsqu'ils croissent en massif ; c'est dans cet état qu'ils prennent les plus belles proportions et qu'ils fertilisent le sol, en lui conservant de la fraîcheur et en lui procurant de l'engrais. Il suit de là que, dans les plantations, il faudrait rapprocher assez les tiges, pour que, dès les premières années, le massif pût se former. Mais, si l'on appliquait ce principe dans toute sa rigueur, il arriverait, après un très-court laps de temps, que le besoin d'une éclaircie se ferait sentir, et qu'on se verrait forcé de supprimer un grand nombre de tiges, sans que, dans la plupart des cas, leur produit pût dédommager des dépenses qui avaient été faites pour les planter. Dans la pratique, il faut donc calculer l'espacement à donner aux plants de manière à con-

---

feuilles pendant l'hiver et, comme ces essences vivent plus particulièrement par les organes aériens, leur reprise, au printemps, exige, de la part des racines, un effort de végétation qu'elles ne sont que rarement en état de fournir. Le plant languit alors jusqu'en été, puis, quand surviennent les grandes chaleurs et la sécheresse, il finit par périr.

cilier, autant que possible, les exigences d'une bonne végétation avec l'économie. Or, cet espacement dépend, d'abord, des dimensions des tiges, de l'essence, du sol et du climat; en second lieu, du but que le propriétaire se propose en plantant, et des sommes qu'il est en état de consacrer à cet objet.

786. Dans les plantations de basses tiges, l'espacement varie de 66 centimètres à 1 mètre 33 centimètres; 1 mètre est la distance la plus ordinairement adoptée. Les hautes tiges s'espacent à 2, 3, 4, 5, 6 et même jusqu'à 8 mètres.

Pour régler cet objet, l'expérience a confirmé les principes suivants :

Plus les plants sont forts, plus ils doivent être espacés.

Certaines essences, telles que le hêtre, le sapin et, en général, les arbres dont le couvert est épais, demandent à croître très-rapprochées; d'autres, au contraire, comme le bouleau, l'orme, le robinier, exigent plus d'espace.

On doit planter plus serré dans les sols secs et arides que dans les terrains fertiles, dans les climats froids que dans les régions tempérées.

Lorsqu'on ne veut obtenir que du bois de feu, on peut adopter un plus grand espacement que quand il s'agit d'élever des bois de construction ou de fente.

Quand on a des terrains très-considérables à reboiser et qu'on est borné dans ses ressources pécuniaires, il faut adopter le plus grand espacement

possible, afin d'arriver promptement à mettre le sol en production.

Les plantations de têtards et d'arbres d'émondes sont celles qui admettent le plus d'espacement, parce que le sol, comme on le sait, est ordinairement utilisé, soit pour la culture, soit pour le pâturage.

787. On ne réussit à donner un égal espacement aux plants, qu'en les disposant dans un ordre régulier. On connaît quatre manières de tracer les plantations : 1° en allées ou files (fig. 9); 2° en triangles équilatéraux (fig. 10); 3° en carrés (fig. 11); et 4° en triangles isocèles ou quinconces (1) (fig. 12).

C'est ordinairement avec un cordeau et des piquets que ces tracés s'exécutent ; si le terrain est étendu, on peut aussi employer l'équerre d'arpenteur pour établir les alignements. Nous croyons inutile d'expliquer comment on procède à cette opération ; l'inspection des figures suffira pour la faire comprendre.

Le choix de l'une ou de l'autre de ces figures n'a pas, à proprement parler, d'influence culturale, c'est plutôt une affaire de goût ; cependant la plantation par files ou allées présente, dans certaines circonstances, des avantages réels. D'abord, elle permet d'ouvrir des tranchées, au lieu de trous, ce qui rend

---

(1) Ce dernier mode est au fond le même que le troisième, si ce n'est que les carrés, au lieu d'être construits, par rapport à une ligne donnée au moyen d'un système de perpendiculaires, sont formés par un système d'obliques faisant, avec la ligne donnée, un angle de 45 degrés.



L'ouvrage plus facile et procure un sol plus meuble, dans lequel, en général, les plants prospèrent mieux, en second lieu, le tracé en est plus aisé et plus prompt, quels que soient les contours du terrain. A la vérité, les plants n'ont pas la facilité d'étendre également leurs racines de tous les côtés, puisqu'ils sont très-rapprochés dans un sens et très-espacés dans l'autre; mais on sait qu'il n'est pas nécessaire que les racines se répandent symétriquement autour d'un arbre; elles se dirigent indifféremment vers un point quelconque, pourvu qu'elles y trouvent de l'espace et de la nourriture.

788. Le tableau ci-après fait connaître la quantité de plants à employer sur un hectare, quand on adopte le tracé par triangles équilatéraux, ou celui par carrés, avec les différents espacements portés dans la première colonne.

ESPACEMENT.	NOMBRE DE PLANTS à placer sur un hectare		OBSERVATIONS.
	par triangles équilatéraux.	par carrés.	
mètres.			
0,66	26515	22957	<p>Nous n'avons pas fait figurer sur ce tableau la plantation en allées, parce que le nombre des plants à employer, par hectare, dépend, à la fois, de leur espacement sur la même file et de la distance des files entre elles. Mais on conçoit que ce nombre est très-facile à calculer, toutes les fois que le terrain est un carré ou qu'il peut être ramené à cette forme; il suffit, en effet, de multiplier le nombre de plants d'une file par le nombre de toutes les files.</p> <p>Quant au tracé par triangles isocèles ou quinconces, qui ne figure pas non plus ici, il est évident qu'il admet le même nombre de tiges que celui par carrés, pourvu, toutefois, que les côtés des carrés soient égaux aux petits côtés des triangles, ainsi que nous le montrent les figures 11 et 12.</p>
1,00	11550	10000	
1,33	6529	5653	
1,66	4190	3628	
2,00	2888	2500	
3,00	1283	1111	
4,00	722	625	
5,00	462	400	
6,00	321	278	
7,00	236	204	
8,00	180	156	

## ARTICLE V.

## De la confection des trous.

789. Les trous pour les plants doivent être proportionnés à la grandeur des racines, c'est-à-dire, qu'il faut que celles-ci puissent y trouver place, tout en conservant leur position et leur direction natu-

relles. Dans les sols très-compacts, il est bon même de faire les trous plus grands, afin que les racines puissent, pendant quelques années, se fortifier et se développer dans une terre ameublie, avant de pénétrer dans des couches plus rebelles. Au contraire, dans les sols humides, on ne doit donner au trou que peu de profondeur (1).

790. Pour creuser les trous, on procède de la manière suivante : on enlève d'abord la superficie du sol, ordinairement gazonnée ou garnie de plantes quelconques, et on la place d'un côté du trou ; puis on met, du côté opposé, la couche de terre végétale immédiatement inférieure, et qui est la plus riche en terreau ; enfin, on entasse, sur un troisième point,

---

(1) Si l'on avait à planter des parties aquatiques, on pourrait ne pas faire de trous du tout et se contenter de poser le plant, bien d'aplomb, sur le sol, en l'entourant d'une butte de terre assez large pour que ses racines soient entièrement couvertes, et assez élevée pour qu'il ait une assiette solide ; autour de cette butte, qu'il est utile de gazonner à l'extérieur, on tracerait une petite rigole pour recevoir et éconduire les eaux. Ce mode de plantation, indiqué déjà par Duhamel (voy. *Traité des semis et plantations*, page 222) est rapporté par Cotta ; il dit l'avoir pratiqué en grand et en avoir obtenu des résultats qui ont dépassé tout ce qu'on pouvait en attendre. Nous l'avons essayé aussi, en petit à la vérité, et l'expérience a parfaitement réussi. Dans une récente publication, spécialement consacrée à ce mode particulier de plantation, M. le baron de Mantuffel, grand maître des forêts dans le royaume de Saxe, affirme l'avoir expérimenté, depuis plus de 20 ans, avec un plein succès, tant sur les essences résineuses que sur les feuillues, et dans les sols secs aussi bien que dans les lieux humides.

les autres couches moins fertiles. Cette manière d'opérer contribue puissamment au succès des plantations, surtout de celles de hautes tiges ; nous verrons plus loin quel avantage on en retire.

791. Lorsque le sol est de bonne qualité, les trous ne doivent être ouverts que peu de temps avant de planter, non-seulement pour que la terre reste plus fraîche, mais encore pour que le terreau qu'elle renferme ne perde pas ses propriétés nutritives, par l'action de l'air et de la pluie. Ce n'est que dans les sols très-compacts qu'il devient nécessaire de faire les trous quelque temps à l'avance, afin que la terre se divise : ainsi, quand on veut planter au printemps, les trous peuvent être faits en automne.

#### ARTICLE VI.

##### De l'extraction des plants.

792. Quand on procède à l'extraction des plants, il faut faire en sorte de ménager, le plus possible, les racines et les tiges.

Les brins très-petits peuvent être arrachés à la main, pour peu que la terre soit meuble et fraîche ; mais, en général, il vaut mieux les extraire avec un couteau, et, dans les sols plus compacts, on fera bien de se servir d'une petite pioche. Pour extraire des tiges plus fortes, si elles sont en sillons dans une pépinière, on ouvre une tranchée parallèle au premier

sillon et le plus près possible des plants ; puis, avec la bêche, on détache ceux-ci par mottes, en les soulevant un peu, et on les renverse doucement dans la tranchée, de manière que la terre reste adhérente aux racines. On continue ainsi de sillon en sillon. Quand on arrache les plants dans les forêts, on peut aussi commencer par faire une tranchée ou un trou, puis fouiller la terre avec une pioche.

793. Lorsque des plants de basse tige doivent être transplantés en mottes, ce qui est surtout à conseiller pour les essences résineuses, on se sert, avec beaucoup d'avantage, pour les extraire, de l'une ou de l'autre des deux bêches demi-circulaires dont nous donnons le dessin à la fin du volume (voy. fig. 7 et 8). La plus grande de ces bêches convient plus particulièrement dans les terres compactes et pour des plants qui sont déjà d'une certaine force ; l'autre, plus légère et plus facile à manier, sert dans les sols plus divisés et pour extraire des tiges plus faibles. Ces bêches ne s'emploient pas seulement à l'extraction des plants, elles servent aussi pour confectonner les trous dans lesquels les mottes doivent être placées (1). On conçoit combien, par un tel pro-

---

(1) Pour faire les trous avec les bêches dont il est question ici, l'ouvrier enfonce l'instrument en le tournant et le retournant horizontalement à l'aide de la traverse qui se trouve adaptée à l'extrémité de la tige verticale. Il n'a pas besoin chaque fois qu'un trou vient d'être fait, de s'occuper à faire sortir la motte de terre de la bêche qui la retient. Cette opération se

cédé, la plantation est rendue facile, et tous les avantages qui doivent en résulter pour la végétation.

794. Les hautes tiges ne peuvent être traitées par aucun des moyens que nous venons d'indiquer. Pour les extraire, il faut d'abord creuser une petite fosse autour de l'arbre, à une distance convenable pour lui laisser les racines nécessaires ; puis, avec une bêche bien tranchante (voy. fig. 6), on coupe les racines latérales, et, après avoir élargi la fosse, on finit par atteindre obliquement le pivot. Il faut se garder de pencher l'arbre avant d'en avoir détaché toutes les racines, ou de l'arracher avec effort.

#### ARTICLE VII.

##### Du transport des plants.

795. A mesure que les ouvriers arrachent les plants de basse tige, ils doivent les mettre dans des paniers, sans secouer la terre qui entoure les racines, et les faire transporter de suite sur le terrain où l'on plante. On emploie aussi, pour le transport des plants, surtout de ceux qui sont en mottes, des brouettes de jardin ou de petits tombereaux ; il n'y a

---

ait d'elle-même par la confection du trou suivant ; la nouvelle motte chasse l'ancienne. Cette circonstance est bonne à connaître, car elle est de nature à procurer une notable économie de temps, lorsqu'il s'agit de grands travaux de repeuplement.

que les trop fortes tiges qu'il soit nécessaire de placer sur des voitures.

Quelle que soit la dimension des plants, il faut avoir soin que les tiges ne soient point endommagées, et, à cet effet, les garnir de bouchons de mousse ou de paille, partout où il y aurait quelque frottement à craindre pendant le transport. Les racines doivent surtout être garanties du contact de l'air ; il ne faut souvent que quelques heures de hâle, ou un coup de soleil un peu vif, pour les priver de leur vitalité.

Quand le lieu où l'on arrache les plants est éloigné du terrain à planter, les tiges doivent être réunies par bottes et les racines emballées dans de la mousse fraîche ou dans du foin humide. Rendues à destination, il faut les laisser ainsi en paquets jusqu'au moment de les planter ou de les mettre en jauge (1).

---

(1) Pour mettre les plants en jauge, on ouvre une tranchée dans laquelle on les place par ballots ; on recouvre ensuite les racines de terre bien meuble, de manière à empêcher le contact de l'air. Par ce procédé, les plants peuvent être conservés assez longtemps avant de les planter, sans qu'ils aient aucun risque à courir ; toutefois, si le séjour en jauge devait se prolonger beaucoup, il faudrait délier les ballots, de crainte que les racines, surtout le chevelu, ne fussent atteintes par la moisissure. On peut aussi mettre les plants dans l'eau, mais pour peu de jours seulement.

## ARTICLE VIII.

## De la taille des plants.

796. L'extraction des plants, si bien qu'elle soit exécutée, lèse toujours un certain nombre de racines, et, à moins que le sujet ne soit tout à fait petit, une partie de ses racines, détachées par la bêche ou la pioche, demeurent en terre. Or, dans toute plante croissant librement, il existe, comme on le sait, un rapport direct entre les racines et la tige ; et ce rapport nécessaire, l'extraction l'interrompt plus ou moins, comme on le voit, selon les précaution avec lesquelles on procède et selon la dimension des sujets.

La taille des plants a donc pour but : 1° de restaurer les racines qui ont été lésées ; 2° de rétablir l'équilibre entre les racines et les branches.

797. La première de ces opérations consiste à amputer avec une serpette, toutes les parties des racines qui présentent un déchirement, une contusion ou une blessure quelconque. Il est essentiel que la tranche soit bien nette ; elle doit être faite en biseau, et, autant que possible, de manière qu'elle pose à plat sur la terre.

Quand les plants sont arrachés déjà depuis quelque temps, et que le chevelu des racines n'a plus toute sa fraîcheur, on le ravive en en coupant les extrémités ; les racines trop longues, qu'on ne pour-



rait placer dans le trou sans les contourner, doivent aussi être retranchées, ainsi que le pivot. Mais, en général, il faut éviter de supprimer des racines saines ; un plant n'en a jamais trop.

798. La perte de racines que le plant a subie par l'extraction et par la taille dont nous venons de parler, rend nécessaire la suppression d'une partie des branches, afin de rétablir l'équilibre détruit. Cette taille de la tige est d'autant plus indispensable que, par la transplantation, les racines sont, pendant quelque temps entravées dans leurs fonctions, et qu'elles amènent, par conséquent, moins de substances nourricières à l'arbre.

Plus le plant est fort, plus il a perdu de racines par l'extraction, plus le sol où il doit être planté est ingrat, — moins il faut lui laisser de branches. Ces principes, très-simples en théorie, et les seuls qui se puissent donner sur la taille des plants, laissent néanmoins, il faut l'avouer, beaucoup à désirer quand on en vient à l'exécution.

Quel est, en général, le rapport des branches aux racines ? Est-il le même pour toutes les essences ou varie-t-il pour chacune, et comment ? Dans quelle proportion l'ensemble des racines a-t-il été diminué par l'extraction ? est-ce du tiers, du quart, etc. ? On sait que la reprise est favorisée par les années pluvieuses, entravée au contraire par les années de sécheresse ; il faudrait donc supprimer plus de branches dans ce dernier cas ; mais sur quelle température

doit on compter ? Telle est la série de questions auxquelles la taille des plants peut donner lieu, et qui, cependant, n'admettent aucune solution positive. Aussi cette opération n'est-elle en réalité qu'un tâtonnement, dans lequel on réussit plus ou moins, selon l'expérience que l'on a acquise de la localité et des essences que l'on plante.

C'est, sans nul doute, à l'incertitude qui règne sur cet objet, qu'il faut attribuer, en grande partie, l'insuccès de tant de plantations faites dans les forêts, surtout, lorsque les plants n'ont pu être préparés en pépinière et qu'ils sont déjà de forte dimension.

799. Il existe, pour la plantation des bois feuillus, un procédé qui lève toutes les difficultés que nous venons de signaler. Ce procédé, c'est le recépage du plant, à 3 centimètres environ du collet de la racine, au moment même de le mettre en terre.

Si l'on examine les conditions de végétation du plant recépi et de celui qui n'a été que taillé, on ne peut conserver aucun doute sur les avantages marqués dont jouit le premier. En effet, la grande difficulté, pour le plant taillé, c'est de rétablir l'équilibre entre la tige et les racines ; tant que ce résultat n'est pas atteint, la végétation souffre, et trop souvent les racines s'épuisent en efforts inutiles, parce que la tige est trop considérable, ou parce que le sol ou la température est contraire. Aussi est-il très-fréquent de voir des plantations languir pendant cinq ou six ans ; après quoi elles finissent, quelquefois, par pren-

soleil, ils languissent de plus en plus, s'étiolent, sèchent, et le maître jet finit par se trouver seul sur la souche. Aussi de telles plantations, lorsqu'elles sont parvenues à l'état de gaulis, ne laissent-elles plus apercevoir la moindre trace de ces rejets traînants; toutes les tiges sont parfaitement assises, droites, nues et bien filées, sans qu'il soit possible de les distinguer, en quoi que ce soit, des brins de semence.

La plantation avec recépage peut donc convenir pour créer des futaies, aussi bien que des taillis; seulement il faut, pour les premières, se servir de basses tiges et planter assez serré, afin que le massif se forme à temps, tandis qu'au contraire, pour établir un taillis, on pourra employer avec avantage des tiges plus fortes, parce qu'on obtiendra, par là, plus promptement des cépées.

801. Le recépage, on le couçoit, ne peut être appliqué aux bois résineux; il est même d'expérience que la taille des branches leur est souvent plus nuisible qu'avantageuse. Ces essences, effectivement, paraissent, plus que les feuillues, puiser leur nourriture dans l'atmosphère; il semble donc nécessaire de leur ménager plus particulièrement les organes destinés à assurer cette nutrition. Cependant, il peut être utile, lorsqu'on plante des sujets un peu forts, de leur enlever quelques branches; mais il faut procéder avec la plus grande réserve, car les plaies des bois résineux, quand elles sont nombreuses ou

d'un certain diamètre, occasionnent à l'arbre des écoulements séveux qui l'affaiblissent. Aussi est-il à conseiller de préférer, pour les plantations de bois résineux, des plants de basse tige qui soient assez jeunes pour pouvoir se passer de la taille.

D'après les expériences de plusieurs planteurs distingués, notamment de M. Marsaux (v. *Annales forestières*, tome I<sup>er</sup>, page 699) le plant de hêtre supporte mal le recépage. On fera donc bien de s'abstenir de cette pratique pour cette essence et de la traiter, en ce qui concerne la plantation, comme les bois résineux, à moins que des essais faits dans la localité où l'on opère, n'aient démontré que le jeune plant de hêtre y fournit sûrement des rejets, après amputation.

## ARTICLE IX.

De la mise en terre des plants ou plantation proprement dite.

802. En général, on peut poser en principe qu'un arbre doit, après la transplantation, se trouver enterré à la même profondeur qu'avant cette opération. Cependant, il est convenable de planter un peu plus profondément lorsqu'on peut prévoir que la terre s'affaissera, ou bien lorsque le sol est très-léger et sec ; d'autant plus que, dans ce dernier cas, il faut ménager, autour des tiges, un petit creux où l'eau

des neiges et des pluies puisse s'amasser. Dans les sols humides, au contraire, on plante plus près de la superficie, et, au lieu de laisser subsister un renfoncement autour de la tige, on y fait une petite butte pour faciliter l'écoulement des eaux. Les tiges recépées doivent être plantées de manière à effleurer entièrement la superficie.

803. Pour mettre le plant en terre, on procède de la manière suivante :

On place le plant dans le milieu du trou sur une couche de bonne terre de 5 ou 6 centimètres d'épaisseur environ, ou bien sur les mottes de gazon provenant du trou et que l'on a pris soin de briser menu au préalable; puis, avec la main, on étend les racines de façon à laisser à chacune sa direction naturelle; il est essentiel qu'elles posent toutes d'aplomb et que la tige se tienne bien droite. Cela fait, on répand la bonne terre végétale, qui a été mise à part en creusant le trou [790], de manière que les racines en soient entièrement couvertes; en même temps, on remue un peu la tige en la soulevant et en la rabaissant légèrement, afin que les parcelles de terre s'insinuent de toutes parts entre les racines. Enfin, pour ne négliger aucune précaution, on introduit la main sous les racines pour remplir toutes les cavités qui pourraient encore exister. Après que la couche de bonne terre est employée comme nous venons de l'expliquer, on achève de remplir le trou avec les couches de moindre qualité. Tout en répan-

dant ainsi la terre sur les racines, on la raffermir de temps en temps avec la paume de la main ou avec le pied, légèrement d'abord, puis, de plus en plus fortement.

Quand on plante de faibles tiges, recépées ou non, on facilite l'opération sans compromettre la reprise du plant, en l'appuyant contre une des parois du trou par son côté le moins pourvu de racines. La paroi doit, dans ce cas, être parfaitement verticale. L'ouvrier, tenant le plant de la main gauche, conserve la droite libre pour étendre les racines en avant du plant, les garnir de terre et remplir le trou, avec les précautions que nous venons d'indiquer.

Pour ces sortes de plantations, on emploie utilement, soit une truelle de maçon, soit une petite houe à manche très-court, à l'aide de laquelle le planteur, agenouillé devant le trou pour plus de facilité dans ses mouvements, accommode celui-ci et y ramène la terre, sans se déranger, selon que l'exige la conformation du plant dont il s'occupe.

804. Souvent, au lieu d'un seul plant, on en réunit deux, trois, et quelquefois jusqu'à cinq et six, dans le même trou. Ce mode, appelé plantation *par touffes*, réussit parfaitement pour les bois résineux, surtout lorsqu'ils sont très-jeunes (1 et 2 ans); on l'a aussi appliqué avec succès au hêtre

Les plants sont élevés en pépinière, de la façon que nous avons décrite plus haut [779], seulement les sillons sont très-étroits (4 à 6 centimètres). Au

moment de la plantation on coupe les sillons, avec une bêche, par plaques ayant à peu près la dimension d'une brique. Ces plaques sont transportées, dans des paniers, sur le terrain à planter, et là, divisées *à la main*, par touffes contenant le nombre de brins que nous venons d'indiquer.

Les trous se font à la houe ou avec la petite bêche demi-circulaire [793].

Les principaux avantages que présente la plantation *par touffes* sur celle faite avec des sujets séparés, sont :

1° Plusieurs brins réunis en une touffe permettent plus difficilement à la terre de se détacher des racines, soit dans l'extraction, soit dans le transport ;

2° Les touffes couvrent plus tôt leur pied qu'un plant isolé, et la reprise d'un des brins, au moins, est à peu près assurée ;

3° Dans une même touffe, le brin le plus vigoureux ne tarde pas à s'élever au-dessus des autres ; après quelques années, ces tiges dominantes forment seules le massif de la jeune forêt, et les autres tombent dans la première éclaircie.

Ce mode de plantation, que nous avons nous-même pratiqué sur une assez grande échelle et avec différentes essences (pin sylvestre, épicéa, sapin), nous a toujours très-bien réussi, même dans les sols et aux expositions les plus défavorables. Nous pouvons donc le recommander avec confiance, en renvoyant le

lecteur, pour plus amples détails, à l'article que nous avons publié sur ce sujet dans les *Annales forestières*, tome IV, année 1845, page 329.

805. Lorsqu'on en aura la facilité, on fera bien d'arroser les plants immédiatement après les avoir mis en terre ; mais on conçoit qu'une telle opération n'est praticable que quand les travaux se font en petit. Ce qui l'est davantage, dans la plupart des cas, c'est de placer à droite et à gauche du plant, une ou plusieurs pierres qui maintiennent la fraîcheur et raffermissent la terre autour des racines, en même temps qu'elles procurent à la tige, quand elle est très-petite, quelque abri contre les ardeurs du soleil.

Pour les plantations en mottes, il faut avoir la précaution de remplir de bonne terre les petits interstices qui existent presque toujours entre la motte et la paroi du trou.



## CHAPITRE SIXIÈME.

---

### DES BOUTURES.

---

806. Toutes les essences feuillues ont, plus ou moins, la faculté de se reproduire par boutures ; on a même réussi à multiplier de cette manière les bois résineux. Cependant, il n'y a que les peupliers, les saules et les platanes qui se montrent particulièrement faciles à cet égard, et qui fournissent de beaux sujets ; les boutures des autres bois, exigent beaucoup de soins, et les produits qu'on en obtient sont généralement d'une faible végétation. Aussi se borne-t-on, en syviculture, à propager, de cette manière, les trois genres d'arbres que nous venons de nommer, et dont il faut encore excepter toutefois, le tremble et le marceau, tous deux d'une reprise fort difficile.

Les plantations de boutures trouvent surtout leur application dans les terrains destinés au parcours,

dans les prairies, sur les bords des chemins, etc. ; mais elles sont aussi d'une ressource précieuse pour fixer les sables, pour maintenir les terres dans les pentes rapides et sur les bords des eaux, ainsi que pour repeupler certains lieux aquatiques dans les forêts.

On connaît deux espèces de boutures : la *bouture en plançon* et la *bouture à bois de deux ans*.

807. Le plançon est une branche de 3 à 4 mètres de long sur 4 à 8 centimètres de diamètre, que l'on dépouille de tous ses rameaux et que l'on taille en biseau par les deux bouts. Pour le planter, on l'enfonce à une profondeur de 50 centimètres, après avoir formé, au préalable, le trou avec un pieu en fer. Toutefois ce procédé n'est convenable que dans les lieux aquatiques ; quand le sol est plus ferme il vaut mieux ouvrir, à la bêche, un trou de 50 centimètres environ de profondeur sur 66 centimètres de côté, dans le milieu duquel on fixe le plançon et que l'on comble ensuite de bonne terre bien émiettée.

Lorsque les plançons risquent d'être endommagés, soit par le vent, soit par le bétail, etc., on leur donne des tuteurs et on les entoure, jusqu'à hauteur d'appui, d'épines ou de branchages.

C'est ordinairement avec des plançons que l'on forme les têtards. Il est à remarquer que les grands saules, tels que l'osier, le saule blanc, etc., sont les

seuls bois qui reprennent bien de cette manière; les peupliers s'y refusent presque toujours.

808. Pour faire des boutures à bois de deux ans, on choisit des rameaux bien vigoureux, présentant, outre la pousse de l'année, du bois de deux ou de trois ans au plus; on leur enlève toutes les ramilles et on les réduit à 30 ou 40 centimètres de long. S'il s'agit de fixer des sables ou de maintenir des terres en pente, il est bon de leur donner même plus de longueur. La section inférieure se fait en biseau; celle du haut doit être droite, afin de ne pas blesser la main du planteur.

Lorsque le sol est bien meuble, on plante ces boutures en les enfonçant obliquement, de manière qu'elles ne dépassent la superficie que de 3 ou 4 centimètres au plus. Mais, dans une terre plus ferme, où l'on risquerait de les casser ou de déchirer l'écorce, on prépare des trous avec un plantoir un peu plus fort que les boutures; et dans les terrains tout à fait compactes, on ouvre, soit des trous, soit des tranchées avec la houe ou la bêche. Il est essentiel de bien raffermir la terre autour des boutures.

Souvent on élève les boutures en pépinière, surtout celles de peuplier et celles de platane, pour les transplanter plus tard à demeure. Dans ce cas, on choisit un terrain de bonne qualité, frais, qu'on laboure convenablement et qu'on dispose par plan-

ches. On y met les boutures en rigoles, et on les soigne de même que des plants ordinaires [781]. Des arrosements fréquents favorisent singulièrement leur reprise.

809. La saison la plus convenable pour faire des boutures est le printemps; néanmoins la plupart des saules reprennent aussi de cette manière en été.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

---

### DES MARCOTTES.

---

810. On peut appliquer le procédé du marcottage à toutes les essences résineuses ou feuillues; mais, c'est surtout pour la propagation de ces dernières, et notamment dans les taillis, qu'il mérite l'attention du forestier.

Lorsque les brins ou les rejets qui doivent être marcottés sont faibles, et, par conséquent, flexibles, on peut les coucher sans difficultés dans de petites rigoles, faites à cet effet, que l'on comble ensuite de bonne terre. Mais quand ce sont des perches assez fortes déjà qu'il s'agit de faire servir de cette manière, il faut procéder avec plus de précaution. Pour le repeuplement des bois, ces dernières sont plus avantageuses; on en obtient des sujets plus nombreux, d'une reprise plus prompte et d'une croissance plus vigoureuse.

Afin de réussir à ployer ces perches jusqu'à terre, on leur fait, à l'endroit où la plus grande flexion

devient nécessaire, une entaille qui peut pénétrer jusqu'au centre du bois et qui doit être placée sur la face convexe de la courbure. Au moyen de cette entaille, on amène la tête de la tige sur le sol, légèrement labouré au préalable, et on l'y fixe par des crochets en bois qui la saisissent immédiatement au-dessous des branches inférieures et vers l'extrémité de la cime. De fortes mottes de gazon, placées sur les différentes branches principales, sont destinées à les maintenir contre terre. Cette première opération faite, on recouvre tous les rameaux de 16 à 22 centimètres de bonne terre, de manière à n'en plus laisser passer que les extrémités, sur quatre ou cinq boutons au plus. Au moyen de la terre dont on les entoure, ou bien à l'aide de mottes de gazon, on donne à ces petites ramilles une position verticale. L'entaille faite à la perche doit, au moins pendant les premières années, être recouvertes de mottes de gazon.

Après trois ou quatre ans, il s'est formé, au-dessous de tous ces menus rameaux, des racines qui leur sont propres, et qui sont suffisantes pour pourvoir à leur nutrition. Dès lors on peut donc les sevrer, c'est-à-dire, retrancher la perche courbée qui les unissait à la souche mère (1).

---

(1) M. Heyer assure que les sorbiers, les érables et quelques autres arbres encore, étant traités comme on vient de l'expliquer, s'enracinent dès la première année. Il ajoute que, en général, le bois de deux ans, des

Le procédé que nous venons de décrire, est rapporté par plusieurs auteurs forestiers de l'Allemagne, comme très-usité dans différentes localités de ce pays. Dans le Hanôvre, on l'emploie avec beaucoup de succès pour repeupler les clairières des taillis de hêtre. A cet effet, on réserve, lors de l'exploitation, un certain nombre de tiges sur le bord de ces clairières, et l'année suivante on en opère le couchage; ces tiges ont souvent 10, 12 et même 15 centimètres de diamètre à la base.

811. Lorsque les perches couchées font partie d'une cépée, il faut éviter de laisser d'autres perches debout sur la même souche. La sève ayant plus de tendance à monter droit qu'à circuler dans les branches courbées, abandonnerait celles-ci pour se porter avec affluence dans les autres, et la perte des marcottes en serait la suite. On doit donc supprimer tous les rejets, et, pour empêcher qu'il n'en repousse d'autres jusqu'à l'entière reprise des branches marcottées, on fera bien de couvrir la souche de 15 à 20 centimètres de terre fortement tassée en forme de petite butte. Dès qu'on opérera le sevrage des mar-

---

branches couchées, s'enracine plus vite que les pousses de l'année, et qu'on hâte d'ailleurs la production des racines, si, au moment où l'on procède au couchage d'une branche, on lui enlève sur la face inférieure une petite plaque d'écorce jusqu'à l'aubier, avec un couteau bien tranchant. Autour de la blessure, il se forme un bourrelet sur lequel les racines ne tardent pas à se présenter.

cottes, on pourra découvrir la souche qui ne tardera pas à fournir de nouvelles productions.

812. Le marcottage réussit mieux au printemps qu'en toute autre saison.



## CHAPITRE HUITIÈME.

---

### TRAVAUX D'ENTRETIEN A EXÉCUTER DANS LES REPEUPEMENTS ARTIFICIELS.

---

813. Par cela seul qu'un semis a bien levé et que, dans une plantation, la grande majorité des plants est restée verte, ou a produit une faible pousse, la réussite de ces opérations n'est point assurée. — A vrai dire, le succès d'un repeuplement artificiel ne peut être considéré comme certain qu'au bout de 5 ou 6 ans, alors que les jeunes sujets, complètement enracinés, protégeant leur pied et pouvant lutter avec avantage contre les intempéries et l'envahissement des plantes nuisibles, commencent à s'élancer avec vigueur et approchent du moment où ils vont couvrir la totalité du sol par l'extension graduelle de leurs branches latérales. Jusqu'à cette époque, le sylviculteur ne peut abandonner son œuvre ; il doit, au contraire, sous peine de compromettre le fruit de ses travaux et de ses dépenses, la surveiller active-

ment, écarter, autant qu'il dépend de lui, les causes qui sont de nature à entraver la végétation de la forêt naissante, et réparer les dommages que le temps a pu y causer, à mesure qu'ils ont lieu.

814. Les travaux d'entretien consistent en sarclages et en binages. On appelle *sarcler* l'opération par laquelle on enlève, une à une pour ainsi dire, les mauvaises herbes qui se présentent parmi les plants composant un semis ou une plantation, tandis que *biner*, c'est, ainsi que le mot l'indique, donner une seconde façon à la terre, en même temps qu'on la débarrasse de la mauvaise herbe. Selon la nature des plantes qu'il s'agit d'extraire, selon le sol plus ou moins compacte, enfin, selon la ténuité du plant dans l'intérêt duquel l'opération a lieu, les sarclages se font ou avec un couteau, ou avec un petit instrument appelé sarcloir et que tout le monde connaît, ou bien à la main. Les binages se donnent toujours avec une houe légère ou avec un crochet.

815. Examinons d'abord l'application que trouvent ces travaux dans les semis.

1° Bois feuillus.

Les semis en plein sont les moins sujets à l'envahissement des mauvaises herbes, pourvu toutefois qu'ils aient bien levé. Ordinairement, comme on le sait, le sol a été préparé à la charrue et nettoyé par une ou plusieurs cultures en céréales. Si donc le semis forestier réussit, les jeunes plants étant répan-

arbustes ou les herbes qui les garnissent nuisent au semis en s'abattant sur les rayons cultivés. Ce qu'il y aurait de mieux en pareil cas, ce serait de les faucher si ce sont des herbes, et si ce sont des arbustes de les tondre avec des ciseaux de jardin, à 15 ou 20 centimètres de hauteur, comme on fait des haies dans les champs.— Une forte faucille ou un croissant pourrait aussi servir à ce dernier ouvrage.

816. Dans les plantations, les sarclages, on le conçoit, seraient presque toujours insuffisants; par contre, les binages deviennent d'autant plus efficaces, tant pour éloigner des plants les herbes ou les arbustes qui pourraient les gêner, que pour procurer à leurs racines l'accès de l'air et de l'humidité. Lorsqu'on plante des essences d'élite dans de bons terrains situés en plaine, il est souvent avantageux de faire précéder la plantation, de même que le semis, d'un labour total à la charrue et même de plusieurs cultures de céréales ou de pommes de terre. Le sol est alors parfaitement ameubli et nettoyé, et il est facile de l'entretenir dans cet état au moyen d'un ou de deux binages au plus par an. Mais, dans les repeuplements forestiers, de telles plantations ne sont guère que l'exception. Ordinairement, la qualité et la configuration du sol, autant que des motifs d'économie, font qu'on se borne à ouvrir les trous des plants, comme nous l'avons enseigné plus haut [790], sans toucher au reste du terrain. Il s'ensuit que les binages aussi ne se pratiquent qu'autour de

chaque plant, sauf à tondre les arbustes ou à fauciller les herbes dans les intervalles, s'ils devenaient nuisibles ou si l'on devait en retirer un bénéfice immédiat.

817. L'époque la plus favorable pour les sarclages comme pour les binages des semis et plantations, est celle où les plantes nuisibles poussent avec le plus de vigueur, c'est-à-dire, les mois de mai et de juin. Si, en raison de l'abondance des parasites et des inconvénients qu'elle pourrait entraîner pour les jeunes plants, dans l'automne ou l'hiver, on reconnaissait l'utilité d'un second sarclage ou binage, il faudrait l'effectuer dans le courant de septembre.

818. Les travaux d'entretien dont nous venons de parler sont encore peu en usage parmi les forestiers qui s'occupent de repeuplements artificiels, soit qu'ils répugnent à la dépense à laquelle ces opérations donnent lieu, soit qu'ils craignent de ne pouvoir suffire à la surveillance qu'elles exigent. — Nous ne méconnaissions pas les obstacles qui peuvent souvent exister sous ce double rapport, mais nous ne saurions trop insister sur la haute opportunité des travaux dont il est question. Non-seulement ils assurent la réussite d'une quantité considérable de sujets qui, autrement, eussent péri ; mais ils doublent et triplent la croissance de tous dans les premières années, favorisent le développement de leurs organes de nutrition et jettent ainsi les fondements d'une végétation prospère et vigoureuse qui, plus

tard, dédommage le planteur, souvent au décuple, des peines et des sacrifices pécuniaires qu'il s'est imposés.

819. Deux ou trois ans au plus tard, après qu'une plantation a été exécutée, il convient de s'occuper des remplacements ou regarnis. Pour cette opération, on emploiera de préférence des plants un peu plus forts que ne le sont ceux auxquels ils doivent être associés, afin qu'ils se tiennent plus facilement à leur hauteur.

Pour faire le même travail dans un semis, il est bon d'attendre que les jeunes plants aient acquis assez de développement pour permettre de juger de la réussite du repeuplement dans son ensemble. Les regarnis se font de la sorte plus facilement et mieux ; il est presque toujours préférable d'y procéder par voie de plantation.

FIN.

# VOCABULAIRE

## DES TERMES TECHNIQUES

EMPLOYÉS ET DÉFINIS DANS CET OUVRAGE.

### A.

	SS	pages.
Abrouissement . . . . .	447	216
Accroissement annuel. . . . .	394	176
— moyen. . . . .	394	176
Affectation périodique . . . . .	425	195
Alise, alose. . . . .	202	95
Aménagement. . . . .	607	402
Ancien . . . . .	564	346
— de deuxième classe. . . . .	564	347
— de première classe . . . . .	564	347
Arbre. . . . .	7	8
Arbrisseau. . . . .	7	8
Arbuste . . . . .	7	8
Assainissement . . . . .	704	527
Assiette, asseoir une coupe . . . . .	399	177

## B.

	SS	pages.
Balivage normal. . . . .	594	381
Baliveau. . . . .	564	346
— de l'âge. . . . .	564	346
— moderne. . . . .	564	346
— ancien. . . . .	564	346
Bardeaux . . . . .	283	124
Base minéralogique. . . . .	52	33
Basse tige . . . . .	776	590
Bassin de consommation. . . . .	658	470
Basson . . . . .	319	143
Bêche demi-circulaire . . . . .	793	608
Biner. . . . .	814	631
Blanc étoc (coupe à) . . . . .	454	217
Bois abroutis . . . . .	447	216
— d'automne. . . . .	76 bis.	46
— blancs ou tendres . . . . .	445	215
— de corde. . . . .	14	11
— défensable . . . . .	450	216
— durs . . . . .	445	216
— de fente. . . . .	14	11
— feuillus . . . . .	23	17
— gras . . . . .	76 bis.	47
— merrain. . . . .	14	12
— nerveux. . . . .	76 bis.	47

## DES TERMES TECHNIQUES.

639

	§§	pages.
Bois d'œuvre . . . . .	14	11
— de printemps . . . . .	76 bis.	46
— de quartier . . . . .	14	11
— résineux . . . . .	23	17
— rondin . . . . .	14	11
— de service . . . . .	14	11
— de sciage . . . . .	14	11
— de travail ou d'ouvrage . . . . .	14	11
Bourrée . . . . .	14	11
Bouture . . . . .	685	503
— à bois de deux ans . . . . .	808	624
— en plançon . . . . .	807	623
Brin . . . . .	12	10

## C.

Cadranure . . . . .	76 bis.	48
Capital foncier . . . . .	639	448
— producteur . . . . .	{ 410 bis.	185
	{ 639	448
— superficiel . . . . .	639	448
Carpelles . . . . .	10	9
Cépée . . . . .	568	348
Cerches . . . . .	14	11
Chablis . . . . .	402	177
Chandelier . . . . .	402	177
Chevelu . . . . .	11	10



	SS	pages.
Clairière. . . . .	439	214
Climat. . . . .	1	7
— géographique. . . . .	2	7
— local ou physique . . . . .	2	7
Cône. . . . .	23	18
Conversion (exploitation de) . . . . .	631	436
Coupe. . . . .	398	177
— d'amélioration. . . . .	465	227
— par bandes alternées. . . . .	507	271
— par bouquets. . . . .	508	273
— claire ou secondaire . . . . .	461	224
— définitive . . . . .	462	224
— d'ensemencement.. . . .	460	222
— de nettoiemnt.. . . .	465	228
— préparatoire.. . . .	668	480
— de régénération . . . . .	459	222
— sombre.. . . .	460	223
— de transformation. . . . .	{ 537 553	{ 304 332
Couronner (se). . . . .	408	183
Couvert. . . . .	565	347

## D.

Décennie . . . . .	424	195
Défends (mettre en) . . . . .	449	216
Défensable (bois). . . . .	450	216

DES TERMES TECHNIQUES.

641

	SS	pages.
Dendrométrie. . . . .	426	199
Dénique (Doraison). . . . .	10	9
Diageon. . . . .	12	10
Dunes. . . . .	787	579
E.		
Echauffer (s'). . . . .	687	504
Eclaircie périodique . . . . .	466	229
— faible . . . . .	467	231
— forte. . . . .	467	231
— moyenne.. . . .	467	230
Ecobuage . . . . .	702	523
— à feu courant. . . . .	703	525
Ecorcement. . . . .	609	405
Elagage . . . . .	601	392
Emondage. . . . .	624	428
Espèce. . . . .	9	8
Essence . . . . .	8	8
Etamines. . . . .	10	9
Etêtement . . . . .	625	428
Exploitable. . . . .	403	178
— absolue.. . . .	405	179
— composée . . . . .	412	188
— physique. . . . .	404	179
— relative.. . . .	409	184
Exposition. . . . .	4	8

## F.

	§§	pages.
Fagot. . . . .	14	11
Feuillus (bois) . . . . .	23	17
Floraison dioïque . . . . .	10	9
— hermaphrodite . . . . .	10	9
— monoïque . . . . .	10	9
— polygame . . . . .	10	9
Forêt normale . . . . .	415	190
Fourré . . . . .	444	215
Frotture . . . . .	76 bis.	48
Furetage . . . . .	613	412
Futaie . . . . .	436	213
— (demi-) . . . . .	444	215
— irrégulière . . . . .	438	214
— régulière . . . . .	437	213
— sur taillis . . . . .	563	346

## G.

Gaulis . . . . .	444	215
Gelivure . . . . .	76 bis.	47
Gemmer, gemmage . . . . .	319	142
Glissoir . . . . .	434	208
Gournable . . . . .	14	12
Grisette . . . . .	76 bis.	48

## H.

	SS	pages.
Haute tige. . . . .	776	590
Hermaphrodite (floraison).. . . .	10	9
Humus . . . . .	5	8

## J.

Jardinage . . . . .	535	301
Jauge (mettre en). . . . .	795	610

## L.

Labour en plein. . . . .	699	519
— par bandes alternées . . . . .	700	520
— par places, trous ou pots. . . . .	701	522
Lançoir . . . . .	434	208
Lunure. . . . .	76 bis.	47

## M.

Marcotte. . . . .	686	503
Marne. . . . .	57	36
Martelage . . . . .	596	384
Massif. . . . .	442	214
— clairié . . . . .	443	215
— entrecoupé. . . . .	443	215
— incomplet . . . . .	443	215

	§§	pages.
Massif serré . . . . .	443	214
Menus-taillis . . . . .	618	419
Merise . . . . .	224	102
Merrain . . . . .	14	12
Météore . . . . .	32	23
Moderne . . . . .	564	346
Monoïque (floraison) . . . . .	10	9
Morts-bois . . . . .	446	216

## N.

Nœuds gâtés . . . . .	76 bis.	48
-----------------------	---------	----

## O.

Ombrage . . . . .	365	347
-------------------	-----	-----

## P.

Panage . . . . .	15	12
Pépinière . . . . .	778	592
Perchis (haut-perchis, bas-perchis) . . . . .	444	215
Période . . . . .	424	195
Peuplement complet . . . . .	397	177
Pistil . . . . .	10	9
Pivot . . . . .	11	10
Pivot (couper en) . . . . .	567	348
Pivotante (racine) . . . . .	11	10

# DES TERMES TECHNIQUES.

645

	SS	pages.
Plançon . . . . .	807	623
Plantation . . . . .	684	503
— par touffes . . . . .	804	621
Plantoir-massue . . . . .	713	536
— à nervures . . . . .	713	536
Polygame (floraison) . . . . .	10	9
Possibilité . . . . .	415	190
Pourriture rousse ou blanche . . . . .	76 bis.	48
Produits accessoires . . . . .	470	234
— principaux . . . . .	470	234

## Q.

Quarre . . . . .	319	143
Quille . . . . .	402	177

## R.

Race . . . . .	9	9
Racine pivotante ou plongeante . . . . .	41	10
— traçante . . . . .	41	10
Ramiers . . . . .	569	348
Rapport ou rendement soutenu . . . . .	398	476
Ravaler . . . . .	566	348
Recéper, recépage . . . . .	448	216
Récolement . . . . .	596	385
Recru . . . . .	13	10

	SS	pages.
Regarnis . . . . .	819	636
Rejet . . . . .	12	10
Rente . . . . .	395	176
Repeuplement . . . . .	13	10
Repiquement . . . . .	713	535
Repiquer . . . . .	689	504
Réserve, réserves . . . . .	451	217
Résineux (bois) . . . . .	23	17
Retour (bois en) . . . . .	408	183
Revenu . . . . .	{ 440 bis.	186
	639	448
Révolution . . . . .	392	175
Roulure, bois roulé . . . . .	76 bis.	47

## S.

Sable gras . . . . .	58	36
Sarcler . . . . .	814	631
Sartage . . . . .	619	420
— à feu courant . . . . .	620	424
— à feu couvert . . . . .	621	424
Semis . . . . .	683	503
— en plein . . . . .	688	504
— partiel . . . . .	688	504
Série d'exploitation . . . . .	420	193
Situation . . . . .	3	7
Sol ou terrain . . . . .	6	8

## DES TERMES TECHNIQUES.

647

	SS	pages.
Sorbe . . . . .	206	96
Sous-bois . . . . .	452	247
Spongioles . . . . .	11	10
Strobile . . . . .	23	18
Superficie . . . . .	639	448

## T.

Taillis . . . . .	562	345
— simple . . . . .	563	346
— sous futaie ou composé . . . . .	563	346
Talus (couper en) . . . . .	567	348
Taux de placement . . . . .	410	184
Terrain . . . . .	6	8
Terre aquatique . . . . .	62	37
— chaude . . . . .	65	38
— forte . . . . .	55	35
— fraîche . . . . .	64	37
— franche . . . . .	59	36
— froide . . . . .	55	35
— glaise . . . . .	55	35
— humide . . . . .	63	37
— légère . . . . .	56	36
— maigre . . . . .	60	37
— marécageuse . . . . .	62	37
— substantielle . . . . .	60	37



	SS	pages.
Terre végétale . . . . .	5	8
Terreau . . . . .	5	8
Tétard . . . . .	624	428
Terres vaines et vagues . . . . .	441	214
Tire et aire (exploitation à) . . . . .	550	328
Touffes (plantation par) . . . . .	804	619
Traçante (racine) . . . . .	11	10
Trainants . . . . .	571	351
Trainaux (chemin à) . . . . .	534	207
Trippler . . . . .	712	534
Trochée . . . . .	568	348
Tronc . . . . .	402	177

## U.

Usance, coupe usée . . . . .	401	177
------------------------------	-----	-----

## V.

Variation . . . . .	9	9
Variété . . . . .	9	9
Vidange . . . . .	405	177
Vide (place vide) . . . . .	440	214
Vieille, écorée . . . . .	564	346
Volume absolu ou réel . . . . .	641	452

# TABIE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES.

### INTRODUCTION.

Définition de l'économie forestière, et parties qui la constituent, page 1. — Ce qu'on entend par culture des bois ou sylviculture, 2. — Différence entre la culture des bois et celle des champs, *ib.* — Trois conditions fondamentales de toute méthode d'exploitation : *production soutenue, régénération naturelle, amélioration progressive*, 3.

### LIVRE PREMIER.

#### Des climats, des sols, des essences.

DÉFINITIONS (§§ 1 à 15). Climat., page 7. = Climat géographique, — physique ou local, *ib.* = Situation, *ib.* = Exposition, 8. = Terre végétale; — terreau; — humus; *ib.* = Sols ou terrains, *ib.* = Arbre; — arbrisseau; — arbuste, *ib.* = Essence, — essences forestières, *ib.* = Espèce; — variété; — variation, *ib.* = Floraison : monoïque; — dioïque; — hermaphrodite; — polygame, 9. = Racines pivotantes; — traçantes; — essences pivotantes ou traçantes; — chevelu; — spongioles, 10. = Brin de semence ou brin; — rejet; — drageon, *ib.* = Recru; — repeuplement, *ib.* = Dénomination des bois suivant l'emploi. — A. Bois de feu ou de chauffage, façonné de quatre manières : quartiers, rondins, fagots, bourrées; — B. Bois d'œuvre, divisés en bois de service et en bois de travail ou d'ouvrage; — parmi ceux-ci, distinguer les bois de fente; — qualités nécessaires pour la fente. — Bois merrain, 11. = Panage, 12.

## CHAPITRE PREMIER.

## BUT ET DIVISION DE CE LIVRE.

ART. I<sup>er</sup>. *Des études qu'il embrasse et de leur ordre naturel* (§ 16). La base de la culture des bois doit être l'étude des climats, des sols, des essences; — l'étude des essences doit être précédée de celle des climats et des sols, 13.

ART. II. *De l'étude des sols et des climats* (§§ 17 à 19). Elle est accessoire, 14. = Marche de l'étude des climats, *ib.* = Marche de l'étude des sols, *ib.*

ART. III. *De l'étude des essences* (§§ 20 à 23). C'est ici l'objet principal; marche de cette étude, 15. = On n'énumèrera pas les caractères botaniques, 16. = On ne mentionnera ni arbrisseaux, ni arbustes, ni essences rares, *ib.* = Classement des essences en deux groupes : *bois feuillus* et *bois résineux*; — caractères distinctifs de chaque groupe, *ib.*

## CHAPITRE DEUXIÈME.

## DES CLIMATS.

ART. I<sup>er</sup>. *Du climat en général* (§§ 24 à 26). Influence générale du climat physique sur la végétation des bois, 19. = La situation influe de deux manières, *ib.* = L'élévation se manifeste par plusieurs effets; — la configuration donne lieu à distinguer les *climats de plaine* et les *climats de montagne*, 20.

ART. II. *Des climats de plaine* (§§ 27 à 30). Caractères de ces climats, 21. = Influences exercées sur le climat par la présence ou par l'absence des eaux et des forêts à la superficie terrestre, *ib.* = Influence de la nature du sol sur le climat, 22. = Caractères du climat des côtes, *ib.*

ART. III. *Des climats de montagne* (§§ 31 à 34). Caractères généraux, 22. = Trois situations : vallées, versants, plateaux; — influences climatériques favorables ou défavorables à la végétation; 1° dans les vallées; 2° sur les versants; 3° sur les plateaux, *ib.* = Influence des abris, 24. = Pays de coteaux, *ib.*

**ART. IV. De l'exposition (§§ 35 à 40).** Comment elle influe sur la végétation, 25. = *Est.* Température; — influences des saisons; — caractères de la végétation, *ib.* = *Nord.* Température; — humidité; — caractères de la végétation, 26. = *Ouest.* Température; — action des vents; — caractères de la végétation, *ib.* = *Sud.* Température; — gelées printanières; — orages; — caractères de la végétation, 27. = L'influence de l'exposition s'affaiblit en raison de l'élévation, *ib.*

## CHAPITRE TROISIÈME.

### DES SOLS.

**ART. I<sup>er</sup>. Du sol en général et de son action nutritive. (§§ 41 à 44).** Composition de la terre végétale, 28. = L'action du sol sur la végétation des bois considérée : sous le point de vue physique; — sous le point de vue chimique, *ib.* = *Physiquement*, le sol agit par sa profondeur, sa cohésion, son hygroscopicité, sa coloration, *ib.* = *Chimiquement*, il concourt à la nutrition, par les substances minérales, sels et oxydes qu'il renferme, et de plus il agit comme organe de transmission, 29.

**ART. II. Des principaux composants du sol (§§ 45 à 50).** Trois composants généraux : *L'argile, le calcaire, le sable*; — divers sels; — oxyde de fer, 30. = *Argile*; — ses propriétés, *ib.* = *Terres calcaires*; — leurs propriétés, 31. = *Propriétés négatives de la silice*, *ib.* = Conditions nécessaires pour que chacune de ces trois terres devienne fertile, *ib.* = *Effets de l'abondance du terreau*; — propriétés auxquelles ils sont dus, 32.

**ART. III. De la base minéralogique et de l'inclinaison (§§ 51 à 53).** Gisements qui reçoivent le nom de base minéralogique; — comment leur action se manifeste suivant qu'ils sont compactes ou schisteux, verticaux ou horizontaux; — leur influence sur le degré d'humidité, 33. = *Influence de l'inclinaison*; — les pentes douces sont favorables aux bois, et les bois maintiennent les terrains en pente, 34.

**ART. IV. Des diverses catégories de terrains (§§ 54 à 66).** Leurs dénominations se fondent sur les composants ou sur le degré d'humidité, 35. = *Catégories tirées des composants* : *Terre forte, glaise, froide*, *ib.* = *Terres légères, sablonneuses ou graveleuses*, 36. = *Terres marneuses, marne*, *ib.* = *Sable*

toutes les expositions, 56. = T. Sols calcaires ; — végète aussi dans les terrains secs et arides, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, au printemps ; — fruit mûr en septembre, quelquefois doux et comestible, surtout aux expositions très-chaudes, *ib.* = J. P. très-robuste ; — premier abri contre les ardeurs du soleil, 58. = F. Feuilles petites, persistantes ; — couvert très-épais, *ib.* = R. Racines pivotantes, traçantes et drageonnantes, *ib.* = C. D. Croissance très-lente ; — vit plusieurs siècles ; — dimensions médiocres, *ib.* = Q. U. Homogénéité, finesse du grain, densité, poids, durée ; — très-propre aux usages les plus précieux ; — chauffage très-estimé ; — emploi précieux de l'écorce, *ib.*

5° *Chêne liége*. Lieux d'habitation ; — deux variétés, 59. = C. S. E. Température élevée ; — plaines et région moyenne des montagnes ; — expositions méridionales et abritées, *ib.* = T. Sols granitiques ; — terrains légers, calcaires ; — ceux compactes ou humides lui sont contraires, 60. = F. F. Floraison monoïque, en mai ou juin ; — glands parfois doux, mûrs en automne ; — réussite fréquente, *ib.* = J. P. Le jeune plant n'est sensible qu'aux froids et aux gelées tardives ; — premier abri aux expositions chaudes, 61. = F. Feuilles petites, entières, nombreuses, persistantes ; — couvert épais, *ib.* = R. Racines pivotantes, traçantes et drageonnantes, *ib.* = C. D. Croissance assez active ; — vit plusieurs siècles ; — belles dimensions, 61. = Q. U. Poids, densité ; — usages précieux ; — écorce : liége mâle ; — démasclage ; — liége femelle ; — récolte en juin, juillet, août, 62.

6° *Chêne Kermès*. Lieux d'habitation, 63. — C. S. E. Température élevée ; — s'accommode de toutes les situations et expositions, *ib.* = T. Sols sablonneux et pierreux ; — peu exigeant, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, en mai ; — fertilité précoce et fréquente ; — glands mûrs au bout de 16 mois, 64. = J. P. Jeunes plants très-robustes, *ib.* = F. Feuilles persistantes et épineuses ; — couvert très-épais, *ib.* = R. Racines nombreuses, traçantes, drageonnantes, *ib.* = C. D. Croissance lente ; — peu de durée ; — très-faibles dimensions, *ib.* = Q. U. Qualités insignifiantes ; — insecte Kermès ; — écorce, 65.

ART. II. *Le hêtre* (§§ 122 à 130). Son importance ; — une seule espèce, 65. = C. S. E. Climat qu'il préfère ; — hauteur où il croît ; — influence de la situation suivant les contrées ; — influence des expositions, *ib.* = T. Ses répugnances, exigences et préférences, quant au sol, 66. = F. F. Fleurs monoïques,

en avril; — sujettes aux gelées; — fruit, faine; — semence lourde; — réussite rare; — maturité, en octobre; — fertilité, à 50 ans, 66. = J. P. Tempérament délicat; — abri prolongé, 67. = F. Feuilles abondantes; — couvert très-épais, *ib.* = R. Fortes; — traçantes; — drageonnant rarement, *ib.* = C. D. Marche de la croissance; — dimensions; — longévité, 68. = Q. U. Bois peu propre aux constructions, mais de bonne fente; — ses divers emplois; — dessiccation nécessaire; — qualité de son chauffage et de son charbon; — usage de la faine, *ib.*

ART. III. *Le châtaignier* (§§ 131 à 139). Une seule espèce en Europe, 69. = C. S. E. Climats tempérés ou chauds; — situations favorables ou contraires; — il redoute l'exposition du Sud; — gelées printanières, 70. = T. Sa végétation dans divers sols; — terres qui lui sont contraires; 71. = F. F. Fleurs monoïques, en juin; — fruit, châtaigne; — semence lourde; — maturité, en novembre; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Analogues aux jeunes chênes, 72. = F. Feuilles grandes; — couvert assez épais, *ib.* = R. Pivot; — s'enfonce à un mètre et plus; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide et longtemps soutenue; — dimensions de l'arbre; — exemples de longévité, *ib.* = Q. U. Excellente charpente; — cercles et échelas; — merrain; — chauffage inférieur; — charbon léger; — fruit excellent, 73.

ART. IV. *L'orme* (§§ 140 à 148). Très-rarement dominant; — espèces ou variétés nombreuses; — celles à petites feuilles sont plus estimées, 74. = C. S. E. Influences climatiques favorables ou contraires à l'orme; — lieux où on le rencontre; — les expositions qui lui conviennent diffèrent suivant les situations, 75. = T. Sols qu'il redoute; — sa végétation dans un sol frais et dans un sol humide, *ib.* = F. F. Fleurs hermaphrodites, en mars; — semence très-petite, mûre en juin; — conformation et dissémination; — réussite fréquente; — fertilité précoce, 76. = J. P. Tempérament robuste; — abri utile, *ib.* = F. Feuilles épaisses; — couvert assez épais, *ib.* = R. Double disposition; — drageons, *ib.* = C. D. Prompte croissance; — fortes dimensions; — grande longévité, 77. = Q. U. Propriétés et usages comme bois de service; — comme bois de travail; — usages précieux dus à sa fibre serrée et coriace; — qualité de son chauffage et de son charbon; — emploi de sa cendre; — de son feuillage, *ib.*

**Art. V. Le frêne (§§ 149 à 157).** Une seule espèce indigène, 78. = C. S. E. Climats qu'il préfère; — qu'il supporte; — sa végétation dans les situations élevées ou basses; — il craint l'exposition du Sud, *ib.* = T. Sols favorables; — sols contraires, 79. = F. F. Fleurs polygames, en avril; — semence légère, ailée; — maturité, en novembre; — époque de la dissémination, variable; — réussite annuelle; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Abri avantageux, *ib.* = F. Feuilles composées; — couvert léger, *ib.* = R. Double disposition; — 1 mètre d'enfoncement et 6 à 7 mètres d'extension horizontale; — drageons, 80. = C. C. Croissance rapide; — dimensions; — longévité, deux siècles, *ib.* = Q. U. Emploi comme charpente; — comme bois de travail; — usages spéciaux; — chauffage et charbon estimés; — emploi de l'écorce; — des cendres; — des feuilles, *ib.*

**Art. VI. L'érable (§§ 158 à 166).** Trois espèces, en forêt: érable sycomore, érable plane, érable champêtre, 81. = C. S. E. Exigences analogues à celle du frêne, *ib.* = T. Sols favorables; — sols contraires, 82. = F. F. Fleurs en avril et mai; — hermaphrodites, et accidentellement polygames; — semences légères, ailées; — maturité et dissémination en octobre, *ib.* = J. P. Abri nécessaire, *ib.* = F. Feuilles abondantes; — couvert épais, *ib.* = R. Disposition, extension et enfoncement; — drageonnement rarement, 82. = C. D. Erables sycomore et plane, croissance rapide; — dimensions; — longévité; — Erable champêtre, croissance plus lente; — dimensions moindres, 83. = Q. U. Bois exempt de vermoulure; — emploi pour le travail; — chauffage et charbon estimés; — cendres; — feuilles; — sève, *ib.*

**Art. VII. Le bouleau (§§ 167 à 175).** Deux espèces, différant seulement par des caractères botaniques peu essentiels, très-répandues; — rarement seul et dominant, 84. = C. S. E. Le bouleau supporte les climats très-froids et les montagnes élevées, préfère les climats tempérés et les expositions S.-E. et S.-O., 85. = T. Sols qu'il préfère, et ceux dont il se contente; — sa végétation dans les marais, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, à la fin d'avril; — semence ailée, très-légère; — maturité, fin d'août; — réussite annuelle; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Tempérament très-robuste, 86. = F. Feuilles petites; — couvert très-léger; — inconvénients qui en résultent, *ib.* = R. Traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance rapide; — durée de 80 à 90 ans, *ib.* = Q. U. Emploi rare dans la bâtisse; — bon bois de travail, exempt de gerçures et de vermoulure; — chauffage et charbon estimés; — écorce; — sève, 87.

**ART. VIII. *Le robinier faux acacia* (§§ 176 à 184).** Originaire d'Amérique; — acclimaté, 87. = C. S. E. Il craint les froids et les grands vents; — préfère les expositions chaudes, *ib.* = T. Sols favorables; — sols contraires, 88. = F. F. Floraison hermaphrodite, en juin; — fruit, gousse; — semence y adhérent; — maturité, en octobre; — dissémination, au printemps; — réussite fréquente; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. A garantir contre les froids, *ib.* = P. Feuilles petites; — peu de couvert, *ib.* = R. Disposition traçante, s'enfonçant quand le terrain le permet; — chevelu; — drageons, 89. = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — durée de 100 ans au plus, *ib.* = Q. U. Dureté, durée très-grande; — emploi comme bois de service; — comme bois de travail; — échalas; — gournables; — chauffage peu estimé; — feuilles, *ib.*

**ART. IX. *Le charme* (§§ 185 à 193).** Souvent mélangé, quelquefois dominant, 90. = C. S. E. Climats qu'il supporte; — situation qu'il préfère; — exposition qu'il redoute, *ib.* = T. Sols favorables; — convenables; — contraires, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, en mai; — semence petite, ailée, — maturité et dissémination, en octobre; — réussite annuelle; — fertilité à 30 ans, 91. = J. P. Abri contre le soleil, *ib.* = F. Feuilles moyennes; — couvert très-épais, *ib.* = R. Direction oblique; — un mètre d'enfoncement; — drageons, *ib.* = C. D. Marche de la croissance; — maximum à 70 ou 80 ans; — durée, 150 ans, *ib.* = Q. U. Densité égale; — dureté; — fibre coriace; — impropre à la charpente; — cannelures du tronc; — emploi comme travail; — chauffage et charbon de première qualité; — cendres; — feuillage, 92.

**ART. X. *L'alisier* (§§ 194 à 202).** Deux espèces, toujours secondaires : l'alisier blanc, l'alisier torminal, 93. = C. S. E. Ils supportent les froids; — prospèrent dans les climats tempérés, dans les plaines, sur les coteaux, et aux expositions de l'Ouest, de l'Est et du Sud-Est, *ib.* = T. Sols convenables; — favorables; — contraires, *ib.* = F. F. Floraison hermaphrodite; en mai; — fruit, baie; — maturité, en octobre; — dissémination, en hiver; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Abri utile, 94. = F. Feuilles grandes; — couvert assez complet, *ib.* = R. double direction; — tendance particulière; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance lente; — longévité; — dimensions, *ib.* = Q. U. Emploi comme bois de travail; — usages spéciaux; — chauffage et charbon estimés; — fruit, eau-de-vie, vinaigre, 95.



**ART. XI. *Le sorbier* (§§ 203 à 211).** Deux espèces, toutes deux secondaires : sorbier des oiseleurs, sorbier cormier, 95. = C. S. E. Le premier se trouve sur les plus grandes hauteurs, et réussit à toutes les expositions; — préférence du cormier, *ib.* = T. Le sorbier des oiseleurs ne craint que les sols humides; — le cormier est plus difficile, 96. = F. F. Floraison hermaphrodite, en mai; — forme des fruits; — maturité, fin de septembre; — dissémination, en hiver; — fertilité, à âge différent, *ib.* = J. P. Abri utile seulement au cormier, 97. = F. Couvert léger, *ib.* = R. Pivot; — 1<sup>m</sup>,33 d'enfoncement; — racines traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance lente; — longévité plus grande et dimensions plus fortes chez le cormier, *ib.* = Q. U. Bois dur et pesant, employé par les tourneurs, menuisiers et mécaniciens; — chauffage fort estimé; — écorce; — usages différents du fruit des deux sorbiers, *ib.*

**ART. XII. *Le micocoulier* (§§ 212 à 220).** Une seule espèce indigène; culture avantageuse, 98. = C. S. E. Les climats chauds et tempérés, les plaines et les élévations moyennes, et toutes les expositions conviennent au micocoulier, *ib.* = T. A peu près tous les sols, 99. = F. F. Fleurs polygames, en mai; — fruit petit, à noyau; — maturité, en novembre; — dissémination, au printemps; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Abri contre le froid, *ib.* = F. Feuilles grandes; — couvert assez léger, *ib.* = R. Pivot et racines traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance rapide; — longue durée; — dimensions, *ib.* = Q. U. Dureté et souplesse; — emplois divers; — chauffage estimé; — feuilles *ib.*

**ART. XIII. *Le cerisier* (§§ 221 à 229).** Trois espèces : cerisier commun, — à grappes, — mahaleb; — la première seule est importante, 100. = C. S. E. Il supporte les climats rudes, les situations élevées et toutes les expositions, 101. = T. Tous les sols, à l'exception de ceux humides, lui conviennent, *ib.* = F. F. Floraison hermaphrodite, en mai; — fruit, drupe, mûre en juin; — dissémination en août; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Abri nuisible, 102. = F. Feuilles grandes; — couvert léger, *ib.* = R. Traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — durée, 80 ans, *ib.* = Q. U. Métiers qui l'emploient : ébénistes, luthiers, etc.; — cercles; — chauffage et charbon; — merises, kirschwasser; — gomme, *ib.*

**ART. XIV. *L'aune* (§§ 230 à 238).** Deux espèces : l'aune

commun, l'aune blanc; — l'aune n'admet de mélange qu'avec le frêne, 103. = C. S. E. Il est assez indifférent sous ces trois rapports, *ib.* = T. Il aime les terrains aquatiques; — veut un sol frais, substantiel et divisé; — est avantageux dans les marais, 104. = F. F. Floraison monoïque, en mars; — fruit, cône; — maturité, en octobre; — dissémination, à l'entrée de l'hiver; — fertilité, à 15 ans, *ib.* = J. P. Abri inutile, 105. = F. Feuilles grandes et épaisses; — couvert incomplet; — effet qui en résulte, *ib.* = R. Traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — durée, 90 ans, *ib.* = Q. U. Charpente sous eau; — bon bois de travail; — chauffage recherché pour le four; — double supériorité de l'aune blanc; — cendres; — écorce; — feuilles, 106.

ART. XV. *Le tilleul* (§§ 239 à 247). Deux espèces : tilleul des bois, tilleul de Hollande, 107. = C. S. E. Ils supportent à peu près tous les climats et les situations élevées; — expositions préférées, *ib.* = T. Ils préfèrent les terrains sablonneux, profonds et frais, *ib.* = F. F. Floraison hermaphrodite, en juin et juillet; — fruit, petite noix; — maturité en octobre; — dissémination, à l'entrée de l'hiver; — fertilité précoce, 108. = J. P. Abri favorable, *ib.* = F. Feuilles abondantes; — couvert épais, *ib.* = R. Pivot très-prononcé; — 1 mètre 50 centimètres d'enfoncement; — racines traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance rapide; — dimensions; — exemples de la grande longévité du tilleul de Hollande, *ib.* = Q. U. Impropre à la charpente; — son emploi pour le travail; — exempt de gerçures et de vermoulure; — chauffage peu estimé; — emploi de son charbon pour la poudre; — écorce; — feuilles, 109.

ART. XVI. *Le peuplier* (§§ 248 à 256). Le tremble est le seul peuplier de nos forêts, 110. = C. S. E. Il prospère dans les climats tempérés, et préfère les expositions du Nord et de l'Est, *ib.* = T. Il est assez difficile sur le choix des sols; — ses préférences, 111. = F. F. Floraison dioïque, en mars; — semence très-petite; — maturité et dissémination, en mai; — fertilité à 20 ans; — réussite annuelle, *ib.* = J. P. Tempérament robuste; — causes de sa grande propagation, *ib.* = F. Feuillage très-léger; — couvert très-incomplet, 112. = R. Traçantes; — drageons, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — pourriture hâtive à l'intérieur, *ib.* = Q. U. Charpente en lieu sec et conduites d'eau; — son emploi comme bois de travail; — chauffage du four; — emploi du charbon pour la poudre; — écorce; — feuilles, *ib.*

**ART. XVII. *Le saule* (§§ 257 à 265).** Nombreuses espèces; — le marceau et le saule blanc sont seuls très-répandus en forêt, 113. = C. S. E. Le marceau prospère dans tous les climats; — les situations basses ou moyennes sont propices aux autres espèces, 114. = T. Tous les sols conviennent au marceau; — les sols frais et humides au saule blanc, 115. = F. F. Fleurs dioïques, en mars et avril; — semence petite; — son organisation; — maturité et dissémination, en mai et juin; — fertilité très-précoce; — réussite annuelle, *ib.* = J. P. Tempérament robuste; — l'essence est envahissante comme la précédente. *ib.* = F. Donne peu d'ombrage, *ib.* = R. Traçantes; — drageons, 116. = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — passé 60 ans, les saules se creusent, *ib.* = Q. U. Impropre à la charpente; — volige; — fente; — vannerie; — mauvais chauffage, sauf pour le four; — emploi de son charbon pour la poudre; — écorce; — cendres; — feuilles, *ib.*

**ART. XVIII. *Le platane* (§§ 266 à 274).** Une seule espèce, originaire d'Amérique; — acclimaté; — mérite d'être introduit en forêt, 117. = C. S. E. Plaines, lieux frais et abrités, *ib.* = T. Sols frais, même un peu humides, *ib.* = F. F. Fleurs monoïques, en avril et mai; — graine aigrettée, petite; — maturité et dissémination en automne; — fertilité vers 30 ans; — réussite fréquente, *ib.* = J. P. Un premier abri est utile, 118. = F. Feuilles grandes; — couvert épais, *ib.* = R. Longues, fortes et traçantes, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — durée: 200 ans, *ib.* = Q. U. Egal au hêtre pour le chauffage; supérieur pour le travail; — résistance à la pourriture, *ib.*

## CHAPITRE CINQUIÈME

### DES BOIS RÉSINEUX.

**ART. I<sup>er</sup>. *Le sapin* (§§ 275 à 283).** Seul et mélangé, 120. = C. S. E. Il préfère les climats tempérés; — ne craint pas les frimats; — sa région est entre 500 et 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer; — peut prospérer dans les plaines; — il souffre à l'exposition du Sud et se plaît au Nord et à l'Est, *ib.* = T. Il exige un sol divisé, un peu profond; — redoute les terrains aquatiques et marécageux; — croît souvent parmi les roches, 121. = F. F. Fleurs monoïques, en mai, placées vers la cime; — fruit, cône; — semence petite, ailée; — ma-

lurité, en octobre; — dissémination, en automne; — elle a lieu d'une façon particulière; — fertilité, vers 60 ans; — réussite biennale, 121. = J. P. Très-déliçats, abri prolongé, 122. = F. Courtes et étroites; — persistance, 3 ans; — couvert très-complet, *ib.* = R. Fortes; — pivot; — 1 mètre d'enfoncement; — les racines sont souvent anastomosées, et leur végétation solidaire, *ib.* = C. D. Croissance lente d'abord, rapide plus tard; — dimensions; — longévité, *ib.* = Q. U. Très-bonne charpente; — planches; — carcasses de meubles, etc.; — chauffage et charbon médiocres; — térébenthine de Strasbourg, manière de l'obtenir; — colophane; — éclairage; — salin, manière de l'obtenir; — potasse, 123.

— ART. II. *L'épicéa* (§§ 284 à 292). Seul et mélangé, 126. = C. S. E. Il supporte les frimas et les régions supérieures à celle du sapin; — craint, moins que celui-ci, les expositions chaudes, *ib.* = T. Même sol que le sapin; — il exige moins de fond; — supporte un sol humide et même tourbeux, *ib.* = F. F. Fleurs monoïques, en mai; — fruit, cône; — maturité, fin d'automne; — dissémination, au printemps suivant; — comment elle s'opère; — fertilité, vers 50 ans; — réussite biennale, *ib.* = J. P. Abri nécessaire à l'exposition du Sud, 127. = F. Feuilles plus petites que celles du sapin; — persistance de 3 à 7 ans; — couvert très-épais, *ib.* = R. Traçantes, *ib.* = C. D. Croissance plus rapide, mêmes dimensions et même durée que le sapin, 128. = Q. U. Mêmes usages que le sapin; — luthiers; — chauffage et charbon médiocres; — poix de Bourgogne; — mode d'extraction; — ses inconvénients, *ib.*

— ART. III. *Le pin sylvestre* (§§ 293 à 301). Seul ou mélangé, 129. = C. S. E. Climats tempérés, favorables; — pays froids, convenables; — plaines et pentes, favorables; — hautes montagnes, contraires; — il supporte toutes les expositions, *ib.* = T. Sol profond et léger, sable pur, favorables; — terres compactes, contraires; — sa végétation dans les parties humides ou tourbeuses, 130. = F. F. Fleurs monoïques, en avril ou mai; — fruit, cône; — semence ailée; — maturité, en novembre de la deuxième année; — dissémination, au printemps suivant; — fertilité, à 40 ans; — réussite biennale, 131. = J. P. Abri rarement utile, 132. = F. Feuilles longues; — persistance, 3 ans; — couvert léger, *ib.* = R. Fortes; — pivot; — 1 mètre d'enfoncement, *ib.* = C. D. Croissance rapide; — dimensions; — longévité, 2 siècles, *ib.* = Q. U. Mêmes usages que les deux

précédents; — sa supériorité: — emploi pour la mûture; — chauffage et charbon; — extraction du goudron, carbonisation des souches, 132.

ART. IV. *Le pin à crochets*. (§§ 302 à 310). Hautes régions des Alpes, des Pyrénées et du Jura; — tantôt seul, tantôt mêlé au pin sylvestre et au mélèze; — précieux pour reboiser les hautes montagnes, 134. = C. S. E. Climats secs et froids; — altitude: 1500 à 2500 mètres; — expositions méridionales, 135. = T. Indifférent sous ce rapport, 136. = F. F. Fleurs monoïques, en juin et juillet; — fruit, cône; — graine, comme celle du pin sylvestre; — mêmes époques de maturité et de dissémination; — fertilité précoce; — fruits abondants, *ib.* = J. P. Très-robustes; — supportent cependant un abri prolongé; — résistent aux plus grands froids, *ib.* = F. Feuilles raides et serrées; — couvert épais, 137. = R. Traçantes, *ib.* = C. D. Croissance très-lente, égale, longue; — dimensions, *ib.* = Q. U. Charpente estimée; — préférable aux autres résineux des Alpes, excepté le mélèze; — très-bon bois de travail; — chauffage très-estimé; — est peut-être propre à la mûture, *ib.*

ART. V. *Le pin maritime*. (§§ 311 à 319). Forêts considérables, 137. = C. S. E. Il appartient aux climats chauds; — croît dans l'Ouest, à Fontainebleau et à Paris; — craint les froids vifs; — se plaît dans les plaines et sur le bord de la mer, *ib.* = T. Sol médiocre et même purement quartzeux, mais profond; — exclut les terrains compactes et marécageux, 140. = F. F. Fleurs monoïques, en avril ou mai; — semence ailée, plus grosse que celle du sylvestre; — mêmes époques de maturité et de dissémination; — fertilité à 15 ans; — réussite fréquente, *ib.* = J. P. Abri parfois utile, *ib.* = F. Feuilles très-longues; — persistance, 3 ans; — couvert faible, *ib.* = R. Fortes et nombreuses; — pivot; — disposition particulière, 141. = C. D. Croissance très-rapide; — dimensions; — durée, 2 siècles en bon sol, et quand il n'est pas saigné, *ib.* = Q. U. Bois inférieur au pin sylvestre; — emploi pour pilotis et étais; — planches et échelas; — chauffage et charbon médiocres; — procédé pour l'extraction de la résine, *ib.*

ART. VI. *Le pin laricio* (§§ 320 à 328). Grandes forêts en Corse, 145. = C. S. E. Climat tempéré; — il réussit dans le Nord et l'Est de la France; — craint peu nos hivers; — vient à toutes les expositions, *ib.* = T. Sables gras, granitiques, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, fin de mai; — semence plus grosse

que celle du pin sylvestre, ailée; — mêmes époques de maturité et de dissémination, 146. = J. P. Tempérament robuste, *ib.* = F. Feuilles intermédiaires entre celles du sylvestre et du maritime; — couvert très-léger, *ib.* = R. Fortes et nombreuses, traçantes, *ib.* = C. D. Croissance très-prompte; — dimensions; — longévité, plusieurs siècles, *ib.* = Q. U. Charpente estimée; — bois de marine, mûre; — expériences à ce sujet; — autres emplois; — il est très-résineux, *ib.*

ART. VII. *Le pin noir* (§§ 329 à 337). Espèce très-voisine du *laricio*; — seule ou mélangée; — récemment introduite en France; — très-rustique, 148. = C. S. E. Plaines et montagnes jusqu'à 1000 mètres; — au-dessus, il languit; — réussit à toutes les expositions, 149. = T. Préfère les sols légers, secs et calcaires; — redoute les terres argileuses, humides, *ib.* = F. F. Semblable en tout au *laricio*, *ib.* = J. P. Très-robustes, 150. = F. Feuilles très-serrées; — couvert épais, *ib.* = R. Robustes, traçantes, *ib.* = C. D. Végétation rapide et soutenue; — dimensions; — longévité : 2 à 3 siècles, *ib.* = Q. U. Construction; — durée très-longue; — incorruptible sous l'eau; — chauffage et charbon estimés; — gemmage, *ib.*

ART. VIII. *Le pin d'Alep* (§§ 338 à 346). Répandu dans le Midi de la France, 151. = C. S. E. Exige un climat chaud; — redoute les froids; — aime les plaines, les côteaux et l'exposition du Sud, *ib.* = T. Sol médiocre, mais léger et sec, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, en mai; — graine ailée; — maturité, à la fin du second été; — dissémination dans la courant du troisième, 152. = J. P. Tempérament robuste dans le pays où il est indigène, *ib.* = F. Feuilles longues et très-fines; — couvert léger, *ib.* = R. Traçantes, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — fortes dimensions, *ib.* = Q. U. Charpente, menuiserie; — résine; s'extraît par les mêmes procédés que celle du pin maritime; — résine liquide, *ib.*

ART. IX. *Le pin pinier* (§§ 347 à 355). Arbre de l'Europe méridionale, 153. = C. S. E. Demande un climat chaud; — aime les plaines, les vallées, les bords de la mer et des fleuves, *ib.* = T. Léger et profond, sablonneux, mais frais, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, en mai et juin; — strobiles très-gros; — maturité, après 3 ans; — amandes grosses, comestibles, 154. = J. P. A étudier, *ib.* = F. Feuilles plus grandes et couvert plus épais que les autres pins, *ib.* = R. Fortes et pivotantes, *ib.* = C. D. Conjectures à former sur sa croissance et ses dimensions

possibles, 154. = Q. U. Charpente, planches, corps de pompes; — menuiserie, etc.; — fruit agréable à manger et donnant de bonne huile; — variété d'Italie à noyau plus tendre, 156.

ART. X. *Le pin cembro* (§§ 356 à 364). Seul ou en mélange, 156. = C. S. E. Arbre des grandes élévations et des pays froids; — se trouve sur les Alpes du Dauphiné et de la Provence; — y vient à toutes les expositions, *ib.* = T. Il se plaît dans les sols substantiels, frais, profonds et divisés; — supporte un terrain légèrement humide et pierreux, *ib.* = F. F. Floraison monoïque, en mai ou juin; — graine, amande moins grosse que celle du pinier; — maturité, après dix-huit mois, 157. = J. P. Doivent être garantis des chaleurs et surtout des gelées printanières, *ib.* = F. Touffu; — couvert épais, *ib.* = R. Un mètre d'enfoncement, *ib.* = C. D. Croissance très-lente; — durée, plusieurs siècles; — fortes dimensions, *ib.* = Q. U. Sculpture, menuiserie; — chauffage estimé; — fruit agréable; — bonne huile, 158.

ART. XI. *Le pin du lord Weymouth* (§§ 365 à 373). Exotique, acclimaté en France, 158. = C. S. E. Réussit dans toute la France, excepté dans le Midi; — préfère les régions un peu froides, *ib.* = T. Il craint les sols arides, compactes et marécageux; — prospère dans ceux qui sont humides et profonds, 159. = F. F. Floraison monoïque, fin de mai; — maturité et dissémination des graines seize mois après; — fertilité précoce, *ib.* = J. P. Abri utile; — analogie avec l'épicéa, *ib.* = F. Fin et léger; — peu de couvert, *ib.* = R. Pivot très-prononcé; — grande extension latérale, *ib.* = C. D. Croissance très-rapide; — grande durée; — dimensions très-fortes, *ib.* = Q. U. Aux Etats-Unis, son bois est ferme, léger, peu noueux; — propre à divers métiers; — charpente, constructions navales et mâture; — il est sujet à pourrir; — on ne peut encore juger les qualités de ceux qui ont crû en France; — térébenthine abondante; — soumis au résinage en Amérique, 160.

ART. XII. *Le mélèze* (§§ 374 à 382). Son importance; — il est à feuilles caduques; — se trouve seul ou en mélange, 161. = C. S. E. Originaire des hautes montagnes et des pays froids; — il demande une atmosphère sèche et froide; — dans les régions tempérées de la France, il lui faut les expositions du Nord et de l'Est, *ib.* = T. Il exige une terre divisée, fraîche et profonde; — craint les sols compactes ou humides et les sables trop légers, 162. = F. F. Fleurs monoïques, en avril ou mai; —



graine légère et ailée; — maturité, au bout de 6 mois; — dissémination, au printemps suivant; — fertilité précoce; — indice à tirer de l'abondance du fruit, 162. = J. P. Robustes dans leur climat; — ailleurs, abri utile, *ib.* = F. Feuilles petites; — couvert très-léger, *ib.* = R. Pivot; — un mètre d'enfoncement; — racines traçantes, 163. = C. D. Croissance très-prompte; — fortes dimensions; — durée, plusieurs siècles; — observations sur la marche de sa végétation dans les climats tempérés, *ib.* = Q. U. Il résiste à l'air et à l'humidité; — constructions civiles et navales; — divers métiers; — merrain et échalas; — chauffage et charbon médiocres; — térébenthine de Venise; — son extraction; — huile essentielle; — écorce, 165.

ART. XIII. *Le cèdre* (§§ 383 à 391). Originnaire d'Asie; — géant des conifères, 168. = C. S. E. Les forêts de cèdre sont situées à de grandes hauteurs sur le Liban; et à 1400 mètres en Afrique; — le cèdre réussit, en Europe, dans les climats tempérés; — dans le climat de Paris, il craint le froid dans sa jeunesse, *ib.* = T. Sols graveleux, secs et profonds, convenables; — terres compactes et marécageuses, contraires, 169. = F. F. Fleurs monoïques, en octobre; — maturité, 20 mois après; — dissémination, en hiver; — s'opère, comme celle du sapin, par la désarticulation des écailles, *ib.* = J. P. En France, délicats; — abri pendant six ou huit ans contre les froids, 170. = F. Feuilles nombreuses et touffues; — couvert épais, *ib.* = R. Pivot très-fort; — racines latérales nombreuses, *ib.* = C. D. Croissance lente d'abord, très-active ensuite; — dimensions énormes; — longévité considérable, *ib.* = Q. U. Incertitude et discussion à cet égard, *ib.*



## LIVRE DEUXIÈME.

**Principes fondamentaux de l'exploitation des bois.**

**DÉFINITIONS (392 à 402).** Révolution; — elle est figurée sur le terrain par les exploitations annuelles, 175. = Bois exploitable; — l'exploitabilité se modifie diversement, *ib.* = Accroissement; — annuel; — moyen, 176. = Rente, *ib.* = Possibilité; — rapport soutenu, *ib.* = Peuplement complet, 177. = Coupe, *ib.* = Assiette; — asseoir une coupe, *ib.* = Vidange, *ib.* = Coupe en usance; — coupe usée, *ib.* = Chablis; — volis; — quille, chandelier ou tronc, *ib.*

## CHAPITRE PREMIER.

## DE L'EXPLOITABILITÉ.

**ART. I<sup>er</sup>.** *De l'exploitabilité en général* (§ 403). Elle est la base du traitement des forêts; — elle se détermine d'après diverses considérations qui donnent lieu à quatre sortes d'exploitabilité : physique, absolue, relative, composée, 178.

**ART. II.** *De l'exploitabilité physique* (§ 404). Traitement qu'elle entraîne; — elle ne s'applique qu'à des cas exceptionnels, 179.

**ART. III.** *De l'exploitabilité absolue* (§§ 405 à 408). En quoi elle consiste; — à quoi elle répond, 179. = Elle donne lieu à la plus grande production matérielle possible; — démonstration de ce fait, 180. = On déduit de cette proposition quatre corollaires principaux, 182. = Indications naturelles propres à déterminer l'époque de l'exploitabilité absolue; — caractères de l'accroissement progressif; — de l'accroissement stationnaire; — de la décroissance; — du dépérissement, *ib.*

**ART. IV.** *De l'exploitabilité relative* (§§ 409 à 411). Elle est de deux sortes, 184. = L'exploitabilité relative à la rente la plus élevée a lieu lorsque le revenu est le plus grand possible, sans cesser d'être, avec le capital producteur, dans un rapport égal au taux ordinaire des placements en biens-fonds dans la localité, *ib.* = Composition du capital et du revenu à chaque âge; — accroissement annuel de ces valeurs; — conséquence

à en tirer pour déterminer la révolution; — cette exploitabilité convient surtout aux particuliers; — elle tombe avant l'époque de l'exploitabilité absolue, 185. = L'exploitabilité relative aux produits les plus utiles varie selon cette utilité, et tantôt devance, tantôt dépasse l'exploitabilité absolue, 187.

ART. V. *De l'exploitabilité composée* (§§ 412 à 414). Elle s'applique à deux cas dont chacun réunit une double condition, 188. = Combinaison du plus grand produit matériel avec la rente la plus élevée : exploitabilité convenable à l'intérêt particulier, *ib.* = Production de la matière à la fois la plus considérable et la plus utile : exploitabilité convenable à l'intérêt général; — elle se réalise avec succès dans les forêts de l'Etat, *ib.*

## CHAPITRE DEUXIÈME.

### DE LA POSSIBILITÉ.

ART. I<sup>er</sup>. *De la possibilité en général.* (§§ 415 à 417). Dans une forêt normale, elle serait égale à l'accroissement moyen, 190. = Dans la réalité, il faut la régler de manière à obtenir un rapport soutenu, 191. = Elle peut se fonder sur l'étendue ou sur le volume, *ib.*

ART. II. *De la possibilité par étendue* (§§ 418 à 421). Comment elle s'obtient; — les produits matériels sont entre eux comme les surfaces; — ce principe n'est pas toujours admissible, 191. = Comment il doit être modifié dans son application, 192. = Partage de la forêt en grandes divisions, ou séries d'exploitation; — avantages qui en résultent, *ib.* = La possibilité par étendue est souvent préférée, mais n'est pas toujours applicable, 193.

ART. III. *De la possibilité par volume* (§§ 422 à 428). Comment la fixation de cette possibilité se conçoit au premier abord, 194. = Difficultés qui se présentent; — une appréciation rigoureuse est impossible, mais n'est pas nécessaire au but qu'on se propose, *ib.* = Exposition de la méthode à suivre; — périodes; — parties aliquotes de la révolution; — décennies, 195. = Répartition des exploitations dans les périodes; — circonstances à examiner; — cas où les affectations des périodes peuvent être de contenances égales; — cas où les contenances doivent être inversement proportionnelles à la production; — on

calcule la possibilité sur l'affectation de la première période, 193. — Evaluation, au jugé, du volume actuel et de l'accroissement futur; — on estime l'accroissement pour tous les bois, mais seulement pour le milieu de la période; — il existe des procédés plus rigoureux; — facilité des rectifications, 197. — On procédera de même pour les périodes suivantes; — les inégalités, de période à période, ne seront pas assez fortes pour compromettre le rapport soutenu, 200. — Ce mode peut éprouver des modifications, *ib.*

## CHAPITRE TROISIÈME.

### DE L'ASSIETTE DES COUPES.

ART. I<sup>er</sup>. *De l'assiette des coupes en général* (§ 429). Ses difficultés et son importance; — elle s'appuie sur cinq règles, 201.

ART. II. *Première règle* (§ 430). Succession et forme des coupes; — inconvénients du désordre et de l'irrégularité des coupes; — avantages de la règle; — comment elle doit s'appliquer dans la pratique, 202.

ART. III. *Seconde règle* (§ 431). Disposition respective des coupes; — chaque coupe doit s'appuyer sur un chemin, un ruisseau ou sur la lisière de la forêt, 203.

ART. IV. *Troisième règle* (§§ 432 et 433). Orientation des coupes; — les vents du Nord et de l'Est ne sont pas aussi dangereux que ceux du Sud et de l'Ouest; — les réserves doivent être garanties des vents dangereux; — avantage particulier de la règle pour les bois à semences légères; — son importance spéciale pour les bois résineux; — cas d'exception tirés de la situation des forêts, 204. — Conservation, sur les lisières Sud et Ouest, d'un rideau protecteur en massif, 205.

ART. V. *Quatrième règle* (§ 434). Ordre des coupes en montagne; — danger de commencer par les plateaux; — avantages de la marche opposée; — nécessité d'assurer à chaque coupe un moyen direct de vidange; — chemins de voitures; — chemins à traîneaux; — lançoirs; — marche à suivre lorsqu'on ne peut assurer une vidange séparée à chaque coupe, 206.

ART. VI. *Cinquième règle* (§ 435). Forme à donner aux coupes en montagne, 210.

## LIVRE TROISIÈME.

## De l'exploitation des futaies.

**Définitions** (§§ 436 à 453). Futaie; — la régénération doit être naturelle, 213. = Futaie régulière; — quel traitement amène cet état, *ib.* = Futaie irrégulière; — causes de l'irrégularité, 214. = Clairière; *ib.* = Places vides, *ib.* = Terres vaines et vagues, *ib.* = Massif, *ib.* = Massif serré; — massif incomplet ou clairié; — massif entrecoupé, *ib.* = Fourré; — gaulis; — perchis, 215. = Bois blancs, mieux bois tendres; — bois durs, *ib.* = Morts-bois, 218. = Bois abrutis; — abrou-tissement; — le recépage y remédie, *ib.* = Recéper; — cas où cette opération se pratique, *ib.* = Bois en défends; — bois défensables, *ib.* = Réserves; — réserve de la coupe, 217. = Sous-bois, *ib.* = Coupe à blanc étoc, *ib.*

## CHAPITRE PREMIER.

## MÉTHODE DU REENSEMENCEMENT NATUREL ET DES ÉCLAIRCIES OU EXPLOITATION DES FUTAIES RÉGULIÈRES.

**ART. I<sup>er</sup>. Généralités** (§§ 454 à 458). En quoi consiste la méthode; — elle repose sur des faits naturels, 218. = Action du sol sur la germination; — conditions qu'il doit réunir, 219. = La lumière, inutile à la germination, est nécessaire à la jeune plante; — comment son action doit s'exercer, *ib.* = Lutte nécessaire qui s'engage entre les jeunes plants serrés en massif; — diminution du nombre des tiges et chute naturelle des branches basses; — avantages de cet état de choses au début; — ralentissement de croissance qui en résulte ensuite; — la nature conduit ainsi une forêt jusqu'à sa régénération, 220. = Comment doit être imitée la marche naturelle, et conditions à réaliser, 221.

**ART. II. Coupes de régénération** (§§ 459 à 464). Quatre conditions nécessaires réalisées par trois coupes, 222. = Coupe d'ensemencement; — conditions qui règlent la réserve; — la coupe d'ensemencement remplit les trois premières conditions de la régénération, *ib.* = Coupe secondaire; — son but; — comment on la dirige; — cas où elle se fait en plusieurs fois, 223. = Coupe définitive; — réserves qu'elle comporte; — ces réserves ne sont point destinées à procurer un ensemencement

tardif, 224. = Comment l'exposition et la nature du sol doivent influencer sur le nombre des réserves dans les deux premières coupes, 226.

ART. III. *Coupes d'amélioration* (§§ 465 à 470). Les bois tendres et les morts-bois s'introduisent toujours dans le repeuplement; — coupe de nettoisement; — on ne peut en préciser l'époque d'une manière absolue, 227. = Eclaircies périodiques; — trois points à établir, 228. = Sur quels sujets portent les éclaircies; — ne jamais interrompre le massif; — inconvénients d'une éclaircie trop forte aux différents âges; — éclaircie normale ou moyenne; — circonstances de sol, de situation et d'exposition où l'éclaircie peut être forte; — circonstances contraires où elle doit être faible, 229. = D'où dépend la fixation de l'époque de la première éclaircie; — elle est utile dès que le bois est à l'état de gaulis, 231. = Fixation de la période à laisser entre les éclaircies, 233. = Avantages des éclaircies périodiques : augmentation de produits; — ces produits accessoires ne tendent qu'à augmenter le produit principal; — les éclaircies améliorent la qualité du bois; — elles préservent les forêts de la multiplication des insectes, 234.

ART. IV. *Fixation de l'exploitabilité et de la possibilité dans les futaies* (§§ 471 et 472). L'exploitabilité doit être fixée à un âge de fertilité complète et suivant les principes établis dans le deuxième Livre, 235. = La possibilité doit se fonder sur le volume, 236.

ART. V. *Marche des exploitations dans une futaie régulière* (§§ 473 à 477). Utilité de l'examen de cette marche; — hypothèse : révolution de 100 ans, périodes de 20; — embrasser les produits principaux et les produits accessoires à obtenir, dans toute la forêt, pendant la durée de la première période, 236. = Coupes d'ensemencement pendant les premières années; — différentes coupes dans les années suivantes; — les coupes de régénération ne peuvent suivre une marche régulière, 237. = La possibilité par étendue, applicable, à la rigueur, aux coupes d'ensemencement, ne peut plus s'admettre dans les coupes suivantes; — la possibilité par volume permet seule d'opérer en raison des circonstances, 238. = La base de la possibilité est différente pour les coupes d'amélioration; — nécessité de leur imprimer une marche régulière; — leur appliquer la possibilité par étendue, 239. = Trois genres de coupes à faire annuellement dans une futaie normale, 240.

**ART. VI. Abatage, façonnage et vidange dans les futaies (§§ 478 et 479).** La meilleure saison pour l'abatage est l'hiver; — moment de le commencer; — avantages de cette saison pour la qualité du bois; — pour la vidange; — restrictions en ce qui concerne les essences résineuses, 241. = Ebranchement des arbres et autres précautions; — mode et époque de vidange; — ne point exagérer les mesures conservatrices, 242.

**ART. VII. Essences propres à la futaie (§ 480).** Ce traitement, nécessaire pour les bois résineux, n'est avantageux que pour un certain nombre de bois feuillus, 244.

## CHAPITRE DEUXIÈME.

### APPLICATION DE LA MÉTHODE DU REENSEMENCEMENT NATUREL ET DES ÉCLAIRCIES.

**ART. I<sup>er</sup>. Exploitation du chêne en futaie (§§ 481 à 483).**  
**E (1).** Il y a perte à la reculer jusqu'à 250 et 300 ans; — l'exploitabilité peut varier, suivant les sols, de 120 à 180 ans, 245. = **C. R.** Coupe d'ensemencement sombre; — son but; — le terrain se gazonne souvent et doit être remué; — ne pas retarder la coupe secondaire; — ni la coupe définitive; — quelques réserves sur cette dernière coupe; — branches gourmandes; — émondage; — inconvénients qu'il prévient, 246. = **C. A.** Nettoiement conforme aux règles générales; — serrer beaucoup le massif dans les premières éclaircies; — espacer davantage dans les dernières; — précautions à prendre, 251.

**ART. II. Exploitation du hêtre en futaie (§§ 484 à 486).**  
**E.** Elle tombe entre 80 et 140 ans; — cas où elle doit être abrégée, 252. = **C. R.** Coupe d'ensemencement sombre, pour un double motif; — fixation de l'époque de la coupe secondaire et comment elle doit s'opérer; — époque de la coupe définitive; — elle a lieu sans réserves, 253. = **C. A.** Conformément aux règles générales, 255.

(1) Les intitulés des paragraphes sont représentés par les abréviations suivantes :

**E.** Exploitabilité.

**C. R.** Coupes de régénération.

**C. A.** Coupes d'amélioration.

**ART. III. *Exploitation d'une futaie mêlée de chêne et de hêtre* (§§ 487 à 490).** Causes qui rendent ce mélange avantageux, 255. = E. On doit, en général, adopter la révolution convenable au chêne, 256. = C. R. Réserve nombreuse en chêne pour l'ensemencement; — prompt coupe secondaire nécessaire au chêne et souvent peu nuisible au hêtre; — coupe définitive en vue de la réussite du chêne; — empiétements du hêtre; — moyens d'y remédier, *ib.* = C. A. Comme dans le chêne pur; — favoriser le chêne dans les éclaircies, 258.

**ART. IV. *Exploitation du châtaignier en futaie* (§§ 491 à 493).** E. Révolution de 90 à 120 ans, 259. = C. R. Comme pour le chêne; — labour à donner parfois dans les coupes sombres, *ib.* = C. A. Soins particuliers dans les nettoiemens; — éclaircies comme pour le chêne, mais plus fréquentes, 260.

**ART. V. *Exploitation de l'orme en futaie* (§§ 494 à 496).** E. Révolution de 100 à 120 ans, 261. = C. R. Coupe d'ensemencement; — espacement de 4 à 6 mètres entre les branches des réserves; — cas où les vents seraient à craindre; — gazonnement; — coupe secondaire; deux ans après l'ensemencement; — coupe définitive: deux ans après la coupe secondaire; — cas où cette dernière peut être négligée, *ib.* = C. A. Conformes aux règles générales; — éclaircies fréquentes, 262.

**ART. VI. *Exploitation en futaie du frêne et des grands érables* (§ 497).** Futaie avantageuse; — révolution de 90 à 100 ans; — même traitement que pour le hêtre; — coupe secondaire plus prompte, 263.

**ART. VII. *Exploitation du charme en futaie* (§ 498).** Avantages de son mélange avec d'autres essences plus précieuses, 263.

**ART. VIII. *Exploitation du bouleau en futaie* (§ 499).** Il peut se traiter avantageusement en futaie; — révolution de 50 à 60 ans; — coupes de régénération: à blanc étoc; — labour du terrain; — éclaircies très-rapprochées, 264.

**ART. IX. *Exploitation du robinier en futaie* (§ 500).** Motifs pour le cultiver ainsi; — exploitabilité à 60 ou 70 ans; — motifs pour lui appliquer le traitement de l'orme, 265.

**ART. X. *Exploitation d'une futaie de sapin* (§§ 501 à 503).** E. Entre 100 et 140 ans; — circonstances qui la déterminent,

266. = C. R. Leur direction; — analogie avec le hêtre; — couvert de la coupe d'ensemencement plus épais; — coupe secondaire plus prompte et en plusieurs fois; — coupe définitive; — réserves, 267. = C. A. Massif serré dans les premières années; — cas où devra être appliquée l'éclaircie moyenne; — faible, 268.

ART. XI. *Exploitation d'une futaie mélangée de sapin et hêtre* (§ 504). Avantages du mélange; — conformité d'exigences et de traitement; — diversité de produits, 269.

ART. XII. *Exploitation d'une futaie d'épicéa* (§§ 505 à 512). E. Cas d'appliquer les différentes révolutions de 90 à 140 ans, 270. = C. R. Danger des vents; — quatre modes particuliers d'exploitation employés pour en préserver les coupes, 271. = Premier mode : bandes alternées; — ce mode présente quatre inconvénients principaux, *ib.* = Second mode : bouquets; — mêmes inconvénients que le précédent, et de plus, le désordre, 273. = Troisième mode (Hartig) : coupes à blanc étoc longues et étroites, sur différents points à la fois, *ib.* = Quatrième mode : application de la méthode naturelle; — coupe sombre, serrée; — supprimer quelquefois la coupe secondaire; — combiner ce mode avec le troisième, 274. = On paraît renoncer en Allemagne à la régénération naturelle des futaies d'épicéa qui, cependant, a été tentée avec succès en France, 276. = C. A. Comme pour le sapin, 278.

ART. XIII. *Exploitation d'une futaie mélangée de sapin et épicéa* (§ 513). Avantages de ce mélange; — empiétement de l'épicéa; — causes de cet inconvénient; — précaution pour le prévenir, 278.

ART. XIV. *Exploitation d'une futaie de pin sylvestre* (§§ 514 à 517). E. Cas d'appliquer la révolution de 80 à 90 ans; — en France, et dans les forêts de l'Etat, il faut, suivant les sols, exploiter entre 120 et 160 ans, 279. = C. R. Coupe d'ensemencement : 5 à 6 mètres entre les branches des réserves; — objection relative aux dégâts des vents et à l'envahissement des plantes nuisibles; — précautions à prendre; — coupe secondaire inutile; — opportunité de la coupe définitive prompte, 281. = Motifs qui font préférer la voie artificielle, 283. = C. A. Motifs qui déterminent à entreprendre la première éclaircie quand les jeunes bois sont encore à l'état de fourré, et à la pratiquer forte; — éclaircies fréquentes, 285.



**ART. XV. *Exploitation d'une futaie de pin à crochets*** (§§ 518 à 521). Le mode de traitement est encore incertain, l'essence n'étant bien étudiée que depuis peu d'années, 287. = E. Elle semble devoir varier, suivant l'altitude, entre 160 et 200 ans, *ib.* = C. R. Coupe d'ensemencement assez espacée, par bouquets; — coupe secondaire en une fois, suivie de près par la coupe définitive; — hâter le repeuplement; — nécessité de conserver un rideau épais aux parties supérieure et inférieure des pentes rapides; — ne pas faire les coupes d'un seul tenant, 288. = C. A. Eclaircies très-faibles jusqu'à la dernière; — ne pas faire la première avant l'âge de 40 ans, 290.

**ART. XVI. *Exploitation d'une futaie de pin maritime*** (§§ 522 à 526). E. On ne peut la fixer que par analogie; — dans le climat du midi, on aura intérêt à la retarder jusqu'à 120 ans, 291. = C. R. Motifs pour assimiler, sous ce rapport, le pin maritime au pin sylvestre, *ib.* = C. A. Devancer encore l'âge de la première éclaircie, et abréger la périodicité des suivantes, 292. = Mode de traitement et régénération des futaies de pin maritime exploitées en vue du gemmage, *ib.* = Coupes à blanc étoc avec semis artificiel, 294.

**ART. XVII. *Exploitation d'une futaie de pin laricio*** (§ 527). Exploitable de 100 à 130 ans et au delà, en vue des constructions civiles et navales; — traitement comme le sylvestre, 294.

**ART. XVIII. *Exploitation d'une futaie de pin noir*** (§ 528). Tous les auteurs s'accordent pour prescrire le même traitement que pour le pin sylvestre, 295.

**ART. XIX. *Exploitation d'une futaie de pin d'Alep*** (§ 529). Exploitable vers 80 ans; — traitement présumé analogue à celui de l'épicéa, 296.

**ART. XX. *Exploitation du pin pinier, du pin cembro et du pin du lord Weymouth*** (§§ 530 à 532). Les deux premiers n'existent qu'isolés; — les essais faits sur le troisième ne permettent pas encore d'en déduire des règles d'exploitation, 297.

**ART. XXI. *Exploitation du mélèze*** (§ 533). Comme le pin à crochets, 299.

**ART. XXII. *Exploitation du cèdre du Liban*** (§ 534). Les essais d'acclimatation sont à conseiller, 300.

## CHAPITRE TROISIÈME.

EXPLOITATION DES FUTAIES IRRÉGULIÈRES, QUI ONT ÉTÉ SOUMISES  
AU MODE DU JARDINAGE.

**ART. I<sup>er</sup>. Des forêts jardinées en général (§§ 535 et 536).** Mode du jardinage; — principe qu'on y suit; — état que présente une forêt jardinée; — inconvénients de la confusion d'âges; — on rencontre parfois de belles parties, 301. = Difficultés de la surveillance; — infériorité des produits en quantité et en qualité; — la croissance, accélérée dans la futaie régulière, est ralentie par le jardinage; — perte des produits accessoires; — arbres branchus et viciés, 303.

**ART. II. Des coupes de transformation (§§ 537 et 538).** But de ces coupes; — trois principaux états de peuplement à distinguer dans les forêts jardinées; — premier cas : coupe analogue à la coupe définitive; — second cas : coupe analogue à la coupe secondaire; — troisième cas : coupe analogue à la coupe d'ensemencement; — comment le sous-bois pourra servir; — son extraction; — recépage dans les bois feuillus; — observations particulières au hêtre, 304. = Les divers états des forêts jardinées ne sont que des nuances de ces trois principaux; — ce qui rend difficiles les coupes de transformation; — chercher toujours à égaliser la croissance, 309.

**ART. III. Marche des coupes de transformation (§§ 539 à 547).** Nécessité de continuer partiellement le jardinage; — deux exploitations distinctes, 311. = Révolution transitoire; — d'où en dépendra le terme; — périodes et affectations; — règles à observer; — difficultés d'égaliser les produits; — multiplier les séries et donner aux affectations des contenances égales; — hypothèse, 312. = Exploitation de la 1<sup>re</sup> période : coupes de transformation; — ébranchements; — jardinages dans les affectations des deux autres périodes; — comment ils s'opéreront pour chacune; — maintien des produits, 314. = Détermination de la possibilité; — la fonder sur le volume; — nécessité des vérifications, 315. = Quotité des produits du jardinage; — comment il faudrait opérer pour en déterminer la possibilité par volume; — inconvénients et incertitude de ce mode; — se reporter à l'ancien jardinage; — avantages qu'on y trouvera, *ib.* = La transformation est la chose principale; — la possibilité n'est ici

que secondaire, 318. = Exploitation des périodes 2 et 3 ; — augmentation et compensation de possibilité, 319. = Cas où le traitement a été déjà amélioré par des exploitations intelligentes, *ib.* = Impossibilité de prévoir tous les cas de futaie irrégulière, 322.

ART. IV. *Des cas où le jardinage doit être conservé* (§§ 548 et 549). Nécessité de maintenir le jardinage ; sur les sommets élevés où le repeuplement naturel est difficile, afin de conserver un abri aux parties inférieures ; — sur les versants abruptes ; — dans certains bois de particuliers ou des communes, 322. = Règles à suivre pour établir un jardinage rationnel ; — division en parcelles ; — ordre et périodicité du jardinage ; — possibilité fondée sur le volume ; — principes qui devront présider à la pratique du jardinage, 324.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

### EXPLOITATION DES FUTAIES IRRÉGULIÈRES QUI ONT ÉTÉ SOUMISES AU MODE DIT A TIRE ET AIRÉ.

ART. I<sup>er</sup>. *De l'état de ces forêts en général* (§§ 550 à 552). En quoi consiste le mode à tire et airé consacré par l'ordonnance de 1669 ; — résultats de ce mode, 328. = Comment il se présentait parfois un repeuplement de bonnes essences ; — ce cas, le plus heureux, était le plus rare, 330. = Etat de ces futaies ; — but du traitement actuel de ces forêts, 331.

ART. II. *Des coupes de transformation* (§§ 553 à 557). Quatre catégories à distinguer dans ces forêts : 1<sup>o</sup> vieilles futaies ; 2<sup>o</sup> perchis ; 3<sup>o</sup> gaulis et fourrés ; 4<sup>o</sup> parties ruinées, 332. = Appliquer aux vieilles futaies le traitement des futaies régulières, *ib.* = Perchis ; — dans quel état on les trouve ; — réserves ; — cas où elles sont en petit nombre ; — cas où elles sont nombreuses et rassemblées ; — élagage à pratiquer parfois ; — cas où il vaut mieux laisser dépérir les réserves ; — bois blancs ; — cas où il faut les couper sans exception ; — cas d'en réserver ; — éclaircies, *ib.* = Gaulis et fourrés ; — extraction des bois blancs et des réserves ; — répéter les nettoiemens, 335. = Parties ruinées ; — cas où les bois blancs devront être essouchés ; — cas où ils devront être enlevés par nettoiemment ; — abatage de vieux arbres, 336.

**ART. III. Marche des coupes de transformation (§§ 558 à 561).** Séries; — conserver les anciennes; — composition des séries à former, 337. = La marche des coupes pourrait se régler comme dans la futaie régulière; — exploitations qui auraient lieu, durant la 1<sup>re</sup> période, dans chaque affectation; — comment se réglerait le repeuplement des parties ruinées; — cette marche compromettrait le rapport soutenu; — ses inconvénients, *ib.* = Moyen d'y obvier; — mettre en réserve les parties les plus âgées; — révolution transitoire de courte durée; — coupes de transformation, dans les perchis et dans les gaulis et fourrés, par conténances égales; — les produits de ces coupes seront assez abondants; — ne pas fixer d'avance la révolution définitive, 339. = Ces généralités devront se modifier dans des cas nombreux, 341.

---

## LIVRE QUATRIÈME.

## De l'exploitation des taillis.

*Définitions* (§§ 562 à 569). Taillis; — régénération par rejets et par drageons, 345. = Taillis sous futaie ou composé; — taillis simples, 346. = Baliveaux; — baliveaux de l'âge; — baliveaux modernes; — baliveaux anciens; — vieilles écorces; — sens précis de ces divers termes, *ib.* = Couvert et ombrage; — distinction entre ces deux termes; — ils s'entendent aussi de la surface couverte ou ombragée, 347. = Ravaler, 348. = Couper en pivot; — en talus, *ib.* = Cépée ou trochée, *ib.* = Ramiers, *ib.*

## CHAPITRE PREMIER.

## MÉTHODE DU TAILLIS SIMPLE.

ART. I<sup>er</sup>. *Généralités* (§§ 570 et 571). Peu ou point de réserves; — exception dans les forêts de l'Etat, 349. = Conditions de l'existence et de la durée des taillis, 350.

ART. II. *Essences propres au taillis* (§ 572). Les bois feuillus peuvent seuls être traités en taillis; — le hêtre est impropre à ce mode de traitement; — quelques arbrisseaux méritent attention; — favoriser les bonnes essences, 351.

ART. III. *Fixation de l'exploitabilité dans les taillis* (§§ 573 et 574). Inconvénients des révolutions trop longues ou trop courtes; — limites générales; — l'exploitabilité absolue, renfermée entre ces limites, doit être appliquée, 352. = Données sur l'exploitabilité des taillis; — cas d'appliquer, selon les sols et les essences, la révolution de 30 à 40 ans; — celle de 20 à 25 ans; — celle de 15 à 20 ans; — celle de 5 à 10 ans, 354.

ART. IV. *Fixation de la possibilité dans les taillis* (§ 575). La baser sur la contenance; — les contenance pourraient être proportionnelles; — généralement on les prend égales, 355.

ART. V. *Saison la plus convenable pour la coupe des taillis* (§§ 576 et 577). Inconvénients de la coupe en automne et en hiver; — en temps de sève, 356. = Epoque à préférer selon les localités, 357.

**ART. VI. *Mode d'abatage des taillis*** (§ 578). Instruments bien tranchants; — couper rez terre; — forme à donner aux souches; — cas de couper dans le jeune bois; — procédé à appliquer aux essences drageonnantes, 358.

**ART. VII. *Façonnage et vidange dans les taillis*** (§§ 579 et 580). Les opérer avant l'apparition des rejets; — dans quels sols le retard est surtout à craindre, 359. = Cas où la vidange peut s'opérer avant le temps de séve; — places de dépôt; — avantages de créer de bonnes routes forestières, 360.

**ART. VIII. *Examen des dispositions que renferme le cahier des charges des adjudications de coupes*** (§§ 581 et 582). Texte : — A. Délais d'abatage; — B. Mode d'abatage; — C. Délais de façonnage; — D. Délais de vidange; — E. Délais nécessités par les circonstances locales, 361. = Ces exceptions doivent être soumises par les agents locaux à la sanction de l'Administration; — examen de ces dispositions; — *a.* Délai d'abatage trop reculé; — il faudrait fixer aussi le commencement de l'abatage; — *b.* Exceptions à observer pour le mode d'abatage; — *c.* Inconvénients d'un trop long délai pour le façonnage; — mesures propres à l'abrégé; — *d.* Avantages et inconvénients des délais de vidange trop reculés, 363.

## CHAPITRE DEUXIÈME.

### MÉTHODE DU TAILLIS COMPOSÉ OU SOUS FUTAIE.

**ART. I<sup>er</sup>. *Généralités*** (§§ 383 et 384). Avantages qu'on veut réaliser par ce mode, 368. = Il faut considérer ici non-seulement l'exploitabilité de chacun des éléments, mais encore le choix, le nombre et la distribution des baliveaux; — chercher à les concilier le mieux possible, *ib.*

**ART. II. *Exploitabilité des taillis sous futaie*** (585 à 587). Impossibilité de soumettre le sous-bois à de courtes révolutions, 370. = Plusieurs auteurs allemands sont d'un avis contraire; — réfutation, 371. = L'exploitabilité de la réserve doit se déterminer d'après la qualité du propriétaire; — elle devient le régulateur du balivage, 372.

**ART. III. *Choix des baliveaux*** (§§ 588 à 590). Sujets à pré-

féder sous le rapport de leur origine ; — de leur végétation, 373 ;  
 — de leur essence, 374 ; — de leur forme, 375.

**ART. IV. Nombre des baliveaux (§§ 591 à 594).** Il doit varier selon les essences, les sols et les expositions ; — l'essence influe en raison du plus ou moins de couvert qu'elle procure, ou qu'elle supporte ; — un sol fertile permet des réserves nombreuses et avancées en âge ; — un sol médiocre, joint à une exposition chaude, exige que le taillis soit ombragé, mais peu couvert, 376. — Nécessité de quelques données à l'égard du balivage ; — marche suivie dans les expériences sur ce sujet, 378. — Les arbres ne doivent couvrir que du tiers au sixième du terrain ; — avantages du balivage normal de Cotta, et comment on doit l'appliquer, 379. — Balivage normal ; — il assure entre le taillis et la futaie un rapport convenable, 381.

**ART. V. Distribution des baliveaux (§§ 595 et 596).** Cas d'une surface plane ; — d'une surface accidentée ; — inconvénients de réserver plusieurs anciens sur le même point ; — places où ils conviennent le mieux, 383. — Difficultés pour arriver à un balivage convenable, 384.

## CHAPITRE TROISIÈME.

### TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR ENTREtenir LES TAILLIS EN BON ÉTAT.

**ART. I<sup>er</sup>. Repeuplements artificiels (§§ 597 et 598).** Nécessité de ces opérations après l'exploitation ; — disparition du chêne dans les taillis, 386. — Expédient proposé par Hartig ; — ses inconvénients ; — préférer le semis ou la plantation avec recépage ; — extraire les vieilles souches, les bois blancs et les morts-bois ; — essences à introduire dans les taillis, 387.

**ART. II. Nettoiements et éclaircies (§§ 599 et 600).** Avantages des nettoiements ; — époques à préférer, 390. — Age auquel il convient d'éclaircir ; — sur quoi porte l'éclaircie ; — une ou deux éclaircies selon la durée de la révolution ; — un particulier gagnera à les multiplier, 391.

**ART. III. Elagage des baliveaux (§§ 601 à 603).** Formation de branches gourmandes sur la tige des arbres qu'on isole ; — inconvénients qui en résultent ; — moment d'entreprendre l'élagage ; — comment il devra se répéter ; — manière d'y procé-

der; — saison à choisir; — l'élagage, même onéreux, doit être exécuté, 392. = Suppression des branches sèches et des branches latérales nuisibles; — considérations qui doivent guider dans cet enlèvement, 394. = Importance de l'élagage, 395.

## CHAPITRE QUATRIÈME.

### DU BALIVAGE DES TAILLIS SELON L'ORDONNANCE RÉGLEMENTAIRE DU CODE FORESTIER.

**ART. I<sup>er</sup>.** *Texte de l'ordonnance (§ 604), Art. 70 établissant le nombre des baliveaux à conserver, 396.*

**ART. II.** *Examen de ces dispositions et conséquences qui en découlent (§§ 605 et 606). But de l'article; — vues utiles dans lesquelles il a été rédigé; — inconvénients de l'état de choses qu'il consacre; — ils naissent de deux objets principaux; — le traitement prescrit doit amener la destruction du taillis sous futaie, 397. = Démonstration : hypothèse; — calcul du couvert qui s'ensuit; — deux expédients suffiront pour remédier à l'état ainsi produit; — inconvénients de l'un et de l'autre, 399.*

**ART. III.** *Conclusion (§ 607). L'art. 70 ne doit pas être abrogé tout de suite; — il doit et peut l'être par des propositions d'aménagement; — importance d'une discussion du balivage dans les procès-verbaux d'aménagement, 402.*

## CHAPITRE CINQUIÈME.

### APPLICATION DES DEUX MÉTHODES D'EXPLOITATION EN TAILLIS.

**ART. I<sup>er</sup>.** *Exploitation du chêne en taillis (§§ 608 et 609). Propriétés de la souche; — de l'écorce; — utilité générale des réserves; — nécessité des repeuplements artificiels, 404. = Ecorcement; — époque et mode; — coupure circulaire au pied des arbres; — soins à prendre des écorces; — perte en volume; — elle est compensée et au delà; — perte de la première sève; — résultats qu'elle peut avoir, 405.*

**ART. II.** *Exploitation du hêtre en taillis (§§ 610 à 613).*



Danger de l'exploiter selon le mode ordinaire; — inconvénients de couper dans le jeune bois, 408. — Mode particulier proposé par Hartig; — comment il s'applique aux taillis qui ont déjà été exploités, 409. — Le hêtre se perd dans le taillis; — il est le plus souvent remplacé par les bois blancs; — complication et inconvénients des moyens proposés par Hartig; — préférer le mode de la futaie; — en cas d'impossibilité, le taillis composé, 410. — Furetage adopté dans l'ancien Morvan; — en quoi il consiste; — on revient plusieurs fois sur les coupes dans une révolution; — nécessité des repeuplements artificiels; — dégâts causés par l'abatage et le façonnage; — perte de produits qui en résulte; — il n'est pas opportun de chercher à étendre ce mode, 412.

ART. III. *Exploitation du châtaignier en taillis* (§ 614). Avantages de cette exploitation; — motifs pour ne réserver de baliveaux que sur les lisières; — culture du terrain après chaque exploitation, 414.

— ART. IV. *Exploitation de l'aune en taillis* (§ 615). Ce régime convient à l'aune; — ne pas compter, pour la régénération, sur le semis naturel; — ne réserver de baliveaux qu'en vue de leurs usages; — coupe d'hiver nécessaire dans les marais profonds, 415.

— ART. V. *Exploitation du robinier faux acacia en taillis* (§ 616). Avantages de cette exploitation; — circonstance qui la rend difficile; — point de réserves, 416.

ART. VI. *Exploitation des taillis mélangés* (§ 617). Les taillis sont presque toujours mélangés; — propriétés favorables au taillis chez différentes essences; — essences dont le voisinage est nuisible; — comment les essences doivent être groupées, 417.

ART. VII. *Exploitation des taillis d'arbrisseaux* (§ 618). Ne pas les mêler avec les arbres; — arbrisseaux qui méritent l'attention; — révolution de 5 à 10 ans; — taillis simple; — menus-taillis, 418.

## CHAPITRE SIXIÈME.

## DU SARTAGE.

(§§ 619 à 623). En quoi consiste le sartage ; — localités où il est pratiqué ; — courte révolution, 420. = Détails de l'opération du sartage ; — instruments, précautions et moyens employés ; — effets et avantages du sartage dit à feu courant, 421. = Sartage à feu couvert ; — en quoi il consiste ; — il est moins avantageux que le premier ; — il est nuisible dans les pentes rapides ; — il permet un balivage, 424. = Repeuplements après le sartage, 426. = Localités propres au sartage, 427.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

## DE L'ÉTÈTEMENT ET DE L'ÉMONDAGE.

ART. I<sup>er</sup>. *Généralités* (§§ 624 et 625). En quoi consistent ces opérations ; — rejets produits et leur exploitation, 428. = L'étêtement est inférieur à l'émondage pour l'utilité de la tige, et supérieur pour celle des rejets ; — hauteurs différentes auxquelles il s'opère suivant les situations, *ib.*

ART. II. *Essences propres à l'étêtement et à l'émondage* (§ 626). Toutes ne sont pas avantageuses, 430.

ART. III. *Exploitabilité de ces bois* (§ 627). Révolution de trois, six et dix ans, 430.

ART. IV. *Saison la plus convenable à l'étêtement et à l'émondage* (§ 628). Mars et avril ; — coupe à la fin de l'été pour l'emploi du feuillage, 431.

ART. V. *Mode d'abatage* (§ 629). Ne plus couper rez tronc quand les sujets vieillissent ; — tranche nette et oblique à l'horizon, 431.

ART. VI. *Avantages des têtards et des arbres émondés* (§ 630). Soutien des rives ; — produits ; — ces plantations n'enlèvent rien à la culture, 432.

## LIVRE CINQUIÈME.

## Des exploitations de conversion.

## CHAPITRE PREMIER.

## CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

(§ 631). But de ces exploitations ; — on peut concevoir trois conversions, ou la conversion de trois sortes de forêts ; — question préalable à examiner, 437.

## CHAPITRE DEUXIÈME.

EXAMEN COMPARÉ DES TROIS PRINCIPALES MÉTHODES  
D'EXPLOITATION.

ART. I<sup>er</sup>. *Énoncé de la question et données employées pour sa solution* (§ 632). Comment la question peut se formuler ; — quatre objets à considérer pour la résoudre, 439.

ART. II. *De la quantité des produits en matière* (§§ 633 et 634). Les taillis produisent moins que les futaies ; — expériences de Hartig ; — rapport qui en résulte et ses modifications, 440. = Position du taillis composé sous le rapport de la production en volume, 441.

ART. III. *De la qualité des produits matériels* (§§ 636 à 637). Elle est relative à l'emploi ; — l'emploi est de deux genres : bois de feu et bois d'œuvre, 442. = Bois de feu ; — qualités qu'il doit réunir ; — résultats des expériences sur l'âge où les bois ont acquis ces qualités ; — cas où les futaies sont supérieures ou égales aux taillis, sous ce rapport, *ib.* = Bois d'œuvre ; — comment la comparaison doit s'établir ; — qualités que doit présenter le bois d'œuvre ; — opinions diverses des savants sur la question ; — utilité réelle des baliveaux ; — accidents et défauts ; — supériorité des bois des futaies éclaircies, 444.

ART. IV. *Du revenu* (§§ 638 à 649). A ne considérer que les produits, les futaies donneraient le plus grand revenu, 446. = Cette solution ne peut convenir qu'à un propriétaire impérisable comme l'Etat ; — un particulier doit faire acception du capital superficiel ; — formuler la question sous ce point de vue ; — marche à suivre pour la résoudre, 447. = Hypothèse la

plus favorable possible à l'intérêt du propriétaire; — composition des produits annuels (en contenance); — choix des plus fortes données pour les produits d'éclaircies, 449. = Composition du capital superficiel; — tableau faisant connaître le volume de l'hectare moyen dans chaque affectation, et celui de toute la superficie, 450. = Produit annuel en volume de la forêt; — le capital superficiel est égal à quarante-deux fois le revenu, et représente un placement à environ deux et un tiers pour cent, sans tenir compte du fonds; — avantages que présente la destruction de la futaie, 453. = Opinion de M. de Dombasle, 454. = Vérification de cette assertion; — hypothèse d'une augmentation exagérée dans les prix des bois; — tableau des données et des résultats, 455. = Valeur des coupes de régénération déduite de ce tableau; — fixation de la valeur des éclaircies; — appliquer à leurs produits séparés l'hypothèse d'augmentation des prix; — tableau de cette échelle de production; — total pour le revenu de toute la forêt, 457. = Le revenu, dans cette hypothèse, n'est encore que de trois pour cent, le capital foncier négligé; — les prix supposés ne sauraient garantir la conservation de la forêt; — calcul du bénéfice qui résulterait de sa destruction, 459. = L'augmentation de valeur du bois diminuera les chances de conservation par des particuliers, au lieu de les accroître, 461. = Examen des taillis simples et composés; — les taillis simples n'exigent qu'un capital superficiel peu élevé par rapport à leur revenu; — la position du taillis composé est intermédiaire, *ib.* = Conclusion de la discussion; — rang qu'on doit assigner à chaque méthode d'exploitation, pour l'Etat; — pour les particuliers, 463.

**ART. V. De l'influence des différentes méthodes d'exploitation sur la fertilité du sol (§§ 650 à 654).** Les bois influent sur le sol de deux manières; — comment sont produits ces effets, 463. = Hors le cas de révolutions très-longues, la futaie améliore constamment le sol, 464. = Localités où le taillis ne nuit pas au sol; — localités où il le détériore, 465. = Le taillis composé participe sous ce rapport des deux autres méthodes, 466. = La méthode de la futaie ne convient pas seulement aux bons sols; — application des essences aux terrains; — cas où le taillis doit être rejeté, *ib.*

**ART. VI. Conclusion (§§ 655 à 662).** Dédutions à tirer des démonstrations précédentes, 467. = *Forêts de l'Etat.* La futaie convient à l'intérêt général; — l'Etat doit se proposer la conversion des taillis composés, 468. = Obstacles à une mesure géné-

rale ; — ne point froisser les intérêts actuels, 468. = But qu'il faut atteindre dans une conversion en futaie ; — de quel point de vue il faut considérer les forêts qu'on y destine ; — envisager la possibilité pour un bassin de consommation ; — cas d'opérer, ou seulement de préparer la conversion, 469. = Importance secondaire des autres genres de conversion, 471. = *Forêts communales*. On doit y conserver les futaies, mais on ne peut espérer d'en créer immédiatement, *ib.* = Il faut y perfectionner le taillis sous futaie, 472. = *Forêts particulières*. Préférer généralement le taillis simple ou composé, selon les circonstances, et, pour les bois résineux, les révolutions les plus courtes, 473.

## CHAPITRE TROISIÈME.

### CONVERSION DES FUTAIES.

ART. I<sup>er</sup>. *Conversion d'une futaie en taillis simple* (§ 663). Deux états de peuplement à distinguer ; — exemple ; — cas d'une futaie irrégulièrement exploitée, 475.

ART. II. *Conversion d'une futaie en taillis composé* (§§ 664 à 666). Fixer la révolution et les opérations à entreprendre ; — régler le balivage, 476. = Composition de la réserve dans la partie à exploiter tout de suite en taillis, 477. = Composition de la réserve dans la partie à régénérer tout de suite par la semence, *ib.*

## CHAPITRE QUATRIÈME.

### CONVERSION DES TAILLIS SIMPLES.

ART. I<sup>er</sup>. *Conversion d'un taillis simple en taillis composé* (§ 667). Opération identique à celle qu'on a décrite au § 665, 479.

ART. II. *Conversion d'un taillis simple en futaie* (§§ 668 à 673). Adopter pour la révolution transitoire le terme de l'ancienne révolution ; — abréger la révolution convenable à la futaie, 479. = Méthode destinée à prévenir l'abaissement trop sensible de l'ancienne production, 480. = Partage de la révolution en périodes, et de la série en affectations ; — nature des exploitations durant chaque période, et état du peuplement à son expiration, 481. = On parvient, par l'application de cette méthode, à une gradation convenable de l'âge des bois dans la série, et à y introduire artificiellement des essences d'élite,

483. = Traitement analogue et plus facile, si l'on avait à convertir plusieurs séries contiguës, 484. = Taillis exploités à 20 ou 25 ans, 485.

## CHAPITRE CINQUIÈME.

### CONVERSION EN FUTAIE DES TAILLIS COMPOSÉS.

ART. I<sup>er</sup>. *Généralités* (§ 674). Etat que présentent les taillis composés, soumis au régime forestier; — bigarrure qu'on y remarque; — abondance d'anciennes réserves dans les taillis domaniaux; — difficulté de décrire tous les peuplements divers; — division en deux grandes catégories; — taillis sous futaie réguliers; — leur état; — taillis irréguliers; — états principaux, a, b, c, d, 486.

ART. II. *Conversion des taillis sous futaie réguliers* (§§ 675 à 679). Pratique des coupes préparatoires décrites plus haut; — traitement des réserves; — conserver les modernes; — les anciens quand ils sont nécessaires; — et, par exception seulement, les vieilles écorces et les réserves branchues; — élagage de ces dernières; — considérer l'époque où le massif dont elles font partie reviendra en tour d'exploitation, 489. = *Marche des coupes préparatoires*. La révolution transitoire doit satisfaire à deux conditions principales; — elles sont, en général, remplies par une révolution transitoire égale à celle du taillis, 490. = Possibilité par étendue; — division de la révolution transitoire en deux sous-révolutions; — avantages importants de cette mesure; — assiette et délimitation de toutes les coupes sur le terrain; — appréciation des chances de durée des anciens qu'on réserve, 491. = Etablissement d'exploitations de taillis, parallèlement aux coupes préparatoires; — avantages de cette mesure, 492. = Tâche à laisser à nos successeurs, 494.

ART. III. *Conversion des taillis sous futaie irréguliers* (§§ 680 à 682). Quatre états divers à distinguer: a, b, c, d; — concilier deux conditions essentielles, 495. = Détermination de la révolution transitoire et partage en périodes; — composition des affectations correspondantes; — nature des exploitations durant chaque période et dans chaque affectation; — état de ces affectations à l'expiration de chaque période, 496. = Cas où la conversion s'appliquerait à plusieurs séries de taillis composé, 499.

## LIVRE SIXIÈME.

## Des repeuplements artificiels.

*Définitions* (§§ 683 à 689). Semis, 503. = Plantation, *ib.*  
 = Bouture, *ib.* = Marcotte, *ib.* = Semences échauffées, 504.  
 = Semis en plein; — semis partiel, *ib.* = Repiquer, *ib.*

## CHAPITRE PREMIER.

## CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

(§§ 690 et 691). L'emploi des moyens artificiels est souvent indispensable pour la régénération; — clairières et vides dans les forêts; — création de bois par les particuliers; — reboisement des montagnes et des landes; — substitution d'essences, 505.  
 = Le semis est principalement applicable en grand; — cas divers où la plantation doit être préférée, 506.

## CHAPITRE SECOND.

## DES SEMIS.

ART. I<sup>er</sup>. *Des connaissances qu'il faut posséder* (§ 692). Six notions principales pour bien opérer les semis, 509.

ART. II. *De la récolte et de la conservation des semences* (§§ 693 et 694). Préférer les semences provenant d'arbres bien sains et d'âge moyen; — temps à choisir; — manière de récolter les semences lourdes; — les semences légères, 510. = Etaler les graines et les remuer souvent; — moyens d'empêcher la germination et la pourriture; — le desséchement; — l'échauffement, 511.

ART. III. *Des moyens de reconnaître la qualité de la graine* (§§ 695 et 696). Nécessité de l'examen des semences pour déterminer la quantité à employer; — inconvénients d'un semis trop dru ou trop peu abondant; — épreuve des graines par la germination; — par l'ouverture des graines, 512. = Fraudes des marchands; — précautions contre l'humectation des semences; — mélange des graines de pin sylvestre et d'épicéa; — épreuve pour s'en assurer; — inconvénients qui résultent de ce mélange, 514.

**ART. IV. De la préparation du terrain (§§ 697 à 707).** But de l'opération; — comment elle doit s'effectuer, selon les terrains, 516. = Trois modes principaux de labour, 518. = *Labour en plein*. Avantages du labour à la charrue; — terrain où il doit s'employer; — terrains où la houe doit être préférée; — le labour en plein ne peut se pratiquer dans les pentes, 519. = *Labour par bandes alternées*. En quoi il consiste; — comment il se pratique en plaine; — en montagne; — avantages de ce mode de labour, et inconvénients auquel il peut donner lieu, 520. = *Labour par places, trous ou pots*. Comment il s'opère; — cas où il est avantageux; — saison où doivent se pratiquer ces divers modes de travaux suivant les circonstances, 522. = *Écobuage*. En quoi il consiste; — ses deux principaux résultats; — quatre effets principaux des cendres, selon M. de Candolle; — quatre sortes de terrains où l'écobuage est utile, 523. = L'écobuage pratiqué comme le sartage à feu courant; — avantages de ce mode; — terrains où il devra être pratiqué ou interdit, 525. = *Assainissements*. D'où proviennent les eaux à éconduire, 526. = Débordements; — moyens d'y remédier; — travaux qui rentrent dans les attributions du forestier, 527. = Marécages formés par des eaux sans écoulement; — moyens d'assainir ceux dont les eaux sourdent dans le marais même; — cas où elles viennent d'une source plus élevée, 528. = Ne pas repeupler tout de suite les terrains assainis, 529.

**ART. V. De la saison la plus convenable aux semis (§ 708).** Époque indiquée par la nature; — exception pour les semences lourdes; — différence entre un semis naturel et un semis artificiel; — préférer le printemps pour les essences résineuses; — motifs, 529.

**ART. VI. Des quantités de semence à employer (§ 709).** Circonstances qui modifient ces quantités; — proportions à observer dans les semis partiels, 531.

**ART. VII. De la manière de semer (§§ 710 à 713).** Deux objets principaux à observer, 533. = Procédé pour ensemençer uniformément, *ib.* = Comment les graines se recouvrent; — elles doivent s'enterrer plus ou moins selon leur nature et la nature du sol, 534. = *Du repiquement*. En quoi il consiste; — ses avantages et dans quels lieux il s'emploie; — instruments; — plantoir; — description et manière d'employer deux plantoirs usités en Allemagne, et appliqués, l'un aux terres fortes, l'autre aux terres légères, 535.



## CHAPITRE TROISIÈME.

APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES AU SEMIS DES ESSENCES  
LES PLUS IMPORTANTES.

**ART. I<sup>er</sup>. Semis du chêne (§§ 714 à 716).** R. C. (1). Ne pas ramasser les premiers glands tombés; — premier mode de conservation: tas coniques; — deuxième mode: sifos ou fossés; — troisième mode: dans l'eau; — quatrième mode: dans le sable; — l'expérience est favorable au premier et au quatrième mode, 538. — E. G. Caractères d'une bonne graine; — signes de l'altération; — épreuve par l'eau; — par le poids, 540. — E. S. Marche à suivre dans un terrain en plaine, compacte et découvert; — cultures à y pratiquer; — comment la graine doit être recouverte; — mélange de céréales; — couper les chaumes à une certaine hauteur; — labour à préférer dans les sols légers ou en pente; — levée du plant; — cas de partager le semis en deux saisons; — quantités de glands à employer par hectare, 544.

**ART. II. Semis du hêtre (§§ 717 à 720).** R. C. Comme le gland; — procédé de conservation indiqué par Hartig, 543. — E. G. Comme pour le gland; — goût du fruit; — poids de la graine, 544. — E. S. Abri indispensable; — semis ou plantation auxiliaire; — cas des pentes rapides; — repiquement de la faine; — comment le semis doit être recouvert; — levée de la semence; — quantité de faïnes à employer, *ib.* — Mode particulier indiqué par Cotta; — entourer de terre la tige des plants naissants; — plantation de hêtres cotylédonaire à Compiègne, 546.

**ART. III. Semis du châtaignier (§§ 721 à 723).** R. C. Comme le gland; — préférer la stratification dans le sable, 546. — E. G. Comme le gland et la faine; — ne pas considérer la graine.

(1) Les initiales en grands caractères représentent les intitulés des paragraphes du texte, de la manière suivante :

R. C. Récolte et conservation.		E. S. Exécution du semis.
E. G. Examen de la graine.		

seur du fruit, 549. = E. S. Bien nettoyer le sol; — bandes alternées et double culture; — repiquement dru; — pour créer un taillis, repiquement par trous ou pots; — l'abri est inutile; — comment le semis doit être recouvert; — levée du plant; — quantité de semence à employer, *ib.*

ART. IV. *Semis de l'orme* (§§ 724 à 726). R. C. Cueillir à la main; — ne pas laisser en tas; — semer immédiatement, 551. = E. G. Caractères que doit présenter la graine au toucher, à l'odorat et au goût; — poids qu'elle doit avoir, *ib.* = E. S. Labour par bandes alternées ou par trous carrés; — premier abri à donner au plant par de l'orge ou de l'avoine; — cas d'une pente rapide; — recouvrir très-légèrement; — levée du plant; — quantité de semence à employer, 552.

ART. V. *Semis du frêne* (§§ 727 à 729). R. C. Cueillir à la main; — précautions à prendre contre le dessèchement; — procédé avantageux à suivre dans ce but, 553. = E. G. Couleur et consistance de l'intérieur de la graine; — son poids, 554. = E. S. Bandes alternées ou trous carrés; — abri par des céréales; — précautions contre les plantes nuisibles; — comment doit se recouvrir la semence; — levée du plant; — quantité de semence à employer, *ib.*

ART. VI. *Semis de l'érable* (§§ 730 à 732). R. C. Cueillir à la main; — conserver en tas ou dans le sable; — semer dès le premier printemps, 555. = E. G. Couleur et consistance de la graine; — son poids, *ib.* = E. S. Comme le frêne; — semer au printemps; — quantité de semence à employer, 556.

ART. VII. *Semis du bouleau* (§§ 733 à 735). R. C. Cueillir à la main; — cas où l'on peut couper les rameaux; — semer tout de suite, 556. = E. G. Amande farineuse, suc laiteux; — poids, 557. = E. S. Labour partiel; — mode de semer; — temps à choisir et à prendre; — levée du plant; — quantité de graine, *ib.*

ART. VIII. *Semis du robinier (faux acacia)* (§§ 736 à 738). Cueillir à la main; — comment les graines se détachent et comment on les sépare des gousses; — les conserver en tas, 558. = E. G. Couleur et consistance de la graine, 559. = E. S. Semis partiel; — sol bien nettoyé; — recouvrir légèrement; — garnir le sol de mousse ou de feuilles mortes; — semer au printemps; — levée du plant; — quantité nécessaire, *ib.*

**ART. IX. *Semis du charme*** (§§ 739 à 741). R. C. Récolter à la main; — avec la gaule et des toiles par un temps calme; — conservation comme pour le frêne, 559. = E. G. Amande blanche et fraîche; — noyau plein; — poids, 560. = E. S. Comme pour le frêne; — enterrer davantage; — quantité à employer, *ib.*

**ART. X. *Semis de l'alisier, du sorbier et du micocoulier*** (§ 742). Ils se sèment en pépinière; — récolte et manière de semer; — à quelle profondeur enterrer les différentes graines; — levée tardive des plants; — soins que réclame le micocoulier; — repiquement préparatoire et plantation définitive, 561.

**ART. XI. *Semis de l'aune*** (§§ 743 à 745). R. C. Cueillir de bonne heure, à la main; — cas de couper les rameaux; — comment s'obtient la graine; — la conserver en tas ou dans l'eau, 562. = E. G. Couleur, consistance et odeur de la graine; — son poids, *ib.* = E. S. Difficultés; — labour partiel; — écobuer et gratter seulement la terre; — ne pas enterrer la graine; — levée du plant; — quantité nécessaire, 563.

**ART. XII. *Semis du sapin*** (§§ 746 à 748). R. C. Cueillir à la main, étendre et remuer; — cribler; — désailement; — entasser peu la graine, 564. = E. G. La juger à la vue, au toucher et à l'odorat; — poids, 565. = E. S. Difficultés; — cas où ce semis peut s'employer; — repiquement de la semence; — comment elle doit être couverte; — quantité à employer; — époque du semis et levée du plant, *ib.*

**ART. XIII. *Semis de l'épicéa*** (§§ 749 à 751). R. C. Époque de la récolte; — cas de la hâter ou de la retarder; — extraction des graines; — description des appareils qui l'opèrent: 1° par une chaleur artificielle; — 2° par la chaleur du soleil; — désailement; — avantages et inconvénients, 567. = E. G. Épreuve par la vue, le toucher et l'odorat; — poids, 572. = E. S. Labour par bandes ou par pots; — ménager quelque abri; — enterrer à peine la graine; — levée du plant; — quantité à employer, *ib.*

**ART. XIV. *Semis du pin sylvestre*** (§§ 752 à 754). R. C. Comme l'épicéa; — l'extraction de la graine s'opère par les mêmes procédés, mais plus particulièrement à l'aide de la chaleur artificielle; — désailement; — conservation, 574. = E.

G. Comme pour l'épicéa; — infériorité des graines blanches; — poids, 575. = E. S. Labour comme pour l'épicéa; — creuser au delà de la terre de bruyère; — recouvrir comme pour l'épicéa; — levée du plant; — mode de semer les cônes; — avantages et inconvénients; — quantité nécessaire, *ib.*

ART. XV. *Semis du pin maritime* (§§ 755 à 757). R. C. Comme l'épicéa et le pin sylvestre, 577. = E. G. Graine plus grosse que celle du sylvestre, colorée de gris et de brun mat, et, du reste, mêmes caractères, *ib.* = E. S. Les différents modes de culture, et, en particulier, le labour à la charrue, sont applicables à la préparation du sol; — enterrer davantage; — quantité de semence à employer; — extension et importance de la culture de cette essence en Sologne et dans les départements de l'Ouest; — mémoires et notices à consulter, 578.

ART. XVI. *Semis du pin laricio et du pin d'Alep* (§§ 758 à 760). R. C. Comme pour le sylvestre et le maritime, 581. = E. G. Mêmes caractères que le sylvestre; — couleur et grosseur différentes, *ib.* = E. S. Comme pour le sylvestre; — enterrer davantage; — quantité à employer, *ib.*

ART. XVII. *Semis du pin pinier et du pin cembro* (§§ 761 à 763). R. C. Cueillir les cônes à la main; — étendre les graines ou les laisser dans les cônes, 582. = E. G. Noyau plein; — couleur, goût et odeur de l'amande; — poids, 583. = E. S. Repiquement de la graine; — transplantation; — levée du plant, *ib.*

ART. XVIII. *Semis du pin du lord Weymouth* (§§ 764 à 766). R. C. Etendre et retourner les cônes; — employer promptement la graine, 583. = E. G. Mêmes caractères que le sylvestre; — couleur, 584. = E. S. Comme le pinier et le cembro; — couverture de la graine, *ib.*

ART. XIX. *Semis du mélèze* (§§ 767 à 769). R. C. Comme le sylvestre; — modérer la chaleur pour l'extraction des graines; — les employer promptement, 584. = E. G. Mêmes caractères que le sylvestre; — couleur et poids, 585. = E. S. Mêmes règles que pour l'épicéa; — semer en pépinière, vu la cherté de la graine; — quantité nécessaire; — levée du plant, *ib.*

ART. XX. *Semis du cèdre du Liban* (§ 770). Cueillir les cônes en août ou septembre, selon la température; — extraire la graine au moment de l'employer, en laissant séjourner les

cônes dans l'eau; — sécher la graine au soleil si on veut la conserver; — semer en pots; — transplantation préparatoire; — attendre la huitième année pour la transplantation définitive, 586.

ART. XXI. *Des semis mélangés* (§§ 771 à 775). Trois cas principaux d'y avoir recours, 587. = Pour la création des forêts mélangées, se reporter aux livres précédents, *ib.* = Choix des essences destinées à en abriter d'autres; — extraction de l'essence supplémentaire, 588. = Précautions et soins à prendre dans le cas du mélange de graines pour cause d'économie, et comment on fera dominer l'essence la plus précieuse, 589. = Cas de séparer les graines pour semer, et cas où on peut les mélanger d'abord, *ib.*

## CHAPITRE QUATRIÈME.

### DES PLANTATIONS.

ART. I<sup>er</sup>. *Des qualités que doivent offrir les plants* (§§ 776 et 777). Etat que doivent présenter les racines; — conditions que doit réunir un plant de haute tige; — un plant de basse tige, 590. = Cas d'employer les plants de haute tige; — préférer généralement les basses tiges; — les meilleurs plants sont ceux qui ont été élevés en pépinière; — les basses tiges peuvent seules être prises en forêt; — de quels endroits il faut tirer les plants; — âge le plus convenable pour la reprise des basses tiges, selon les essences; — la création d'une pépinière est une économie, 591.

ART. II. *De la culture des plants en pépinière* (§§ 778 à 783). Choix du terrain; — inconvénients d'un terrain trop gras ou humide; — d'un terrain maigre et de mauvaise qualité; — choisir un terrain de fertilité moyenne; — emplacements à éviter ou à préférer, 592. = Rendre la terre parfaitement meuble; — division du terrain en plates-bandes; — clôture; — ouvrir des sillons ou rigoles; — remplir ces rigoles de terreau préparé à l'avance; — nécessité d'exhausser les espaces intermédiaires, 594. = Semer au printemps dans les rigoles, très-dru; — recouvrir très-légèrement; — repiquement; — deux méthodes pour prévenir le développement exagéré du pivot, 596. = Soins à apporter dans la culture des plants de haute tige, 598. = Arrosements; — comment on doit les pratiquer; —

irrigations, 598. = Soins à prendre pour prévenir l'invasion et le développement de la mauvaise herbe, 599.

**ART. III. De la saison la plus convenable à la plantation (§ 784).** Deux saisons : automne et printemps ; — avantages de la plantation en automne ; — cas où il faut préférer le printemps, 599.

**ART. IV. De l'espacement à donner aux plants (§§ 785 à 788).** Utilité de l'état de massif ; — concilier ce principe avec l'économie ; — de quelles circonstances dépend l'espacement, 601. = Espacement ordinaire pour les basses tiges ; — pour les hautes tiges ; — principes à cet égard, 602. = Disposer régulièrement les plants ; — quatre tracés différents ; — comment en les exécuter ; — avantages de la plantation par files ou allées, 603. = Tableau des quantités de plants à employer par hectare, suivant le deuxième et le troisième tracé, 604.

**ART. IV. De la confection des trous (§§ 789 à 791).** Les proportionner aux racines ; — les modifier suivant l'état du sol, 605. = Comment, en creusant les trous, on dispose les différentes couches de terre, 606. = Ouvrir les trous plus ou moins longtemps d'avance, suivant le sol, 607.

**ART. VI. De l'extraction des plants (§§ 792 à 794).** Ménager les racines et les tiges ; — mode d'opérer : tranchées parallèles aux rigoles ; — précautions, 607. = Deux bêches demi-circulaires à employer pour la transplantation en mottes ; — elles servent aussi à faire les trous, 608. = Extraction des hautes tiges ; — manière d'y procéder, 609.

**ART. VII. Du transport des plants (§ 795).** Paniers ou brouettes pour le transport des plants en mottes ; — garantir les tiges de tout frottement, et les racines du contact de l'air ; — emballer les plants arrachés, 609.

**ART. VIII. De la taille des plants (§§ 796 à 801).** Lésion inévitable des racines par l'extraction, et interruption du rapport entre les racines et la tige ; — double but de la taille des plants, 611. = Comment on ampute les racines lésées ; — comment on les ravive ; — en conserver autant que possible, *ib.* = Taille indispensable de la tige ; — principes à cet égard ; — difficultés ; — tâtonnement auquel on est réduit, 612. = Procédé du recépage ; — avantages du plant recépé sur le plant taillé ; — difficultés pour celui-ci de rétablir l'équilibre entre la tige et

les racines; — cette difficulté n'existe pas pour le premier, 613. = Objection contre le recépage quand on veut créer des futaies; — elle est réfutée par la pratique; — plantations dans la forêt de Compiègne; — comment il se forme un maître jet, et comment les rejets faibles ne tardent pas à périr et à disparaître; — pour créer des futaies, préférer les basses tiges, et les tiges plus fortes pour les taillis, 614. = La taille est nuisible aux résineux; — précautions à prendre en leur enlevant quelques branches; — préférer des basses tiges très-jeunes; — s'abstenir de pratiquer le recépage des jeunes plants de hêtre, 616.

ART. IX. *De la mise en terre des plants ou plantation proprement dite* (§§ 802 à 805). — Profondeur à laquelle il faut planter: — enterrer davantage dans les sols légers et secs; — moins dans les sols humides, 617. = Comment on place le plant; — répandre d'abord la bonne terre végétale; — soins à prendre pour en bien remplir toutes les petites cavités; — placer ensuite les couches suivantes; — comment on tasse la terre; — opération simplifiée pour les tiges faibles; — instruments convenables, 618. = En quoi consiste la plantation par touffes; — éducation en pépinière; — extraction et division en touffes; — comment se font les trous; — principaux avantages de ce mode; — succès obtenus, 619. = Utilité d'un arrosage immédiat quand il est praticable; — emploi des pierres pour maintenir l'humidité, pour tasser le sol et comme abri; — soins à prendre dans la plantation en mottes, 620.

## CHAPITRE SIXIÈME.

### DES BOUTURES.

(§§ 806 à 809). Leur emploi borné aux saules et au peuplier; — dans quel terrain elles trouvent leur application; — deux espèces de boutures, 622. = Ce que c'est qu'un plançon; — comment il se plante dans les lieux aquatiques, et comment dans les sols plus fermes; — cas de donner des tuteurs aux plançons; — c'est avec les plançons qu'on forme les têtards; — le peuplier ne reprend pas de cette manière, 623. = En quoi consiste la bouture à bois de deux ans; — longueur à lui donner et comment s'opèrent les sections; — comment on plante les boutures dans un sol meuble, et comment dans un sol ferme; — comment on traite les boutures en pépinière, 624. = Saison convenable pour faire les boutures, 625.

## CHAPITRE SEPTIÈME.

## DES MARCOTTES.

(§§ 810 à 812). Le marcottage s'applique à tous les feuillus; — il est fort utile dans les taillis; — manière d'y procéder quand les tiges sont faibles; — les perches plus fortes sont préférables; — de quelle manière on opère le couchage de ces dernières; — à quel âge on les sèvre, 626. = Comment il faut traiter la souche dont on marcotte un certain nombre de sujets, 628. = Saison du marcottage, 629.

## CHAPITRE HUITIÈME.

## TRAVAUX D'ENTRETIEN À EXÉCUTER DANS LES REPEUPLEMENTS ARTIFICIELS.

(§§ 813 à 819). Le succès d'un semis ou d'une plantation n'est assuré qu'après 5 ou 6 ans, et quand le jeune repeuplement va bientôt couvrir le sol; — jusque-là, les travaux d'entretien sont nécessaires, 630. = En quoi consistent ces travaux; — distinction à faire entre le sarclage et le binage, 631. = Application de ces travaux dans les semis; — 1° ceux de bois feuillus, exécutés en plein, sont moins exposés à l'envahissement de l'herbe; — utilité de quelques sarclages dans les premières années; — causes qui rendent cette invasion plus redoutable dans les semis partiels; — nécessité des sarclages et des binages fréquents, surtout pour certaines essences; — ces travaux peuvent préserver aussi les jeunes plants des premières gelées de l'automne; — 2° les semis de résineux sont, à cause des sols où ils s'exécutent, moins exposés à l'envahissement des herbes; — mais d'autant plus à celui des myrtilles, bruyères, etc.; — les sarclages seuls sont à conseiller; — on peut fauciller les herbes et tondre les arbustes, *ib.* = Dans les plantations, les sarclages seraient insuffisants, et il faut recourir aux binages qui facilitent l'accès de l'air et de l'humidité aux racines, 634. = Époque la plus favorable pour les sarclages et les binages; — les renouveler parfois en septembre, 635. = Les travaux d'en-



retien sont trop rarement pratiqués, malgré l'avantage considérable qu'ils procurent; — motifs, 635. — Époque à laquelle il convient de procéder aux regarnis dans les plantations; — plants auxquels il faut accorder la préférence pour cet objet; — les regarnis se font dans les semis par voie de plantation; — on attend, pour y procéder, que le semis ait atteint quelque développement, 636.

---

## APPENDICE.

---

Renvois du n° 67, page 40.

### CHÊNE CHEVELU.

**Le *chêne chevelu*, commun en Orient, ne se trouve en France qu'à l'état très-disséminé ; il forme, dans le Doubs, l'essence dominante d'une partie de la forêt communale de Saint-Vit. On le rencontre mélangé au rouvre et au pédonculé dans le Jura, la Vienne, la Loire-Inférieure, la Provence, etc.**

**CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION. — C'est un arbre des climats doux et tempérés ; cependant, dans ces derniers, il ne dépasse pas au Nord le département du Doubs. Il habite les plaines et les parties inférieures des montagnes et recherche l'exposition de l'Est et du Sud-Est.**

**TERRAIN. — Il n'est pas difficile sous le rapport de la nature du sol et prospère encore là où le *chêne pédonculé* languit.**

**FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles; les fleurs paraissent fin avril ou commencement de mai, avec les feuilles, en retard d'environ 15 jours sur le pédonculé. Le gland ne mûrit qu'à l'automne de l'année qui suit celle de la floraison et tombe aussitôt après. La fructification est généralement constante.

**JEUNES PLANTS.** — Le tempérament est robuste et les jeunes plants peuvent se passer d'abri.

**FEUILLAGE.** — Les feuilles généralement très-découpées ne donnent qu'un couvert léger.

**RACINES.** — Le chêne chevelu a un enracinement pivotant et profond; quand le terrain le permet, à l'âge de 4 ou 5 ans, le pivot mesure près d'un mètre.

**CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance de cet arbre paraît être plus active que celle du rouvre et du pédonculé; à 50 ans, il atteint, dans le Doubs, un mètre de circonférence; mais il y est exposé à de nombreuses gélivures qui empêchent de le laisser arriver à de plus grandes dimensions. On en connaît cependant qui mesurent 25 m. de haut sur 2 m. 50 de circonférence. Sa longévité est prolongée.

**QUALITÉS ET USAGES.** — Le bois du chêne chevelu rappelle celui du tauzin; il est dur et très-nerveux, mais chargé d'aubier, exposé à se gercer, peu apte à la fente. Les gélivures, qu'il présente fréquemment dans le Doubs, le rendent impropre aux grandes constructions.

Son chauffage est de très-bonne qualité; on l'estime à

l'égal de celui du hêtre. L'écorce est préférée à celle du pédonculé et du rouvre pour le tannage. En France, les glands, toujours âpres, ne peuvent servir qu'à l'engraissement des porcs.

H. N.

---

#### CHÊNE OCCIDENTAL.

Longtemps confondu avec le chêne liège, le *chêne occidental* se rencontre peu dans la région méditerranéenne et habite particulièrement les bords de l'Océan depuis Bayonne jusqu'à la Gironde. Le long du golfe de Gascogne, il forme de vastes forêts, seul ou mélangé avec le pin maritime.

**CLIMAT, SITUATION, EXPOSITION.** — C'est un arbre des climats doux plutôt que chauds; on le trouve dans les plaines et il prospère encore jusqu'à 400 m. d'altitude. C'est surtout sur les pentes méridionales et abritées qu'il se plaît.

**TERRAIN.** — Il recherche principalement les terrains de transport, siliceux ou argilo-siliceux des landes.

**FLORAISON ET FRUCTIFICATION.** — La floraison est monoïque et amentacée pour les mâles; les fleurs paraissent en juin; les glands qui leur succèdent ne sont mûrs qu'en septembre de l'année suivante. L'arbre devient fertile vers l'âge de 25 à 30 ans et fructifie presque tous les ans.

**JEUNES PLANTS.** — Les jeunes plants sont assez robustes, mais l'ombrage leur est favorable et ils se trouvent bien du mélange avec le pin maritime dont le couvert est très-léger.

**FEUILLAGE.** — Les feuilles sont petites, légèrement dentées, et persistent jusqu'à l'entier développement de celles de l'année suivante. La tête de l'arbre, très-rameuse, fournit un couvert assez épais.

**RACINES.** — Le chêne occidental pivote et trace. Les racines latérales, qui s'étendent au loin, sont disposées à drageonner.

**CROISSANCE ET DURÉE.** — La croissance de cet arbre est assez rapide ; vers l'âge de cent ans, il peut atteindre deux mètres de circonférence ; il ne prend qu'une hauteur de 15 à 20 mètres et ne dépasse guère 4 mètres de tour. Sa longévité est prolongée.

**QUALITÉS ET USAGES.** — Comme le chêne liège, le chêne occidental fournit un bois qui se tourmente beaucoup et supporte mal les alternatives de sécheresse et d'humidité ; c'est donc un mauvais bois de construction ou de travail ; il est au contraire très-estimé pour le chauffage et donne un excellent charbon.

Il est surtout cultivé pour son écorce qui produit un liège aussi estimé que celui du chêne liège.

H. N.

---

Renvoi du n° 475, page 239.

En posant le principe que la possibilité des coupes de régénération doit toujours être basée sur le volume, les auteurs du Cours de culture laissent entrevoir qu'à la rigueur les coupes d'ensemencement pourraient être réglées par contenance.

C'est en effet ce qui a lieu pour quelques sapinières de l'arrondissement de Remiremont, à titre d'essai seulement et dans des conditions tout à fait exceptionnelles.

Dans cette région des Vosges, située sous un rude climat, les repeuplements naturels tardent à se produire, soit que la graine parvienne rarement à maturité, soit par suite d'accidents qui compromettent le succès des semis ; au début, la croissance est d'ailleurs très-lente ; les jeunes plants de hêtre et de sapin ont, à un degré remarquable, la faculté de supporter le couvert, dans un état de végétation latente, pendant 20, 30 et même 40 années, puis de se développer rapidement s'ils viennent à être dégagés avec les précautions nécessaires.

Il fallait tenir compte de ces particularités dans l'aménagement et fixer à 40 ans la durée des périodes mesurée aux lenteurs du réensemencement naturel ; mais, comme l'âge moyen des peuplements ne permettait pas d'adopter une révolution de plus de 120 ans, chaque affectation eût ainsi compris le tiers de la série, c'est-à-dire une étendue beaucoup trop grande.

En effet, sous le couvert de la coupe sombre, la végé-

tation est à peine sensible ; les semis ne manifestent réellement leur existence qu'après avoir été dégagés ; on comprend dès lors que la gradation des âges dans les nouveaux peuplements dépend de la marche que l'on imprime aux coupes secondaires et définitives. — Assises çà et là, sans ordre, suivant les hasards du repeuplement, ces exploitations laissent souvent, après leur passage, des bouquets de jeunes bois confusément mêlés, dont les âges extrêmes présentent un écart d'autant plus grand que la période est plus longue.

Il s'agissait d'éviter cette irrégularité de consistance qui perpétuerait en quelque sorte dans les affectations l'aspect et les inconvénients du jardinage, et préparerait, pour la 2<sup>e</sup> révolution, des bois plus ou moins éloignés de l'âge d'exploitabilité.

C'est pourquoi l'on a adopté les dispositions suivantes :

La révolution a été partagée en 6 périodes de 20 ans. La première affectation doit être entièrement régénérée en 20 ans, autant que possible par voie de régénération naturelle ; mais, comme la période est trop courte, eu égard aux conditions climatiques, on admet qu'après un certain temps écoulé sans résultats satisfaisants, le parterre des coupes sombres sera repeuplé artificiellement.

Dans cette affectation, la possibilité de toutes les coupes de régénération est d'ailleurs basée sur le volume.

Durant la même période, de véritables coupes sombres assises de proche en proche par vingtième de surface, parcourent la totalité de la 2<sup>e</sup> affectation. Si l'on prévoit une année fertile, on prépare le sol par bandes ou sillons ;

mais, quel que soit l'état des semis ainsi obtenus ou de ceux qui existaient fortuitement avant le passage des coupes sombres, on doit s'abstenir de les dégager; c'est en deuxième période seulement que les exploitations prendront la forme de coupes claires et définitives. On espère qu'à cette époque, il sera possible de les asseoir régulièrement et de réaliser la gradation des âges en dégageant les semis de proche en proche, sans interruption.

On suivra d'ailleurs la même marche jusqu'à la fin de la révolution, c'est-à-dire que chaque affectation sera régénérée à son tour normal d'exploitation, après avoir été traitée en coupes sombres pendant les 20 années précédentes.

En termes plus généraux, la combinaison dont il vient d'être parlé peut être résumée de la manière suivante :

La révolution étant de 120 ans, et la durée normale de la période devant être fixée à 40 ans, on a partagé chaque affectation en deux parties égales correspondant à deux sous-périodes de 20 ans.

Sauf la portion affectée à la première moitié de la première période et qui doit être régénérée par le concours des procédés naturels et artificiels, chaque affectation est régénérée en 40 ans par voie de réensemencement naturel.

On n'a donc dérogé à la méthode ordinaire qu'en deux points :

1° En réglant par contenance la possibilité des coupes sombres ;

2° En laissant écouler un intervalle de 20 ans entre la première coupe sombre et la première coupe secondaire, dans chaque affectation.



Contre l'application de ce mode particulier de régénération dans les sapinières, on objecte :

Que le matériel des coupes sèches sera exploité prématurément ;

Que les produits de la première période seront supérieurs à ceux du surplus de la révolution.

Ces objections sont plus ou moins fondées suivant les circonstances, aussi l'emploi du système en question ne peut-il se justifier qu'en présence de difficultés exceptionnelles, quand les lenteurs du réensemencement naturel commandent d'adopter de très-longues périodes.

Pour la grande majorité de nos sapinières, la règle n'en subsiste pas moins de baser sur le volume la possibilité des coupes principales scrupuleusement circonscrites dans l'affectation qui est en tour normal de régénération.

A. L.

---

Renvoi du n° 516, page 285.

Nos plus importantes forêts de pin sylvestre étaient anciennement soumises au mode à tire et aire. Ce traitement leur fut appliqué jusque vers 1820, époque à laquelle on lui substitua la méthode naturelle, au moins en ce qui concerne les coupes principales. Dans ces coupes, on réservait un certain nombre d'arbres dans le but d'obtenir le réensemencement du terrain et, pour mieux assurer la régénération naturelle, on imposait aux adjudicataires la

charge d'arracher les myrtilles, les mousses, etc., et de donner au sol une légère culture par bandes alternes.

Tel est, en peu de mots, le traitement qui était autrefois appliqué à ces forêts, dans lesquelles on trouve aujourd'hui des peuplements provenant de semis naturels, parfaitement complets et de tous les âges antérieurs à 1840.

La faculté d'imposer des travaux sur les coupes ayant été supprimée (il y a 30 ans environ), on cessa de cultiver le parterre des coupes d'ensemencement. Mais bientôt on s'aperçut que ces coupes ne se repeuplaient pas, ou qu'elles se repeuplaient mal, ou que, tout au moins, il fallait attendre trop longtemps avant d'obtenir un semis suffisamment complet. Dès lors, on prit le parti de recourir à des repeuplements artificiels.

La facile exécution et le succès, pour ainsi dire assuré, de cette opération, d'une part; l'insuccès des coupes d'ensemencement dans des terrains non préparés, d'autre part, firent naître, peu à peu, la conviction qu'il y avait intérêt à substituer, d'une manière générale, le repeuplement artificiel à la régénération naturelle. Mais on ne tarda pas à reconnaître que le nouveau mode de régénération ne donnait pas des résultats meilleurs que ceux que l'on obtenait anciennement, et, comme il est beaucoup plus coûteux, on revint tout naturellement à l'ancienne pratique des coupes d'ensemencement et à la préparation du sol de ces coupes.

Une culture très-légère, un simple grattage de la mousse qui recouvre les terrains secs, l'ouverture de bandes ou

de sillons dans les sols trop fortement enherbés ou couverts de myrtilles, suffit pour assurer la régénération naturelle des coupes dans un bref délai.

Les repeuplements que l'on obtient ainsi ne sont pas ordinairement aussi épais, aussi drus que ceux que l'on peut avoir en semant à la main. Mais ils présentent, sur ceux-ci, plusieurs avantages importants : en effet, les jeunes plants du pin sylvestre sont très-robustes et croissent avec rapidité dans la première jeunesse, s'ils sont un peu clairsemés ; leurs branches basses s'étalent, leur pied devient fort et trapu, et, peu à peu, le massif se forme et se serre jusqu'à donner un peuplement très-complet avant d'arriver à l'état de gaulis. Les semis naturels (probablement parce qu'ils sont moins serrés) échappent presque tous à la maladie grave de la défoliation qui atteint généralement les semis artificiels, et en retarde souvent le développement pendant plusieurs années.

Enfin, malgré l'avantage qu'il pourrait y avoir à pratiquer une éclaircie forte dans les fourrés, la difficulté de procéder en grand à cette opération délicate empêche d'y recourir, et les semis artificiels, trop serrés au début, ne présentent plus, quand arrive l'état de gaulis, que des tiges étiolées et souvent sans avenir.

H. N.

---

Renvoi du n° 543, page 318.

Dans les futaies jardinées en voie de transformation, l'usage a prévalu de régler par contenance les coupes jardinatoires destinées à faire disparaître les bois que l'on ne pourrait laisser sur pied, jusqu'à ce que les coupes de régénération vinssent les atteindre.

Selon que le dépérissement de ces bois est plus ou moins rapide, on parcourt deux ou trois fois, durant chaque période, les affectations qui ne sont pas en tour de régénération ; les coupes sont assises de proche en proche, par contenance égale, et l'on procède en même temps à l'enlèvement des perches dominées et sans avenir.

De cette manière on ne réalise pas toujours l'égalité des produits annuels ; mais c'est là un point secondaire ; l'essentiel est d'exploiter à propos les arbres surannés ou nuisibles, en évitant toute appréciation à long terme. Suivant les conseils du Cours de culture [544], il s'agit, en pareil cas, de recourir aux moyens les plus simples, les plus larges et les plus expéditifs.

A. L.

---

Renvoi du n° 549, page 327.

Le jardinage rationnel, tel que l'enseigne le Cours de culture [549], a rencontré dans la pratique de sérieuses

difficultés en ce qui concerne la périodicité des coupes : En effet, la marche des accroissements étant fort irrégulière dans les forêts de l'espèce, il est rarement possible de préciser le temps dans lequel les arbres d'une certaine catégorie de diamètre parviendront à la grosseur requise pour être réputés exploitables; et cette donnée fût-elle même acquise avec une approximation suffisante, le rapport soutenu n'en serait pas moins établi sur une base bien précaire.

Il faut donc le reconnaître : on n'a fait et l'on ne pouvait faire que de vaines tentatives pour équilibrer les produits, à long terme, dans les forêts jardinées. C'est que la solution du problème est subordonnée à la condition de trouver sur toute l'étendue de la série jardinée des bois de tous âges confusément mêlés dans des proportions constantes, c'est-à-dire un état de consistance à peu près imaginaire.

A ce point de vue, comme à celui de la quantité et de la qualité des produits, le jardinage paraît devoir être exclu des forêts grandes ou petites, sauf les cas exceptionnels où la situation commande d'y maintenir constamment l'état de massif, dans un intérêt de conservation ou d'abri.

En pareil cas, le forestier intervient uniquement, soit pour enlever les arbres brisés, morts ou parvenus à un degré de maturité très-avancé, soit pour favoriser l'essor des jeunes peuplements destinés à perpétuer l'état de boisement.

Or, le moyen le plus simple, le plus sûr d'obtenir ces

résultats, serait de parcourir chaque année toute la série jardinée en coupant les bois parvenus au terme de l'exploitabilité physique. Mais cette manière de procéder serait fort pénible si on l'appliquait à des forêts de certaine étendue ; l'exploitation de produits disséminés à de grandes distances occasionnerait d'ailleurs une forte dépense ; il est donc souvent nécessaire de consacrer plusieurs années à ces exploitations et d'en régler la périodicité proportionnellement aux conteneances à parcourir.

Toutefois, la période de rotation doit être courte pour éviter toute appréciation lointaine sur la longévité des bois, et afin que dans l'intervalle de deux coupes sur un point quelconque, les produits ne puissent pas être dépréciés par un dépérissement imprévu.

On remplit ces conditions en fixant, par exemple, à 12 ans la périodicité des coupes jardinatoires dans les forêts de plus de 100 hectares, et en réduisant cette périodicité jusqu'à la rendre annuelle, biennale ou triennale, s'il s'agit d'opérer sur de faibles étendues.

Ce point établi, la marche des exploitations consiste uniquement, pour les bois de l'Etat, à diviser l'étendue boisée en autant de parties égales qu'il y a d'années dans la période de rotation ; les agents d'exécution ont ensuite pleine faculté de faire, dans les limites de chaque coupe, toutes les exploitations compatibles avec la conservation des massifs.

Quant aux forêts appartenant à des communes ou à des particuliers, sans poursuivre le rapport soutenu à long terme, il convient cependant d'équilibrer les produits,

dans une certaine mesure, pendant le cours de chaque période de rotation.

Les dispositions à prendre dans ce but, peuvent être résumées ainsi qu'il suit :

1° Fixer d'après la contenance de la série quelle doit être la périodicité des coupes ;

2° Partager la série en parcelles comme il est dit au Cours de culture [349] ;

3° Déterminer le diamètre que les arbres doivent avoir atteint pour être réputés exploitables ;

4° Au début de chaque période, dénombrer et cuber, séparément dans chaque parcelle, les arbres qui ont atteint ou dépassé le diamètre adopté comme limite ; puis divisant ce matériel par le nombre d'années de la période, déduire le volume annuel moyen que l'on peut exploiter ;

5° Répartir les parcelles entre les années de la période, proportionnellement aux volumes que l'on y a trouvés, en s'attachant à former chaque contingent annuel, soit d'une parcelle entière, soit d'une partie aliquote de parcelle, soit de plusieurs parcelles réunies, de telle sorte que les produits diffèrent le moins possible du volume annuel moyen ;

6° N'exploiter dans chaque coupe annuelle que les arbres ayant atteint ou dépassé le diamètre adopté, et même réserver ceux dont l'enlèvement compromettrait l'intégrité du massif, faute de jeunes bois en quantité suffisante pour fermer les vides.

7° Exploiter en outre, quelle que soit leur grosseur, les bois morts ou tout à fait dépérissants.

Ce règlement de possibilité fondé sur les contenances équivalentes est compatible avec l'établissement d'un quart en réserve ; il suffit pour cela de former autant de contingents annuels qu'il y a d'années dans la période, plus un tiers.

A. L.

---

Renvoi du n° 560, page 341.

Dans la pratique, on s'abstient généralement de passer par une révolution transitoire quand il s'agit de transformer les futaies précédemment soumises au mode dit à tire et aire. Limitées pendant la première période aux bois déperissants ou parvenus à un degré de maturité très-avancé, les extractions d'anciennes réserves, dans la plupart des cas, n'ont pas donné d'assez grands produits pour compromettre le rapport soutenu.

On n'a recours à une période transitoire que quand la révolution adoptée étant plus longue que celle des coupes à tire et aire, il convient d'attendre que les bois de première affectation soient devenus exploitables.

A. L.

---

Renvois des n°s 597 et 600, pages 387 et 391.

Quand on procède au balivage dans les taillis composés d'essences mélangées, il est bien rare de rencontrer, sur-



tout dans les forêts situées en bon fonds, le nombre de brins de chêne nécessaire à l'entretien d'une réserve convenable en sujets de cette essence.

Les auteurs de la culture attribuent cette pénurie des baliveaux de franc-pied à la difficulté que les jeunes plants de chêne éprouvent à s'élever au milieu des bois blancs, des mort-bois et des rejets de bois dur qui les encombrent et les dominant, bientôt après l'exploitation du taillis.

Afin d'assurer les ressources nécessaires au balivage, on prescrit de planter une quantité suffisante de jeunes chênes après chaque exploitation du taillis ; puis on recommande de donner à ces plantations tous les soins nécessaires pour les mener à bien, notamment en pratiquant des nettoiemens et des éclaircies dans le but de les dégager du couvert qui peut nuire à leur développement.

Si ces prescriptions étaient bien comprises et appliquées avec suite, elles produiraient le résultat que l'on poursuit. Mais elles ont, à nos yeux, un inconvénient qui n'a certainement pas échappé aux auteurs de la culture, c'est de recourir à des repeuplements artificiels, toujours fort coûteux, pour assurer la régénération du chêne dans les taillis d'essences mélangées.

Nous ne songeons pas à écarter les repeuplements artificiels d'une manière absolue ; nous croyons seulement que, dans les taillis comme dans les futaies, on peut souvent éviter cette dépense, en prenant les précautions nécessaires : 1° pour assurer la production des semis naturels en quantité suffisante ; 2° pour préserver ces semis, après l'exploitation du taillis, des dangers auxquels ils sont exposés.

Dans les taillis exploitables, où la réserve est constituée en chênes et hêtres, on trouvera presque toujours, sous le couvert des perchis, une certaine quantité de jeunes plants provenant de semis naturels. A la rigueur, cette quantité pourrait, la plupart du temps, être considérée comme suffisante pour subvenir, ultérieurement, aux besoins du balivage. Mais on obtiendra sûrement un résultat plus complet et plus satisfaisant, en pratiquant, quelques années avant la coupe principale, une éclaircie dans laquelle on aura soin de dégager le sol de tout ce qui le couvre trop immédiatement, en un mot, de relever le couvert, tout en se gardant d'interrompre le massif. Lorsque les taillis sont ainsi préparés, les glands et les faines se conservent parfaitement sous la feuille pendant l'hiver qui suit la dissémination; tandis que ces semences moisissent, s'échauffent et pourrissent dans les peuplements plus jeunes, plus serrés, où le couvert des végétaux de toute espèce est plus rapproché du sol.

Que si, par exception et pour une cause quelconque, on n'a pas l'espoir d'obtenir des semis naturels sous le perchis, il faudra bien planter. Mais alors, mieux vaut encore, selon nous, planter, deux ou trois ans avant l'exploitation, sous le couvert du taillis préalablement éclairci, que d'entreprendre le repeuplement après le récolement de la coupe. La plantation sous le couvert du perchis, dans un sol nettoyé d'herbes et bien ameubli, est plus facile, moins coûteuse et présente plus de chance de succès que lorsqu'on l'exécute dans un taillis nouvellement exploité. En tous cas, quand on plante, soit avant, soit après l'explo-

tation du taillis, il est bon d'adopter un certain ordre et de disposer les plants par bouquets ou en lignes, de façon à pouvoir les retrouver plus facilement quand il faudra leur donner les soins nécessaires pour assurer leur développement.

Ces soins s'appliquent aussi bien aux brins provenant de semis naturels qu'aux sujets de plantation. Ils sont parfaitement indiqués par les auteurs de la culture, et consistent principalement dans la pratique des nettoiemens (Voir la note au bas de la page 289). Toutefois, nous croyons devoir insister sur la manière de procéder à cette opération, que l'on a trop négligée jusqu'ici, parce qu'elle ne procure point de revenus immédiats.

Afin que l'exécution en fut bien assurée, nous voudrions que les coupes de nettoiemment dans les taillis fussent assises aussi régulièrement que les coupes principales et, qu'après son exploitation, chaque coupe de taillis fut nécessairement et obligatoirement parcourue en nettoiemment à des époques fixes, par exemple, tous les deux, trois ou quatre ans, suivant la rapidité de la végétation, jusqu'à l'âge fixé pour la coupe d'éclaircie. Rien ne serait plus facile, nous en avons l'expérience, que de dresser les gardes à diriger ou à exécuter eux-mêmes une opération qui ne demande ni dépense de force, ni beaucoup de savoir-faire. En effet, le nettoiemment, comme nous l'entendons ici, ne consiste pas à extirper à la pioche les bois blancs et les mort-bois, ni même à les couper rez-terre à la serpe ou à la hache ; il se réduit tout simplement à dégager la tête des jeunes plants dont on veut favoriser le développement, en

**cassant ou en coupant, à une hauteur convenable, les tiges ou les branches des végétaux secondaires qui nuisent ou menacent de nuire bientôt à la croissance des sujets à protéger.**

**H. N.**

---

Renvois des nos 601 et 603, pages 393 et 395.

**L'élagage, dans les forêts, ne s'applique guère qu'aux arbres qui ne croissent pas en massif. L'élagage des arbres réservés dans les taillis comprend deux opérations distinctes : l'émondage des branches gourmandes, et la suppression ou le raccourcissement de certaines branches de la cime.**

### **I.**

**Ainsi que le conseillent les auteurs de la culture, l'émondage des branches gourmandes doit toujours avoir lieu rez-tronc. On se sert, à cet effet, d'instruments bien tranchants et de formes très-variées, auxquels on donne le nom d'émondoirs. En première ligne vient la serpe qui est l'instrument préféré des ouvriers, et le seul qu'ils peuvent employer commodément, quand ils sont obligés de faire usage d'échelles, pour atteindre les branches à émonder. Après la serpe ordinaire, les émondoirs dont nous donnons ici le dessin nous paraissent les meilleurs. Le premier est une serpe en forme de croissant, à laquelle on ajuste un manche de longueur variable (2 à 4 mètres ordinairement); le second a la forme d'une spatule et s'emmanche comme**

la serpe. L'un et l'autre peuvent servir indifféremment à l'émondage rez-tronc des petites branches gourmandes; mais lorsqu'il s'agit de retrancher une branche un peu forte, ayant, par exemple, 4 ou 5 centimètres de diamètre au point d'attache, on se sert, avec plus d'avantage, de l'émondoir en spatule. Dans ce cas, on applique le tranchant de l'instrument à la base de la branche, et pendant qu'un homme soutient l'émondoir dans cette position, un autre ouvrier lui donne l'impulsion en frappant avec un maillet contre l'extrémité inférieure du manche. On obtient ainsi des plaies bien nettes, que l'on enduit de coaltar immédiatement après l'opération et qui se ferment avec d'autant plus de rapidité que l'arbre est plus vigoureux.



L'émondage doit se faire aussitôt que les branches gourmandes apparaissent, c'est-à-dire pendant l'été qui suit l'abatage du taillis. Si l'opération ne peut pas être pratiquée dans ce délai, il sera particulièrement utile de la faire avant le développement des bourgeons de l'année suivante.

Un seul émondage suffira quelquefois pour débarrasser un arbre de ses branches gourmandes et, dans tous les cas, le premier sera le plus important. — Mais un second émondage à 2 ans, 3 ans au plus d'intervalle, sera souvent utile ou même nécessaire. Rarement, on sera obligé de recommencer une troisième fois l'opération.

Appliqué avec soin et en temps opportun, l'émondage des branches gourmandes suffit presque toujours pour préserver du dépérissement la cime des arbres de réserve et dispense d'avoir recours plus tard à la suppression de grosses branches. — Nous ferons remarquer, d'ailleurs, que l'opération de l'émondage est facile à pratiquer, qu'elle n'exige pas l'emploi d'ouvriers spéciaux difficiles à former, et qu'on peut en généraliser l'application dans toutes les forêts, grandes ou petites, sans aucun embarras, parce qu'elle ne demande ni beaucoup de temps, ni beaucoup de frais, ni beaucoup d'habileté. Le tout est d'agir en temps utile.

## II.

Outre l'émondage, toujours nécessaire, des branches gourmandes, il peut être utile de retrancher ou de raccourcir certaines branches de la cime. Ainsi, les branches

mortes, par exemple, devront toujours être supprimées en même temps que l'on fera l'émondage des branches gourmandes. Il en sera de même des branches cassées par le vent ou par la chute d'arbres voisins. Il est bien certain, en effet, que si on laisse subsister ces branches mortes ou cassées, la pourriture qui a envahi les premières et qui menace d'envahir les autres, deviendra souvent la cause de la formation de gouttières et, plus tard, de grisettes qui atteindront le corps de l'arbre et y produiront les ravages que l'on rencontre si souvent dans les réserves sur taillis et spécialement dans les chênes. Reste donc à savoir comment on procédera à cette amputation.

Pour les branches entièrement mortes, la section doit toujours avoir lieu rez-tronc, tandis que l'amputation peut se faire dans la partie restée vivante de la branche, quand l'extrémité seule est morte. — De même, on pourra souvent se borner à supprimer une partie d'une branche vive et cassée en faisant la section à quelque distance au-dessous du point de fracture; mais c'est à la condition expresse que la partie à conserver sera susceptible de reconstituer une branche utile à l'alimentation de l'arbre. Dans tout autre cas, l'élagage devra se faire rez-tronc.

Cette opération peut se faire avec une serpe ordinaire, ou avec une scie quand il s'agit d'attaquer une grosse branche. Mais, lorsqu'on se servira de la scie, il faudra nécessairement raviver et polir la plaie avec la serpe et, dans tous les cas, recouvrir cette plaie d'une couche de coaltar. Inutile de dire que l'amputation d'une branche un peu forte devra toujours commencer par une entaille assez profonde dans le côté inférieur de la section.

## III.

Quant aux branches vives et intactes, nous croyons, qu'en général, il y a plus de mal que de bien à attendre d'une opération, si bien faite qu'elle soit, qui aurait pour objet de soumettre une partie d'entre elles à un système raisonné de suppression ou de raccourcissement, en vue d'améliorer la croissance ou la forme de l'arbre qui les porte.

Pour le chêne spécialement, nous partageons l'opinion que l'élagage en chicot est dangereux et qu'il vaut mieux couper rez-tronc toute branche que l'on est décidé à supprimer. Nous admettons aussi que les plaies faites au tronc peuvent se cicatriser, le plus souvent, avec assez de rapidité pour soustraire le corps entier de l'arbre au danger des gouttières, des grisettes et des noeuds gâtés; mais nous devons dire que ces plaies, même les mieux recouvertes, laissent derrière elles des taches analogues à celles qui sont connues sous le nom de *frotures*; que ces taches sont composées d'une ou de plusieurs couches de bois mort (mais non gâté) qui ne se ressoudent pas avec celles qui les recouvrent; qu'elles se retrouvent plus tard quand on débite l'arbre, et suffisent pour en déprécier la valeur; que si, au contraire, on se fût abstenu d'élaguer, le débit de la pièce en planches, en charpentes ou en marine aurait accusé, à la place de ces plaies, un noeud sain qui n'aurait altéré en rien la qualité et le prix de la marchandise. Nous



pensons donc, qu'à moins d'exceptions, il faut se dispenser d'élaguer les branches vives et intactes de la tête des réserves.

Quelles sont ces exceptions ?

On comprend que dans un taillis exploité à une courte révolution, à 10 ou 15 ans, on puisse soumettre les jeunes réserves à l'opération de la taille, et nous conseillerions volontiers aux propriétaires particuliers d'user de ce procédé pour *former* leurs arbres, surtout s'ils pouvaient surveiller eux-mêmes l'opération, et la confier à des ouvriers intelligents et expérimentés.

On comprend aussi que si un taillis est dominé par des arbres à couvert épais, comme des hêtres, on puisse avoir intérêt, surtout quand le couvert est bas, à retrancher quelques-unes des branches inférieures, pour favoriser la croissance du sous-bois. En effet, au cas particulier du hêtre, l'arbre ne souffrira que peu, sous le rapport de sa croissance et, en raison de l'emploi que l'on en fait, il ne subira, la plupart du temps, qu'une dépréciation insignifiante.

On comprend même que les branches inférieures de la tête d'un chêne, lorsqu'elles s'étalent démesurément et horizontalement, puissent être raccourcies sans danger ; car alors même que, par cette opération, la vitalité de la branche serait amoindrie ou tout à fait compromise, il n'y a, pour ainsi dire, point de risque à courir au point de vue de la formation d'une gouttière, puisque, par hypothèse, la branche a une direction horizontale.

Concluons. — L'arbre le plus précieux et le plus robuste

de nos forêts, le chêne, est aussi celui qui est le plus facilement et le plus profondément atteint, dans la qualité de son bois, par les accidents de toute sorte auxquels nos grandes essences sont exposées. Que l'on cherche à prévenir ces accidents, ou à en amoindrir les conséquences dans la mesure du possible, rien de mieux ; mais si l'on consulte les exploitants et tous ceux qui ont étudié le débit du chêne sous toutes les formes, tous s'écrieront, à propos de l'élagage des branches vives et intactes : ne touchez pas au chêne.

H. N.

---

Renvoi du n° 607, page 403.

Anciennement, le balivage dans les taillis sous futaie était réglé par l'ordonnance de 1669, et les forêts soumises à ce régime étaient généralement surchargées de réserves.

L'ordonnance du 1<sup>er</sup> août 1827, rendue pour l'exécution du code forestier, a reproduit (art. 70) les dispositions de l'ordonnance de 1669, mais dans des termes qui ont laissé une latitude trop grande aux agents forestiers en ce qui concerne la désignation des modernes et des anciens à abandonner à l'exploitation dans chaque coupe. Il est résulté de là que, selon l'humeur ou le caprice des forestiers qui ont présidé aux martelages, le nombre des arbres réservés dans les différentes coupes d'une même forêt a beaucoup varié. De là aussi, cette bigarrure que l'on rencontre dans la constitution des peuplements de ces forêts.

En effet, selon que les réserves étaient plus ou moins nombreuses, le sous-bois était plus ou moins entravé dans sa croissance. Si le nombre des baliveaux de toute catégorie était excessif, le taillis disparaissait ou ne prenait que peu de développement sous le couvert trop complet de la réserve ; si, au contraire, les arbres de réserve étaient trop espacés, le taillis était plus florissant, mais aussi il était plus facilement envahi par les bois blancs, et comme on ne faisait rien pour les combattre, il s'engageait entre eux et les essences d'élite une lutte dans laquelle ces dernières devaient succomber tôt ou tard.

Le chêne, particulièrement dans les bons sols, a beaucoup souffert de ce traitement, et c'est pourquoi l'on rencontre si peu de baliveaux de franc pied de cette essence dans des forêts, « où la réserve en anciens et en vieilles écorces, formée en presque totalité de très-beaux chênes, atteste l'abondance avec laquelle cette essence y était autrefois répandue. »

Frappés des inconvénients que nous venons de signaler, les auteurs du Cours de culture ont tracé les règles à suivre dans le traitement des taillis composés, pour obtenir la production la meilleure que comporte ce régime. Mais dans leur opinion, le régime du taillis sous futaie n'est pas celui qu'il conviendrait d'appliquer aux forêts domaniales, et si, par une sorte de concession, ils en acceptent l'application dans les forêts communales ou d'établissements publics, c'est en attendant l'époque où tous les propriétaires impérissables, mieux éclairés sur leurs intérêts, voudront substituer le régime de la futaie pleine à celui du taillis sous futaie.

Or, après bien des hésitations, l'Etat entreprend aujourd'hui la conversion en futaie des taillis composés qu'il possède, et, tôt ou tard, l'exemple de l'Etat déterminera les Communes à entrer dans la même voie. Cette raison ou cette prévision suffirait seule pour engager à faire des balivages serrés, en bonnes essences, dans les taillis de l'Etat et des Communes. Mais, à côté de cette considération, il en est une autre qui milite en faveur d'une forte réserve en chêne dans les taillis composés, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent : c'est la rareté de jour en jour plus grande des beaux arbres de cette essence ; c'est que le prix du bois d'œuvre va sans cesse en augmentant tandis que la valeur des bois de feu reste et restera probablement stationnaire, en raison de la concurrence de plus en plus facile qui leur est faite par les combustibles minéraux.

Si donc il est bon de se conformer aux préceptes du Cours de culture, *quand on veut maintenir dans son intégrité le régime du taillis composé*, il est presque toujours de l'intérêt du propriétaire, *qui peut s'en écarter*, sinon de suivre à la lettre les prescriptions de l'art. 70 de l'ordonnance réglementaire, tout au moins de réserver le plus grand nombre possible de chênes bien venants. Que l'on abatte les arbres mûrs, et ceux qui, par leurs dimensions, sont *exploitables* dans la saine acception du mot, c'est de bonne administration ; mais nous nous élevons contre l'erreur que l'on commet trop souvent, en livrant à l'exploitation de jeunes arbres, de beaux modernes, sous le vain prétexte de répartir convenablement le couvent, ou de

favoriser la production du taillis. Sacrifier la réserve au sous-bois dans les taillis composés, exploiter des chênes de réserve avant qu'ils aient atteint au moins 1 mètre 30 de tour, c'est presque toujours consommer une opération préjudiciable non-seulement au bien public, mais à l'intérêt du propriétaire, quel qu'il soit.

Ce fait, qui s'affirme tous les jours davantage, était senti par les auteurs du Cours de culture lorsqu'ils disaient (3<sup>e</sup> édition, 1855) : « C'est en étudiant les conditions de production d'une forêt, sol, climat, essences, et en les combinant avec les intérêts du propriétaire et les besoins de la consommation, que l'on détermine le balivage le plus avantageux, le plus rationnel à appliquer à cette forêt. »

H. N.

---

Renvoi du n° 632, page 440.

A l'examen comparé des principales méthodes d'exploitation qu'il nous soit permis d'ajouter encore une considération à l'avantage de la futaie :

On sait avec quelle facilité les bois blancs (tremble, saule, aune et tilleul) ainsi que le bouleau, se propagent dans les taillis quand le sol est frais et fertile. — Cette invasion est d'autant plus rapide que les exploitations sont plus fréquemment répétées. Les rejets de bois durs peuvent lutter avec quelque avantage, mais les brins de semence

périssent inmanquablement étouffés, si, dès les premières années, la main du forestier ne vient pas à leur aide.

A défaut de ces soins, toujours coûteux et trop souvent négligés, on a vu s'opérer dans la nature des peuplements les transformations les plus radicales ; le tremble, le bouleau, les mort-bois règnent en maîtres sur de vastes étendues autrefois habitées par le chêne.

Ces tristes résultats ne sont point à craindre dans les futaies ; les bois blancs s'y montrent quelquefois après la coupe secondaire ou définitive, mais c'est pour disparaître dans les éclaircies, si déjà les coupes de nettoyage n'en ont pas fait justice.

A. L.

FIN.



Fig 2.  
Rateau en fer

Fig  
Houe




Fig. 3  
Houe-rateau.




Fig 5.  
Plantoir massue

Fig 4.  
Plantoir à nervures





Fig. 7  
Grande Bêche de

Fig 6  
Bêche



No  
lec



